



Math. Qu.

1891








$H = \text{comp } 1.2$

$\frac{24}{40}$
neto





ANALYTIC

GEOMETRIAE

LIBER PRIMUS

DE

PROPORTIONIBUS

ACADEMIA
KÖNYVTÁRA

ACTOR

PROPORTIONIBUS

PROPORTIONIBUS

LIBER

PROPORTIONIBUS

DE

E L E M E N T A
ANALYSEOS ET GEOMETRIAE
SUBLIMIORIS

EX
EVIDENTISSIMIS NOTIONIBUS
PRINCIPIISQUE
DEDUCTA

AUCTORE
IOANNE PASQUICH.

CUM FIGURIS.

LIPSIAE
IN LIBRARIA WEIDMANNIANA

1799.

OPUSCULA
STATICO-MECHANICA

PRINCIPIIS
ANALYSEOS FINITORUM
SUPERSTRUCTA

EDITORE

IOANNE PASQUICH

REGIAE SCIENTIARUM SOCIETATIS BOHEMICAЕ MEMBRO
EXTRAORDINARIO; REGIAE SOCIETAT. SCIENT. GOTTIN-
GENSIS A COMMERC. LITTERARUM SODALI; ET MATHE-
SEOS SUBLIMIORIS IN REG. SCIENT. UNIVERSIT.
HUNGAR. PROFESSORE EMERITO.

VOLUMEN I.

CUM FIGURIS.

LIPSIAE
IN LIBRARIA WEIDMANNIANA

1799.

STATIGO-METHANICA

MUSEO HIST. NAT. ITALIAE

MUSEO HIST. NAT. ITALIAE

M. ACADEMIA
KÖNYVTÁRA



PRAEFATIO.

Amplitudo scientiarum statico - mechanicarum est unum e praecipuis impedimentis, quae in illarum studio progredi cupientibus iter jam retardant ac remorantur, jam penitus intercludunt. Tot enim inventis sunt hae scientiae hactenus amplificate, totque novis progressibus et accessionibus illae indies adaugentur et promoventur, ut, qui vel primos ordines in iis ducere sibi proposuerit, in latissime patentem campum debeat excurrere; tot opera diversa et diaria consulere, ut raro unus sit futurus, qui illa conquirere possit et pervolvere. In hac porro inventorum ubertate multa occurrunt peculiari studio exquirenda; multa ad criticae normam expendenda, et recto acutoque examine diiudicanda, quo minus utilia ab utilibus, falsa a veris, et incerta a certis probe discernantur.

Indubium est, partem puram scientiarum statico - mechanicarum ad tantum perfectionis gradum jam esse perductam, ut fere nihil sit, quod expectari possit aut debeat: seu enim aequilibrîi, seu motus principia consideres, ad tantam sunt ea universalitatem promotâ, ut nihil amplius desiderandum videatur. Interea certum est, pleraque principia a multis harum scientiarum doctoribus aut ex alienis et minus genuinis principiis esse derivata, aut methodo inconvenienti exposita: apud omnes vero invenies universam motus theoriam indeterminatis et vacillantibus infinite parvorum notionibus principiisque superstructam, consequenter evidentia illa et certitudine destitutam, qua disquisitiones mathematicae se tantopere solent commendare.

Quodsi autem partem *applicatam* scientiarum statico - mechanicarum seorsim attentius expendamus, in qua generalia principia aequilibrîi et motus in parte pura stabilita ad vires in natura re ipsa existentes applicantur; imperfectio ejus omnem expectationem superabit, nisi nos ad difficultates fere insuperabiles continuo reflectamus, quae in excolenda hac parte se perpetuo offerunt. Tot sane tantisque tenebris veritas involuta hic delitescit, tam abdita, et ab oculis nostris tam longe remota, ut, si vel adproximare ad illam cupias, multo pluribus nobilioribusque observationibus et experienciis te opus habere facillime sentias, quam ad hunc usque diem facere capereque licuit. Atque hinc factum est, quod pleraeque adplicationes
 hypothe-

hypothesibus physicis sint superstructae, quae jam nulli genuino, jam admodum levi fundamento innituntur, jam etiam inter se plurimum dissentiunt, et saepenumero cum veritatibus et principiis extra omne dubium positis evidenter videntur pugnare.

Haec sunt, quae me ad elaborationem hujus operis excitarunt, in quo quaecunque hactenus in universis scientiis statico-mechanicis praeclare acta sunt, ita exponere constitui, ut inde plurimum et utilitatis tyrones, primam, ut ajunt, harum scientiarum studio manum admoventes, et commodi Doctores, lucrique ipsae scientiae queant capere, unde sequens totius operis ratio et oeconomia sponte se obtulit.

1. Praemitto in hoc primo opusculorum volumine elementa calculi differentio-integralis, et geometriae sublimioris, in quorum expositione ita verborum, ut cuncta ex evidentissimis analyseos finitorum notionibus et principiis elementaribus deducam, notionibusque infinite parvorum, quorum justis ocores sunt recentissimi geometrae, perfectissime exclusis, omnia ad genuina principia methodi exhaustionis veterum revocem, qua de re uberius in introductione differo.

2. His jam elementis superstruam omnes disquisitiones statico-mechanicas, quas sequentia volumina complectentur. Dabo operam, ut, inchoando a primis staticae et mechanicae principiis, quaecunque usu aliquo et utilitate se commendare visa fuerint, in diversis dissertationibus criticisque commenta-

tionibus solide aeque ac succincte exponantur illustrenturque. Et ideo, ubicumque per naturam objecti licuerit, conabor ordinem notionum propositionumque scientificum, et rigorem in condendis demonstrationibus geometricum servare. In ordinandis vero dissertationibus ad id solum attendam, ne ulla innitatur principiis, quae nondum sint exposita et evicta. Non enim aedificium hic ad omnes leges architecturae exactum firuere, sed materiam duntaxat conquirere mihi proposui, qualem amplitudo et dignitas ejusmodi aedificii postulat: nihil ergo refert, quo ordine singulae ejus partes expendantur, modo materia pro singulis, quoad licuerit, solida determinetur.

3. Eapropter adplicatam statico-mechanicarum scientiarum partem, et in specie doctrinam de aequilibrio virium in machinis machinarumque motu peculiariter discutiam. Systemata hypothesebus physicis superstructa, ne sine necessitate sim infinitus, breviter recensebo; tum singula tali examini subiiciam, quod ad explorandam veritatem sufficiat. Quamobrem non illa solum, quae hactenus sunt instituta, experimenta consulam, sed alia quoque copiosa et exquisita in subsidium vocabo, quorum pleraque in machinis jam exstructis capere constitui.

4. In secundo itaque volumine, quo ad omnis generis disquisitiones tyrones praeparem, agam de generalibus corporum viriumque in illa agentium proprietatibus; virium aequilibrio, earumque compositione et resolutione; centro aequilibrii

in genere, et centro gravitatis ejusque investigatione in specie; motu punctorum aequabili et inaequabili; motu massarum progressivo pendente a datis viribus; lapsu corporum gravium per plana inclinata, et lineas curvas; denique de momento inertiae, motuque massarum circa axes fixos, et motu oscillatorio pendulorum. In tertio autem volumine evolvam, ob eandem causam, principia generalia tam aequilibrîi, quam motus in machinis simplicibus et compositis, ita ut hinc ad aequilibrium et motum pro determinatis viribus facillimum sit transire, felicissimoque successu principia utriusque constabilire, modo leges virium in natura existentium, quas eae sibi nullis calculis praescribi patiuntur, ex observationibus et experimentis colligere liceat.

Tuum jam erit Lector benevole judicare, utrum haec aliquid, an nihil meriti habeant. Si nihil inter ea novi, quod meum sit, inveneris; spero tamen fore, ut observes, me aliorum meditationes haud temere congestisse, sed plerasque ita excoxisse, ut meae esse videantur.

Dabam Lipsiae 17ma. 7bris. An. 1799.

INDEX CAPITUM

IN HOC VOLUMINE CONTENTORUM.

- Caput I.* De discrimine et differentiis functionum, earumque explicatione per series.
- Caput II.* De natura et inventione rationum differentialium.
- Caput III.* De palmariis quibusdam adplicationibus calculi differentialis ad theoriam functionum.
- Caput IV.* De praeceptis fundamentalibus calculi integralis, integrationeque functionum rationalium.
- Caput V.* De integratione exponentium irrationalium formae generalis $x^m \varepsilon x(a + bx^n \pm cx^{2n})^p$.
- Caput VI.* De integratione exponentium transcendentium; transformatione exponentium irrationalium in rationales; integrationeque per series.
- Caput VII.* De integratione exponentium aequationumque differentialium primi altiorisque ordinis plures variables complexentium.
- Caput VIII.* De generalibus quibusdam curvarum proprietatibus.
- Caput IX.* De curvis quibusdam speciatim.

INTRODUCTIO

IN CALCULUM DIFFERENTIO-INTEGRALEM.

I.

Theorema elementare, cujus demonstrationem in (129. §.) dedi, est unum e praecipuis principiis generalibus *methodi exhaustionis* veterum geometrarum. Demonstratio aequalitatis duorum quantorum illi principio rite superstructa tantam parit evidentiam et certitudinem, tantamque habet vim in intellectu de veritate convincendo, ut ea major desiderari non possit. Qui aliter sentiunt, non satis mihi videntur naturam ejusmodi demonstrationum expendisse. Inter hos *Michelsenus* est, qui negat, methodum exhaustionis veterum per se ad veritates maximo, qui possit desiderari, rigore evincendas sufficere ^(a): ast non est, cur in confutanda ejus opinionis levitate diutius immorer; unico exemplo utar, quo clarius tyrones naturam demonstrationum hujus generis perspiciant. Sit nimirum demonstranda aequalitas inter aream circuli et productum ex ejus semiperipheria in radium.

A) Radius circuli sit r et π ejus peripheria, X autem area. Si p denotet perimetrum cujuscunque polygoni regularis circulo inscripti, et P perimetrum polygoni similis eidem circulo circumscripti; erit evidenter tam $\pi > p$ et $\pi < P$, quam $X > \frac{1}{2}pr$ et $X < \frac{1}{2}Pr$.

B) Sint $D = P - \pi$ et $d = \pi - p$ differentiae inter peripheriam circuli et perimetros polygonorum in (A); erit $P = D + \pi$, et $p = \pi - d$; igitur in (A) erit etiam $X > \frac{\pi r}{2} - \frac{dr}{2}$ et $X < \frac{\pi r}{2} + \frac{Dr}{2}$.

(a) Beiträge zur Beförderung des Studiums der Mathematik. 3tes Stück. S. 193, 194.

C) Clarum porro est, rectas aequales differentiis D, d in (B) eo minores fieri, quo propius polygona in (A) accedunt ad circulum, neque difficulter demonstratur, pro quavis cogitabili lineola recta z talia polygona in (A) esse possibilia, pro quibus quaevis rectarum D, d minor sit lineola z , consequenter etiam $\frac{Dr}{2} < \frac{zr}{2}$, $\frac{dr}{2} < \frac{zr}{2}$.

D) Porro nulla est cogitabilis tam parva superficies e , pro qua et quovis dato radio r non sit possibilis ejusmodi lineola recta z , quae det $\frac{1}{2}rz < e$. Cum enim absurdum sit de superficie e cogitare, quin in hac tria puncta existant, quae nec in una recta jaceant, neque in unum punctum confluant; evidenter pater, pro quavis quantumlibet parva superficie e possibile esse triangulum, puta altitudinis a et baseos b , quod minus sit superficie e , nimirum $\frac{1}{2}ab < e$. Quantumcunque porro parvae sint lineolae b, a , cum illas cum punctis confundere non liceat; necesse est, ut pro dato quovis radio r possibilis sit quarta proportionalis z ad r, b, a , quo fiat $r:b=a:z$, hinc $rz=ba$, et $\frac{1}{2}rz=\frac{1}{2}ba$; proinde etiam $\frac{1}{2}rz < e$.

E) Quare evidens est, semper esse possibilem lineolam rectam z , pro qua dimidium $\frac{1}{2}rz$ rectanguli rz minus sit quavis utcumque parva superficie e per (D): igitur erunt possibiles rectae D, d , pro quibus sit tam dimidium $\frac{1}{2}Dr$ rectanguli Dr , quam dimidium $\frac{1}{2}dr$ rectanguli dr minus quavis cogitabili superficie e per (C), quod est impossibile, quin sit $X=\frac{1}{2}\pi r$ ob (B) per (129. §.).

2. Hoc modo procedes, quotiescunque principium in (129. §.) demonstratum ad evincendam aequalitatem duorum quantorum Z, X applicare volueris. Quare ante omnia, an non dentur duo quanta variabilia U, V , pro quibus semper sit $Z > X - U$ et $Z < X + V$ vel $Z < X - V$, quoscunque valores quanta U, V obtineant: tum disquire sedulo, utrum haec quanta ejus naturae sint, ut quodvis illorum quolibet quanto utcumque parvo minus possit fieri. Si enim haec evicta fuerint, constabit eo ipso, quanta Z, X inter se debere aequari, ita ut absurdum sit differentiam aliquam inter illa statuere, utcumque parva ea esse dicatur, determinabilis, vel indeterminabilis (129. §.), qualem *Michelsenus* in praecedente exemplo a circulo petito sibi imaginatur. Videamus jam, quanta sit hujus methodi vis in promovenda methodo inventionis, si illa ad differentias function-

functionum rite applicetur, quae disquisitio eo plus utilitatis habere censenda est, quo evidentius inde et genuinum objectum calculi differentio-integralis, et sufficientia methodi exhaustionis veterum ad constabilienda hujus calculi principia potest colligi.

3. Plerique analytæ, duce *Leibnizio* calculi differentialis inventore, universum hunc calculum circa infinite parvas differentias quantitatum variabilium et functionum versari arbitrantur, cujus systematis principia palmaria ad sequentia capita possunt revocari.

A) Si a denotet quamcunque quantitatem *finitam*, qua et major et minor sit assignabilis; et m sit numerus integer quiscunque; erit $\frac{a}{m} = x$ pars *mta* quantitatis a , eaque eo minor, quo major fuerit numerus m . Data jam utcunque parva quantitate e possibilis erit numerus integer m , pro quo valor fractionis $x = \frac{a}{m}$, consequenter etiam quævis fractionum $\frac{a}{m^2}$, $\frac{a}{m^3}$, $\frac{a}{m^4}$, etc. fiat minor quantitate e : si ergo cogitetur numerus m indefinenter crescere, licebit hac via ad numerum infinite magnum $m = \infty$, nimirum omni dabili majorem, et quantitates *infinite parvas* $\frac{a}{\infty}$, $\frac{a}{\infty^2}$, $\frac{a}{\infty^3}$, $\frac{a}{\infty^4}$, etc., seu omni dabili minores, mente adproximare, inter quas idcirco et finitas quantitates ejusmodi intercedet relatio, ut quælibet quantitas infinite parva $\frac{a}{\infty^n}$ tam respectu quantitatis cujuscunque finitæ, quam respectu infinitæ parvæ inferioris ordinis $\frac{a}{\infty^{n-1}}$ perfecte debeat evanescere.

B) Quamobrem licebit etiam datam quamcunque quantitatem variabilem x incremento infinite parvo $\frac{x}{\infty}$ augere, quo quævis ejus functio y certa quantitate mutetur, nimirum crescat vel decrescat: quantitatem hanc vocant *Differentiale functionis* y , et incrementum $\frac{x}{\infty}$ variabilis x *Differentiale variabilis* x , illudque designant signo dy , et istud signo dx . *Calculus differentialis* complectitur methodum inveniendi differentialia functionum, et *Calculus integralis* methodum investigandi functiones, quarum data sint differentialia.

C) Facillimum vero est in hoc systemate differentialia quarumvis functionum investigare. Cogitetur enim variabilis x augeri incremento

infinite parvo $dx = \frac{x}{\infty}$, et a valore, y' quem functio y induat, variabili x in $x+dx$ abeunte, subtrahatur ipsa functio y ; residuum $y' - y$ dabit differentiale dy functionis y per (B), quod simplicissime exprimes, si, perfecta reductione residui $y' - y$, summis formae $\alpha + \beta dx + \gamma dx^2 + \delta dx^3 + \text{etc.}$ quantitates finitas α , et summis formae $\beta dx + \gamma dx^2 + \delta dx^3 + \text{etc.}$ quantitates infinite parvas βdx substituas, ob (B et A).

E. gr. Si petas differentiale dy functionis $y = ax^3$; erit

$$y' = a(x+dx)^3 = ax^3 + 3ax^2 dx + 3ax dx^2 + a dx^3:$$

$$\text{igitur } y' - y = 3ax^2 dx + 3ax dx^2 + a dx^3,$$

$$\text{seu } dy = 3ax^2 dx$$

$$\text{Pro } y = \frac{x}{1-x^2} \text{ autem erit}$$

$$\frac{x+dx}{1-(x+dx)^2} - \frac{x}{1-x^2} = y' - y = dy:$$

$$\text{igitur } dy = \frac{(1+x^2)dx + x dx^2}{(1-x^2)^2 - 2x(1-x^2)dx - (1-x^2)dx^2}$$

$$\text{seu } dy = \frac{(1+x^2)dx}{(1-x^2)^2}.$$

4. Nihil hoc calculo simplicius poterat excogitari, seu inventionem differentialium datarum functionum, seu illarum, quae incognitis functionibus competant, investigationem consideres: verum fundamenta ejus acerrimo inter ipsos illorum patronos bello occasionem praebuere, ad quod generatim inter analytistas excitandum fovendumque notiones infinite parvorum aptissimae esse videntur. Sunt, qui duce *Eulero* omnes quantitates infinite parvas nihilo aequari judicant, ita tamen, ut eo non obstante diversae rationes geometricae inter ipsas possint intercedere. Aliis contra absurdus esse videtur nihilorum calculus, absurdumque, ut una duarum quantitatum infinite parvarum, inter quas, utpote aequales nihilo, nulla intercedat magnitudinis differentia, *ntupla* possit esse alterius. Quamobrem propugnant ii, omnem quantitatem infinite parvam esse quantum sui generis, omni quidem dabili minus, non tamen aequale nihilo: nec metuunt, ne ob neglectum infinite parvorum respectu finitorum infiniteque parvorum inferioris ordinis (3) calculus erroneus reddatur; error enim, inquiunt, qui hic committi videtur, est infinite parvus, consequenter

quenter omni dabili minor, et ideo nullus. Ast, ne nimio opere a scopo hujus introductionis abducamur, assumamus explorandam vim methodi exhaustionis veterum in usu differentiarum finitarum, quo evidentius pateat, utrum et qua ratione calculi differentio-integralis principia ad genuina methodi exhaustionis veterum principia possint revocari, quod unico exemplo illustrasse sufficiet.

5. Pro quibuscumque duobus quantis P, Q dabitur numerus integer m , quo summa $P \frac{1}{m} + Q \frac{1}{m^2}$ fiat minor quavis utcumque parva quantitate e .

Semper enim erit tertium quantum Z possibile, quod majus sit quolibet quanto P, Q seorsim sumto: erunt ergo quanta Z, P, Q sic comparata, ut pro illis sit $Z \frac{1}{m} + Z \frac{1}{m^2} > P \frac{1}{m} + Q \frac{1}{m^2}$.

Cum vero sit $Z \frac{1}{m} > Z \frac{1}{m^2}$, adeoque $Z \frac{1}{m} + Z \frac{1}{m} > Z \frac{1}{m} + Z \frac{1}{m^2}$; erit eo ipso etiam $2Z \frac{1}{m} > P \frac{1}{m} + Q \frac{1}{m^2}$.

Quantumcumque porro magnum sit quantum $2Z$, et utcumque parvum e , possibilis erit numerus integer m , pro quo sit $2Z \frac{1}{m} < e$: pro eodem numero erit ergo a fortiori $e > P \frac{1}{m} + Q \frac{1}{m^2}$.

6. Data aequatione $y^2 = Ax \pm Bx^2$ ad curvam BPC (18. Fig.) inter Fig. 19. ejus coordinatas orthogonas $y = Pa, x = Ba$, cujus revolutione circa axem BE generetur corpus rotundum CBD ; invenire soliditatem segmenti BPP plano $PmpnP$ ad axem BE perpendiculari abscissi.

Solutio. I. Soliditas quaesita sit $S = BPnmpmP$, quae variabili $x = Ba$ crescente quacunque differentia $\Delta x = ab$ crescat differentia $\Delta S = Pmpncserec$: erit ΔS major cylindro baseos $PmpnP$ et altitudinis $ab = \Delta x$, et simul minor cylindro baseos $resc$ et altitudinis $ab = \Delta x$: cum igitur, pro ratione radii ad semiperipheriam $= 1:\pi$, sit $\pi.Pa^2.\Delta x$ soliditas cylindri prioris, et $\pi.r.b^2.\Delta x$ soliditas posterioris; debet esse semper

$$\Delta S > \pi.Pa^2.\Delta x; \text{ et } \Delta S < \pi.r.b^2.\Delta x.$$

II. Sed per hypothesim debent ordinarum Pa, rb abscissis $x=Ba$, $x+\Delta x=Bb$ respondentium quadrata esse $Pa^2=A x \pm B x^2$, $rb^2=A(x+\Delta x) \pm B(x+\Delta x)^2$; igitur erit semper etiam

$$\Delta S > \pi(A x \pm B x^2) \Delta x;$$

$$\text{et } \Delta S < \pi(A(x+\Delta x) \pm B(x+\Delta x)^2) \Delta x.$$

III. Si porro haec omni casu debent subsistere, quemcunque valorem habeat differentia $\Delta x=ab$; necesse est, ut eadem locum habeant, si, variabili $x=Ba$ in numero m partes aequales mente divisa, differentia $\Delta x=ab$ uni *mtae* parti ejusdem variabilis aequetur, adeoque ponatur $\Delta x = \frac{x}{m}$.

IV. Quodsi autem Ba in numero m , et Bb in $m+1$ partes aequales mente dividatur, quarum quaevis sit $=\Delta x$, et per singula puncta divisionis cogitentur duci sectiones ad axem perpendiculares, ut $PmpnP$, res cr per puncta a, b ; dividetur eo ipso $S=B P n p m P$ in numero m partes, et $Brcsr=S+\Delta S$ in partes numero $m+1$, quae sic debebunt esse comparatae, ut, si in ΔS terminos seriei $\Delta x.0, \Delta x.1, \Delta x.2, \dots, \Delta x.(m-1)$ loco x successive substituas, numero m partes segmenti $S=B P n p m P$ ordine sis obtenturus.

V. Hinc ergo (IV) et ex (II) evidenter elucet, soliditatem S pro quovis possibili numero integro m in (III) majorem esse summa omnium valorum, quos functio

$$\pi(A x + B x^2) \Delta x$$

successive induet, si in illa termini seriei $\Delta x.0, \Delta x.1, \Delta x.2, \dots, \Delta x.(m-1)$ loco x successive substituantur; et simul minorem summa omnium valorum, quos in eadem hypothesi functio

$$\pi(A(x+\Delta x) \pm B(x+\Delta x)^2) \Delta x$$

debebit obtinere. Quare habebimus

$$S > \pi \left(A(1+2+3+\dots+(m-1)) \Delta x^2 \right. \\ \left. + B(1^2+2^2+3^2+\dots+(m-1)^2) \Delta x^3 \right)$$

$$S < \pi \left(A(1+2+3+\dots+m) \Delta x^2 \right. \\ \left. + B(1^2+2^2+3^2+\dots+m^2) \Delta x^3 \right)$$

Et sumtis serierum summis fiet

$$S > \pi \left(\frac{1}{2} A (m^2 - m) \Delta x^2 \pm \frac{1}{6} B (2m^3 - 3m^2 + m) \Delta x^3 \right);$$

$$S < \pi \left(\frac{1}{2} A (m^2 + m) \Delta x^2 \pm \frac{1}{6} B (2m^3 + 3m^2 + m) \Delta x^3 \right).$$

Cumque sit $\Delta x = \frac{x}{m}$; erit etiam

$$S > \frac{1}{2} \pi A x^2 \pm \frac{1}{2} \pi B x^3 - U;$$

$$\text{et } S < \frac{1}{2} \pi A x^2 \pm \frac{1}{2} \pi B x^3 + V;$$

$$\text{pro } U = \frac{1}{2} \pi x^2 (A \pm Bx) \frac{1}{m} \mp \frac{1}{6} \pi B x^3 \frac{1}{m^2};$$

$$\text{et } V = \frac{1}{2} \pi x^2 (A \pm Bx) \frac{1}{m} \pm \frac{1}{6} \pi B x^3 \frac{1}{m^2}.$$

VI. Hinc, quia quodvis quantorum U, V in (V) potest fieri minus quolibet utcumque parvo quanto e per (5), necessario sequitur esse $S = \frac{1}{2} \pi A x^2 \pm \frac{1}{2} \pi B x^3$ per (2).

7. Si utramque expressionem in (6. n. II.) per Δx dividamus, obtinebimus pro quotiente $\frac{\Delta S}{\Delta x}$ sequentes conditiones, posita differentia $\Delta x = \frac{x}{m}$.

$$\frac{\Delta S}{\Delta x} > \pi (A x \pm B x^2);$$

$$\frac{\Delta S}{\Delta x} < \pi (A x \pm B x^2) + (A \pm 2 B x) x \frac{1}{m} \pm B x^2 \frac{1}{m^2}.$$

Ob primam conditionem debet necessario extare certa differentia

$$\frac{\Delta S}{\Delta x} - \pi (A x \pm B x^2) = D, \text{ pro qua sit}$$

$$\frac{\Delta S}{\Delta x} = \pi (A x \pm B x^2) + D;$$

igitur ob secundam conditionem

$$D < (A \pm 2 B x) x \frac{1}{m} \pm B x^2 \frac{1}{m^2}.$$

Quamobrem, cum id semper debeat subsistere, utcumque parva sit pars mta $\Delta x = \frac{x}{m}$ variabilis x , quantumlibet idcirco magnus sit nu-

merus integer m ; cumque semper sit numerus m possibilis, pro quo
 $(A \pm 2 Bx) x \frac{1}{m} \pm Bx^2 \frac{1}{m^2}$ valorem minorem quovis utcumque parvo
 valore e obtineat (ζ): evidens est, differentiam D inter $\frac{\Delta S}{\Delta x}$ et $\pi(Ax$
 $\pm Bx^2)$ minorem quavis utcumque parva quantitate e posse fieri, conse-
 quenter functionem $\pi(Ax \pm Bx^2)$ esse limitem omnium mutationum, quas
 exponens $\frac{\Delta S}{\Delta x}$ rationis $\Delta S : \Delta x$ successive potest subire, si $\Delta x = \frac{x}{m}$ indefi-
 nenter decrescat, numero m perpetuo crescente (68. §. Elem.).

8. Parī ratione, si opus esset, liceret usum principiorum methodi
 exhaustionis veterum ad omnes casus extendere, ad quos fundamentalia cal-
 culi differentio - integralis praecepta solent adplicari, quin sit necessarium ad
 notiones infinite parvorum refugere, quorum ne vestigium in ejusmodi dis-
 quisitionibus reperies. Ex hoc autem unico exemplo evidenter colligimus,
 possibile esse, ut principia calculi differentio - integralis eadem certitudine
 et evidentia geometrica, quam in Archimedeis disquisitionibus admiramur,
 constabillantur, si objectum hujus calculi ita determinetur, ut ille perpe-
 tuo circa solos limites versari debeat, ad quos exponentes rationum
 $\Delta y : \Delta x$ inter differentias Δy functionum y et differentias Δx variabilium
 absolutarum x (4. §. Elem.) intercedentium indefinenter adpropinquent,
 differentiis Δx continuo decrescantibus; tum ad evolutionem eorundem
 limitum et proprietatum, quibus ii sint praediti, methodus exhaustionis
 veterum rite applicetur. Limites ejusmodi genuinum esse, idque unicum
 rationi consentaneum, objectum calculi differentialis, communis est cele-
 berrimorum Analystarum sententia. Alii illam diserte profitentur, prin-
 cipiaque calculi differentialis ex ipsis talium limitum notionibus derivant:
 alii vero eam tacite amplectuntur, inter quos perspicacissimus *La Gran-*
gius eminet. Negat enim *Lg Grangius* in sua theoria functionum
 analyticarum ^(a), principia calculi differentialis certitudine evidentia-
 que geometrica constabilliri, si illa ipsis limitum notionibus superstruan-
 tur; quocirca alia, is methodo, independente ab his notionibus, functio-
 nes

(a) *Théorie des fonctions analytiques, contenant les principes du calcul diffé-*
rentiel, dégagés de toute considération d'infinitement petits ou d'évanouissans,
de limites ou de fluxions, et réduits à l'analyse algébrique de quantités
finies.

s diverforum ordinum ex quavis functione primitiva evolvere docet, quae nihil sunt aliud, quam limites mutationum in exponentes $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, $\frac{\Delta^2 y}{\Delta x^2}$, $\frac{\Delta^3 y}{\Delta x^3}$, etc. ob differentiam Δx continuo decrecentem redundantium: eapropter ipse *La Grangius* suum calculum functionum eundem cum calculo differentiali esse pronunciat, quod *III. La Croix* in suis institutionibus calculi differentio-integralis ^(a) insigniter illustravit, *La Grangianum* calculum ad evolutionem principiorum calculi differentialis adplicans.

9. Verum veniam dabit Vir celeberrimus, si ei in re tanti momenti contradicam, notionesque genuinas limitum, de quibus hic sermo est, tales esse judicem, ut ex illis principia calculi differentialis omni rigore certitudineque et evidetia, cujus disquisitiones analyticae capaces sunt, possint derivari, ita ut calculus hic, iisdem notionibus superstructus, totus elementaribus principiis analyticos finitorum innitatur. Quicumque enim hactenus id praestare adnisi sunt, in eo mihi peccasse videntur, quod a definitionibus rationum differentialium immediate ad illarum investigationem transiverint, et saepenumero in hac investigatione notionibus sint usi, quae cum rigore, quo principia calculi differentialis erant constabilienda, nullo pacto possunt conciliari. *Clarissimum L'Huilierum* inter recentiores excipio, qui ante omnia generales limitum pro quantis rationibusque variabilibus proprietates evolvere est conatus, quo fundamenta solida constabiliret, quibus investigatio rationum differentialium posset inniti ^(b). Ast utrum haec aliquid et quantum ponderis habeant, ex sequenti commentationuncula elucebit, quae et ipsam methodum, qua in constabiliendis principiis calculi differentio-integralis utor, et ejus vim in evincendis veritatibus illustrabit.

C 2

10. Bina

(a) *Traité du Calcul différentiel et intégral.*

(b) *Exposition élémentaire des principes de calculs supérieurs, qui a remporté le prix proposé par L'Académie Royale de Sciences et Belles-Lettres pour L'Année 1786. à Berlin.*

Principiorum calculi differentialis et integralis expositio elementaris ad normam dissertationis ab academia Scient. Reg. Prussica anno 1786. praemii honore decoratae elaborata. Tubingae,

10. Bina extant principia maximi momenti in universa functionum theoria, de quorum solida demonstratione parum hactenus erant Analystae solliciti: primum est, quod omnis functio variabilis z certae seriei formae generalis $Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$ aequetur: alterum vero, quod differentia Δy cujuslibet functionis y variabilis z alicui seriei formae $\alpha \Delta z + \beta \Delta z^2 + \gamma \Delta z^3 + \text{etc.}$ debeat esse aequalis. Neutrum principium est per se evidens: utrumque ego ideo in mea analysi ^(a) demonstrare adnissus sum, quo institutiones calculi differentio-integralis firmis fundamentis possent superstrui. Neglexit hoc *L'Huillierus*, quamvis is utroque principio ad evincendum theorema Taylorianum usus sit, quod eo minus possum adprobare, quo amplior est apud illum usus hujus theorematis ^(b). *La Grangius* contra, ne a nondum evicto principio suam functionum theoriā ordiatur, demonstrare conatur, pro quavis functione fx variabilis x , si $f(x+i)$ denotet valorem, quem illa obtineat, variabili x in $x+i$ abeunte, esse $f(x+i) = fx + pi + qi^2 + ri^3 + \text{etc.}$, ita ut in hac serie solae potentiae exponentium integrorum et positivorum incrementi i possint contineri ^(c): ast multa mihi in hac demonstratione displicent.

1°. Tota demonstratio aequationum theoriae innititur, quae ob exponentes potentiarum $i, i^2, i^3, \text{etc.}$ in infinitum crescentes nequit hic eam evidentiam et certitudinem parere, qua fundamentale totius calculi functionum principium erat demonstrandum.

2°. Porro est tota demonstratio tantum ad impossibilitatem potentiarum fractarum $i^{\frac{1}{n}}$ evincendam concinnata, quin inde ulla ratione possit elucere, utrum series exprimens functionem $f(x+i)$ terminum aliquem pi primam potentiam incrementi i completentem necessario debeat habere, cum tamen, nisi ejusmodi terminus adsit, universus calculus vacillet.

3°. Ponamus demum, *La Grangium* solidissime evicisse non posse fieri, ut $f(x+i)$ aequetur alicui seriei formae $fx + pi^a + qi^b + ri^c + \text{etc.}$,
in

(a) Unterricht in der mathematischen Analysis. 2ter Band, aufs Jahr 1791; und Beylage aufs Jahr 1798.

(b) Principiorum Calc. Diff. et Integr. Expositio etc. 32. 33 §.

(c) Théorie des fonctions analytiques etc. 10. §.

in qua exponentes fracti occurrant: estne ideo evictum, functionem $f(x+i)$ aequari seriei $fx + pi + qi^2 + ri^3 + \text{etc.}$? minime: nihil enim aliud inde sequitur, quam quod nullus exponentium $a, b, c, \text{etc.}$ possit esse fractus, si functio $f(x+i)$ certae seriei formae $fx + pi^a + qi^c + ri^c + \text{etc.}$ aequetur; utrum autem re ipsa extet ejusmodi series, nullibi demonstratum invenio.

11. Eapropter, ut tyrones a primis vulgaris algebrae elementis ad adaequatam distinctissimamque cognitionem principiorum calculi differentio-integralis via brevissima ducerem, exposui in primo elementorum hujus calculi capite palmares functionum proprietates, explicationemque functionum algebraicarum, logarithmicarum, exponentialium et trigonometricarum per series methodo simplicissima docui; tum, qua ratione principiorum, de quibus in (10) erat sermo, veritas potest evinci, in (63. 66. §.) ostendi. Quod in specie ad theorema binomiale attinet, habes illud pro quolibet exponente rationali et irrationali m in (51. §.) methodo inventionis demonstratum, ita ut adversus hujus simplicissimae demonstrationis rigorem nihil possit obici. Cardo enim totius demonstrationis in (n. 3.) consistit, ubi generatim supposui, arithmetica universalem ita esse excultam, ut inde facile eluceat, cur pro omni exponente m , et quibuslibet quantis u, v , debeat esse $\frac{u^m}{v^m} = \left(\frac{u}{v}\right)^m$: qui de hujus principii veritate dubitat, neque concipere potest, quo modo id demonstrare liceat; praecipua quaeque principia arithmeticae universalis, ut e. gr. $a^m b^m = (ab)^m$; $a^m a^n = a^{m+n}$, $\text{Log } r^m = m \log r$; $\log \frac{r}{s} = \log r - \log s$; et similia in dubium vocet oportet, quae utique nequeunt subsistere pro omnibus exponentibus, quin sit e. gr. $\log \frac{u^m}{v^m} = \log u^m - \log v^m = m \log u - m \log v = m \log \frac{u}{v} = m \log \left(\frac{u}{v}\right)$, adeoque necessario $\frac{u^m}{v^m} = \left(\frac{u}{v}\right)^m$.

12. Hinc jam ad ipsam expositionem principiorum calculi differentialis in secundo capite progredior. Ante omnia expono adoptatas et methodo exhaustionis veterum consentaneas definitiones *limitum* pro quantis et rationibus variabilibus (68. 69. §.), ex quibus evidentissime principia generalia sequuntur, quae usque ad (78. §.) evolvo. Tum, praemissa definitione rationis differentialis (79. §.), assumtoque pro ejus exponente signo simplicissimo, totus in eo occupor, ut illas rationum differentialium proprietates generales paucis explicem et evincam, quibus universus

differentio-integralis calculus innititur (80 - - - 102. §.): ex his demum proprietatibus praecepta universi calculi differentialis per se indidem evidentissime fluentia elicio (103 - - - 159. §.). Peculiarem vero operam adhibui, ut universalem eamque planissimam methodum quaerendi exponentes rationum differentialium functionibus incognitis debitarum docerem, illamque ad ejusmodi principia revocarem, de quorum certitudine evidentiaque dubitare sit impossibile (129 - - - 132. §.). Quantam haec principia vim in evincendis veritatibus habeant, si illa ad geometricas disquisitiones rite applicentur, ostendi in postremis duobus capitibus: possunt autem illa eadem facilitate perspicuitateque ad generalia totius mechanicae fundamenta constabilienda adplicari, quin necessarium sit, tempora, spatia, celeritates, et similia in statu evanescentiae considerare, illaque ut infinite parva vel evanescencia inter se comparare.

13. Hoc modo investigatio rationum differentialium ad duo generalissima principia analytica revocatur (82. 131. §.). Vel enim functio y relata ad variabilem absolutam x (4. §.) datur, vel penitus ignoratur. Casu primo ponatur in illa ubique $x + \Delta x$ loco x , quo ipso obtinebitur differentia $\Delta y = y' - y$. Haec jam differentia ita transformetur, ut perspicue constet, ipsam certae seriei formae $P\Delta x + A\Delta x^2 + B\Delta x^3 + C\Delta x^4 + \text{etc.}$ aequari, in qua terminus primus $P\Delta x$ perfecte sit determinatus, seu coefficientes $A, B, C, \text{etc.}$ reliquorum terminorum noscantur seu non, modo ii a differentia Δx sint independentes. Quodsi enim reipsa sit $\Delta y = P\Delta x + A\Delta x^2 + B\Delta x^3 + \text{etc.}$; erit eo ipso $\epsilon y = P = P\epsilon x$ exponents rationis differentialis functionis y (82. 81. §.).

14. Si autem ignoretur functio y variabilis absolutae x ; ignorabitur quoque expressio illius differentiae Δy . Hoc casu investigetur, annon existent binae functiones U, V differentiae Δx , inter quas incognita differentia Δy sic jaceat, ut pro quovis utcumque parvo valore differentiae Δx sit

$$\Delta y > U \text{ et simul } \Delta y < V.$$

Tum determinentur expressiones earundem functionum U, V per $x, \Delta x$, et quantitates constantes, a quibus illae dependeant: expendantur eaedem expressiones diligentissime, ut certo constet, an non detur determinata aliqua quantitas X , constans vel aequalis certae functioni variabilis x , modo

modo illa sit independens a differentia Δx ; et an non sint praeterea aliae quantitates $e, f, g, \dots E, F, G$, etc. possibiles, quae a Δx non dependeant (licet eae ignorentur) sicque sint comparatae, ut pro illis nasci deberent series $X\Delta x + e\Delta x^2 + f\Delta x^3 + g\Delta x^4 + \text{etc.}$, $X\Delta x + E\Delta x^2 + F\Delta x^3 + G\Delta x^4 + \text{etc.}$ functionibus U, V aequales, quibus in praecedentibus expressionibus pro Δy substitutis fieret

$$\Delta y > X\Delta x + e\Delta x^2 + f\Delta x^3 + g\Delta x^4 + \text{etc.}$$

et simul

$$\Delta y < X\Delta x + E\Delta x^2 + F\Delta x^3 + G\Delta x^4 + \text{etc.}$$

Ut primum enim huiusmodi expressiones fuerint detectae, certoque constiterit, utramque simul pro quovis quantumlibet parvo valore differentiae Δx debere subsistere; certum etiam erit, X esse exponentem rationis differentialis incognitae functionis y , nimirum $\epsilon y = X = X \epsilon x$ (131. §.).

Sic e. gr. superius (6), licet ignoretur functio $S = BPn p m P$ variabilis $x = Ba$, certo tamen constat, illius differentiam ΔS ejusmodi esse, ut pro quovis valore differentiae Δx sit ΔS major cylindro baseos $P m p n$ et altitudinis Δx , et simul minor cylindro baseos $resc$ et altitudinis Δx , unde ibidem obtinuimus

$$\Delta S > \pi(Ax \pm Bx^2)\Delta x;$$

et simul

$$\Delta S < \pi(A(x + \Delta x) \pm B(x + \Delta x)^2)\Delta x.$$

Quamobrem erit etiam

$$\Delta S > \pi(Ax \pm Bx^2)\Delta x;$$

et simul

$$\Delta S < \pi(Ax \pm Bx^2)\Delta x \pm 2Bx\Delta x^2 \pm B\Delta x^3.$$

Atque ex his expressionibus evidenter jam per (131. §.) sequitur, exponentem rationis differentialis incognitae functionis S necessario esse

$$\epsilon S = \pi(Ax \pm Bx^2) = \pi(Ax \pm Bx^2) \epsilon x,$$

quod ipsum, ob (79. 70. §.), jam superius (7) invenimus.

15. Quod ad principia in (95 - - - 102. §.) demonstrata in specie attinet, ea nec per se sunt evidantia, ut demonstratione non habeant opus; neque

neque talia, ut ignorari possint, quin disquisitiones differentio-integrales eo ipso dubiae reddantur.

Sicut e. gr. investigatio logarithmorum datis numeris respondentium, et. numerorum datis logarithmis debitorum, in determinato quovis casu dubia deberet reddi, nisi constaret, uni eidemque numero unicum logarithmum, et vicissim cuivis logarithmo unum determinatum numerum, inaequalibus vero logarithmis inaequales numeros, et numeris inaequalibus inaequales logarithmos respondere: ita etiam incerta erit quovis determinato casu investigatio exponentium rationum differentialium pro certis functionibus, et harum pro datis exponentibus, nisi similia principia pro functionibus et illarum rationibus differentialibus evincantur, ut in (95--98. §.).

In (14) invenimus $eS = \pi(Ax \pm Bx^2)$ pro exponente rationis differentialis functionis S aequalis soliditati corporis $BPn^p mP$: si jam hunc exponentem ad detegendas certas proprietates ejusdem corporis adplicem; certitudo investigationis in eo profecto fundabitur, quod evidenter constet, illum exponentem ei duntaxat functioni posse respondere, quae soliditati corporis $BPn^p mP$ aequatur. Et si inde ope calculi integralis ipsam soliditatem eliciam, ponamque illam esse $S = \pi(\frac{1}{2}Ax^2 \pm \frac{1}{3}Bx^3) + C$; erit haec determinatio ideo certa et evidens, quia certo constat, dato exponenti $eS = \pi(Ax \pm Bx^2)$ nullam aliam functionem posse respondere (97. 98. §.).

Deinde si quacunque methodo exponentem $sy = \alpha ez$ rationis differentialis functionis y datae per variabilem z determines; nisi principia in (99 - - 102. §.) evicta sint, haud licebit $ez = \frac{ey}{\alpha}$ inde derivare, et $\frac{ey}{\alpha}$ pro exponente rationis differentialis quantitatis z spectatae instar unius functionis variabilis y habere, quod tamen in quamplurimis disquisitionibus theoretico-practicis solet fieri.

Ea propter expositionem horum principiorum (95-- - 102. §.) non utilem duntaxat, sed etiam necessariam esse arbitror, incauteque illam hactenus a plerisque Analystis neglectam esse censeo: quodcunque systema amplectaris, similia principia necessario erunt tibi evincenda, nisi universum systema vacillantibus fundamentis velis superstruere.

16. Quamobrem id me in primis duobus capitibus perspicue ostendisse judico, principia universi calculi differentio-integralis ex ipsis limitum notionibus, independenter ab omni infmite parvorum evanescentiumque notione,

notione, sic posse derivari, ut illa firmissimis fundamentis analyticos finitorum innituntur, idque methodo aequae simplici ac universali posse praestari. Seu enim generalem theoriam ibidem expositam (68 -- 102. §.), seu illius adplicationem ad investigationem exponentium rationum differentialium datis quibuscunque functionibus, algebraicis, logarithmicis, exponentialibus, et trigonometricis, atque ex his quoque modo compositis debitarum (103 -- 126. §.) attente expendas; seu demum methodum, qua exponentes differentiales functionibus incognitis respondentes investigo (14), ad examen voces: nullibi ne vestigium aut incrementorum infinite parvorum vel evanescentium, aut rationum inter illa intercedentium observabis, nisi notionibus adaequate determinatis, rationique et methodo exhaustionis veterum geometrarum consentaneis, quibus perpetuo utor, alias peregrinas substituas, de quibus eo minus mihi vel somnare licuit, quo minus eae cum ratiociniis, quibus singula principia evincere conatus sum, possunt conciliari.

17. Superius jam animadverti, *functiones derivatas*, quae objectum *La Grangiani* calculi functionum constituunt, nihil aliud esse, quam exponentes rationum, quas ego cum aliis Analystis in his elementis *differentiales* voco: nisi ergo de nomine litem velis movere, facile admittes, circa hos ipsos exponentes eundem calculum versari, eo duntaxat discrimine, quod *La Grangius* neque naturam illorum ex limitum notionibus determinet, neque regulas, per quas ii pro datis quibuscunque functionibus primitivis inveniri possunt, ex iisdem notionibus derivet. Verum, licet ego plene sim convictus, id tam methodo *La Grangiana*, quam alia quoque multo simpliciori, cujus specimen alia occasione dedi ^(a), posse praestari, modo et illa et haec uberius excolatur; non video, cur id sit necessarium, eo minus sane, cum certo constet, utrobique ad limitum principia esse refugiendum, utprimum calculus ad functiones incognitas applicatur. *La Grangius* enim conatur demonstrare, valorem $f(x+i)$, quem

(a) Archiv der reinen und angewandten Mathematik; herausgegeben von C. F. Hindenburg. Aechtes Heft, aufs Jahr 1798.

quem quaecunque functio fx variabilis x debet induere, si ipsa variabilis x capiat incrementum i , ejusmodi seriei $fx + ip + i^2q + i^3r + \text{etc.}$ aequari, in qua incrementum i sic poterit omni casu determinari, ut quivis terminus major evadat quam summa omnium sequentium terminorum: atque istud principium vocat is *theoremata fundamentale* totius suae theoriae functionum, quod, ex ejus mente, tacite tam in *Leibniziano* calculo differentiali, quam in *Newtoniano* calculo fluxionum praesupponitur ^(b). Utrumque certum est, et ego ipse ejusmodi theoremata in (75. 77. §.) ex genuinis principiis (independenter ab omni curvarum theoria, cujus principia in disquisitionibus hujus generis aequae ac principia mechanicae peregrina esse censeo) evinco, tum bina inde principia generalia elicio (82. 131. §.), eorumque uni investigationem exponentium rationum differentialium pro datis quibuscunque functionibus, alteri vero inventionem eorundem pro functionibus incognitis superstruo, ut superius (13) (14) exposui: at an non ex his evidenter elucet, *La Grangium* investigationem suarum functionum *derivatarum*, tum praecipue, dum functiones *primitivae* ignorantur (quod plerumque fit in adplicationibus ad geometriam et mechanicam), genuinis principiis doctrinae limitum superstruere? an non ergo consultius est totum systema a limitum notionibus ordiri, iisdemque universum calculum superstruere? .

18. Sed ne mihi in hac principiorum calculi differentialis expositione aliquid adtribuere videar, quod aliis acceptum debeo referre; dicam paucis, quod de hoc meo qualicunque labore sentio. Superius jam animadverti, me in determinando genuino objecto calculi differentialis aliorum sententiam amplecti: nihil ergo novi propono adferens, universum calculum differentialem circa investigationem limitum rationum inter simultanea incrementa functionum variabiliumque absolutarum, ad quas illae relatae cogitantur, intercedentium versari: id enim *Newtonus* jam docuit, docentque scriptores recentissimi, *Eulerus* ^(c), *Kästnerus* ^(d), *Karstenius*

(b) *Theorie des Fonctions Analytiques.* 14 §.

(c) *Institutiones Calculi differentialis.*

(d) *Anfangsgründe der Analysis des Unendlichen.*

nus (e), et alii Viri celeberrimi. Cum autem sola gennini objecti determinatio ad constabilienda principia calculi differentialis minime sufficiat; nondum inde sequitur, eosdem Viros celeberrimos haec quoque principia ita constabilivisse, ut ea certis et evidentibus fundamentis, notionibusque, nusquam peregrinis, sed genuinis duntaxat et objecti naturae consentaneis inniti debeant vel possint censer. Ego quidem contrarium observavi, et praecipue in adplicatione eorundem principiorum ad geometriam et mechanicam; quamobrem non tantum utile, sed et necessarium esse arbitrabar, rigidiori examini omnia subiicere; doctrinam de limitibus quantorum rationumque variabilium magis excolere; generaliaque illius principia analytica, quorum vestigia in *Kästneri* et *Karstenii* insignibus operibus continuo se offerebant, ita constabilire, et methodo quoad fieri potest plana in unum systema redigere, ut universus calculus differentio-integralis nomen *calculi exactissimi* possit mereri, qui non tantum facili amplissimoque usu, sed etiam geometrica suorum principiorum certitudine evidentiaque sic se commendet, ut non sit cur notiones, quibus is innitur, contemni et derelinqui debeant.

19. De reliquo finis principalis, cujus gratia haec elementa conscripsi, erat, ut tyrones ad disquisitiones statico-mechanicas praepararem, quas sine sublimiori analysi nec excolere licet, neque excultas intelligere. Paucis multa exponere conatus sum, quin ideo obscurus fierem: omnia tamen, quae notari merebantur, explicare non poteram, ne arctos limites, intra quos me continere debebam, transgrederer. Cum autem maximum in disquisitionibus omnis generis pondus habeant elementa calculi differentialis, et calculi integralis restricti ad functiones unius variabilis; illa et haec peculiari industria evolvere, et sic enodare studui, ut adplicatio ipsorum facilis esset et commodissima: quapropter integralia maxime memorabilium exponentium differentialium non tantum ad generalia praecepta revocavi, sed singula plene determinavi, quo in adplicatione ad casus speciales sola substitutione esset


d 2


opus.

(e) Anfangsgründe der mathematischen Analysis.

opus. Reliqua, ut e. gr. adplicationem calculi differentialis ad theori-
am aequationum; integrationem exponentium differentialium ad plures
variabiles relatorum, etc. brevissime attigi, et geometriae sublimioris
primas tantum notiones illustravi. Non diffiteor itaque plurima in his
elementis desiderari, seu sola principiorum Analyseos et Geometriae
sublimioris cognitio, seu illorum usus in disquisitionibus statico-mecha-
nicis expendatur: spero tamen fore, ut quicumque haec, quae exposui,
meditate perlegerint, sibi quae familiaria reddiderint, facile prolixiora
aliorum Scriptorum opera intelligant, in quibus hujusmodi doctrinae
ex instituto pertractantur: in illorum autem gratiam, qui opusculis meis
statico-mechanicis uti voluerint, de iis, quae hic omittere debebam,
differam, ubi iis opus habuero.

ELEMENTA
THEORIAE FUNCTIONUM,
CALCULIQUE DIFFERENTIALIS.





CAPUT I.

DE

DISCRIMINE ET DIFFERENTIIS FUNCTIONUM, EARUMQUE EXPLICATIONE PER SERIES.

1. DEFINITIO.

Quantitates, circa quas universa analysi mathematica versatur, dividuntur in *constantes* et *variabiles*: illae eisdem perpetuo valores retinere censentur; hae vero indeterminati sunt valoris, possuntque quovis valores recipere, quin etiam nihilo aequari: priores plerumque initialibus, posteriores autem finalibus alphabeti literis designantur.

2. DEFINITIO.

Quaelibet expressio analytica alicujus quanti per quantitates constantes et variables, quomodocunque inter se connexas, vocatur *Functio* earundem variabilium: *Formam* functionis determinat ipse nexus inter quantitates constantes et variables, quas functio complectitur, intercedens.

3. Corollarium 1.

Omnis functio innumeros valores potest recipere, pendentes a totidem possibilibus valoribus quantitatum variabilium, quas illa continet (1. 2. §.): quaevis functio est ergo quantitas variabilis (1. §.).

4. Corollarium 2.

Quamobrem, dum certae quantitates variables aliarum variabilium functiones fuerint (3. §.), debent aliquae in se esse variables, independentes a novis variabilibus: quantitates hujusmodi intelligemus deinceps nomine *variabilium absolutarum*, ad quas, unam aut plures, quaelibet functio referri censetur.

Scholion.

Fig 1. Sic, si $y \equiv PQ$ denotet perpendicularum ex indeterminato puncto P peripheriae circuli radio $r \equiv AC$ descripti ad diametrum AB demissum, $x \equiv CQ$ vero partem diametri inter illud perpendicularum centrumque circuli C interceptam designet; erunt y, x duae rectae ita inter se connexae, ut, alterutra illarum crescente vel decrecente, altera eo ipso mutari debeat. Si jam illae mutationes, quae ex omnibus mutationibus possibilibus distantiae x in perpendicularum y possunt redundare, in considerationem vocentur; spectabitur x instar unius variabilis absolutae, quae, independentem ab omni alia variabili, quosvis possibiles valores possit recipere; y autem erit ejus functio $\equiv \sqrt{(r^2 - x^2)}$: si vero illarum mutationum ratio habeatur, quas distantia x debet subire, si perpendicularum y succellive mutari cogitetur; referetur x ad y ut functio $\equiv \sqrt{(r^2 - y^2)}$ ad variabilem absolutam.

5. DEFINITIO.

Operationes algebraicas vocant ordinarias operationes arithmeticas, ut sunt, Additio, Subtractio, Multiplicatio, Divisio, Elevatio ad potens, et Extractio radicum; omnes aliae operationes, quae non sunt algebraicae, appellantur *transcendentes*. Hinc *functiones algebraicae* dicuntur, quae ex quantitibus constantibus et variabilibus aut per solas operationes algebraicas, vel etiam per intermixtas transcendentes, quin tamen hae ipsas variables afficiant, inter se connexis componuntur: secus enim, si aliqua transcendens operatio afficiat quantitates variables, functiones quoque erunt *transcendentes*, inter quas functiones *trigonometricae*, *logarithmicae*, et *exponentiales* peculiarem merentur attentionem.

E. gr. Functiones ax , $x \sin a$, $x \log a$, x^a sunt algebraicae; et $a \sin x$, $a \log x$, a^x sunt functiones transcendentes.

Scholion I.

Palmaria principia trigonometrica, quorum amplissimus est usus per universam analysin mathematicam, quibusve etiam nos in sequentibus frequentissime utemur, sunt sequentia.

Assumpto circuli radio $\equiv 1$, positaque ejus semiperipheria $\equiv \pi$; erit

$$1. \pi \equiv 3,141592653589793 \text{ etc.}$$

$$2. \sin 0 \equiv \sin \pi \equiv 0; \sin \frac{1}{2}\pi \equiv 1.$$

3. $\text{Cof } 0\pi = 1$; $\text{Cof } \frac{1}{2}\pi = 0$; $\text{Cof } \pi = -1$.
 4. $\text{Sin } 0\pi = 0$; $\text{Sin } \frac{1}{2}\pi = 1$; $\text{Sin } \pi = 0$.
 5. $\text{Cof } 0\pi = \text{Cof } \pi = 1$; $\text{Cof } \frac{1}{2}\pi = 0$.
 6. $\text{Tang } 0\pi = \text{Tang } \pi = 0$; $\text{Tang } \frac{1}{2}\pi = \infty$.
 7. $\text{Cot } 0\pi = \infty$; $\text{Cot } \frac{1}{2}\pi = 0$; $\text{Cot } \pi = -\infty$.
 8. $\text{Sec } 0\pi = 1$; $\text{Sec } \frac{1}{2}\pi = \infty$; $\text{Sec } \pi = -1$.
 9. $\text{Cofec } 0\pi = \text{Cofec } \pi = \infty$; $\text{Cofec } \frac{1}{2}\pi = 1$.

Ceterum patebit ex sequentibus formulis, valorem cujuslibet functionis trigonometricae certi arcus per hujus sinum aut cosinum perfecte determinari: quodsi vero k denotet quaecunque terminum progressionis numericae 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc.; erit semper

$$10. \text{Sin } 2k\pi = \text{Sin } (2k+1)\pi = 0.$$

$$11. \text{Cofin } 2k\pi = 1; \text{Cof } (2k+1)\pi = -1.$$

Si retento radio = 1, dentur duo quicunque arcus, aut anguli a, b ; erit

$$12. \text{Sin } a^2 + \text{Cof } a^2 = 1.$$

$$13. \text{Sin } a = \sqrt{(1 - \text{Cof } a^2)} = \frac{\text{Tang } a}{\sqrt{1 + \text{Tang } a^2}}.$$

$$14. \text{Cof } a = \sqrt{(1 - \text{Sin } a^2)} = \frac{1}{\sqrt{(1 + \text{Tang } a^2)}}.$$

$$15. \text{Sin } v a = 1 - \text{Cofin } a.$$

$$16. \text{Cofin } v a = 1 - \text{Sin } a.$$

$$17. \text{Tang } a = \frac{\text{Sin } a}{\text{Cofin } a} = \frac{\text{Sin } a}{\sqrt{(1 - \text{Sin } a^2)}} = \frac{\sqrt{(1 - \text{Cofin } a^2)}}{\text{Cofin } a}.$$

$$18. \text{Cot } a = \frac{\text{Cofin } a}{\text{Sin } a} = \frac{1}{\text{Tang } a}.$$

$$19. \text{Sec } a = \frac{1}{\text{Cofin } a} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \text{Sin } a^2)}}.$$

$$20. \text{Cofec } a = \frac{1}{\text{Sin } a} = \frac{1}{\sqrt{1 - \text{Cofin } a^2}}.$$

$$21. \text{Sin } (a+b) = \text{Sin } a \text{Cof } b + \text{Cof } a \text{Sin } b.$$

$$22. \text{Cof } (a+b) = \text{Cof } a \text{Cof } b - \text{Sin } a \text{Sin } b.$$

$$23. \text{Tang } (a+b) = \frac{\text{Tang } a + \text{Tang } b}{1 - \text{Tang } a \text{Tang } b}.$$

$$24. \text{Sin } (a-b) = \text{Sin } a \text{Cof } b - \text{Cof } a \text{Sin } b.$$

$$25. \text{Cof } (a-b) = \text{Cof } a \text{Cof } b + \text{Sin } a \text{Sin } b.$$

$$26. \text{Tang } (a - b) = \frac{\text{Tang } a - \text{Tang } b}{1 + \text{Tang } a \text{ Tang } b}.$$

$$27. \text{Sin } 2a = 2 \text{Sin } a \text{ Cof } a = 2 \text{Sin } a \sqrt{1 - \text{Sin } a^2}.$$

$$28. \text{Cofin } 2a = \text{Cof } a^2 - \text{Sin } a^2 = 2 \text{Cof } a^2 - 1 = 1 - 2 \text{Sin } a^2.$$

$$29. \text{Tang } 2a = \frac{2 \text{Tang } a}{1 - \text{Tang } a^2}.$$

$$30. \text{Sin } \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{1 - \text{Cofin } a}{2}}.$$

$$31. \text{Cof } \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{1 + \text{Cofin } a}{2}}.$$

$$32. \text{Tang } \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{1 - \text{Cofin } a}{1 + \text{Cofin } a}} = \frac{\text{Sin } a}{1 + \text{Cofin } a}.$$

Sit h hyothenusa trianguli rectanguli; α , γ vero sint ejus catheti, et a , c anguli oppositi; erit

$$33. h = \frac{\alpha}{\text{Sin } a} = \alpha \text{Cofec } a.$$

$$34. \alpha = h \text{Sin } a = \gamma \text{Tang } a.$$

$$35. \gamma = \alpha \frac{\text{Cofin } a}{\text{Sin } a} = \alpha \text{Cot } a.$$

Porro sint a , b , c tria latera trianguli obliquanguli, et A , B , C , anguli iis oppositi; erit

$$36. a = \sqrt{(b^2 + c^2 - 2bc \text{Cofin } A)}.$$

$$37. \text{Tang } B = \frac{b \text{Sin } A}{c - b \text{Cofin } A}.$$

$$38. \text{Cofin } A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

Scholion 2.

Functiones hae (Schol. 1.) ad radium $= 1$ relatae vocantur *naturales*, nimirum sinus naturales, cosinus naturales, et sic porro: relatae vero ad quemcunque alium radium r appellantur *artificiales*. Functiones naturales, quibus deinceps constanter utemur, convertentur, ubi opus fuerit, in artificiales, iisdem angulis, arcubusque similibus debitas, atque ad quemcunque datum radium r relatas, si illae multiplicentur per radium r . Sic etiam quivis arcus radio $= 1$ descriptus convertetur in arcum similem descriptum radio r , si is ducatur in radium r .

E. gr.

E. gr. Sint a, b duo anguli, et functio $y = x \sin a^2 - \sqrt{(1 - x \cos b)}$ complectatur finum naturalem anguli a , et cosinum naturalem anguli b : quodsi jam functio y determinari debeat per finum artificialem anguli a , et cosinum artificialem anguli b , utrumque relatum ad datum radium r ; poni debet $\sin art a = r \sin nat a$, et $\cos art b = r \cos nat b$, hinc $\sin nat a = \frac{\sin art a}{r}$, et $\cos nat b = \frac{\cos art b}{r}$.

His enim valoribus in y substitutis obtinebimus $y = \frac{x \sin a^2}{r^2} - \sqrt{(1 - \frac{x \cos b}{r})}$, ubi $\sin a$ et $\cos b$ non amplius naturalem, sed artificialem, ad radium r relatum, finum anguli a , et cosinum anguli b denotabit.

Scholion 3.

Saepe fit, ut arcus anguli, et vicissim angulis arcus in calculis analyticis substituuntur, quod duplici modo potest praestari.

1. Si angulo recto $= 90^\circ$ pro unitate assumpto, ϕ denotet arcum e centro alicujus anguli α radio $= 1$ inter ejus crura descriptum; erit $\alpha = \frac{2\phi}{\pi}$, et $\phi = \frac{1}{2}\alpha\pi$ (1. Schol. 1. n.)

2. Quodsi autem angulus γ , pro quo arcus inter ejus crura radio $= 1$ descriptus aequetur eidem radio, pro unitate tanquam communis omnium angulorum mensura sumatur; poterit poni $\alpha = \phi$, denotante α quicumque angulum, et ϕ arcum inter ipsius crura radio $= 1$ descriptum; fecus erit $\alpha = \gamma\phi$, et $\phi = \frac{\alpha}{\gamma}$.

6. DEFINITIO.

Alia omnium functionum divisio, est in *integras* et *fractas*. Ut aliquis functio sit *integra*, requiritur, ut ea nulli fractioni aequetur, in cujus denominatore occurrant quantitates variables elevatae ad potentias exponentium positivorum.

E. gr. Functiones bx^2 ; $\frac{c-x^2}{11}$; $\frac{e}{x-2} = ex^2$ sunt integrae; contra fractae functiones sunt $\frac{a}{x} = ax^{-1}$; $\frac{a+bx}{c-x^2}$.

7. DEFINITIO.

Functiones dividuntur porro in *rationales* et *irrationales*, prout illae nullam aut aliquam irrationalitatem, afficientem quantitates variables, complectuntur.

E. gr. Functiones $ax^2 = ax^{\frac{2}{1}}$; $\frac{a+x\sqrt{c}}{\sqrt{e-x^2}}$ sunt rationales: functiones vero $\frac{a-b\sqrt{x}}{c-x^2}$; $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ sunt irrationales.

8. DEFINITIO.

Functio integra et rationalis (6. 7. §) erit *primi*, vel *secundi*, aut *tertii*, vel generatim *mti Ordinis*, seu *unius*, *duarum*, *trium*, m *dimensionum*, prout maxima summa exponentium quantitatuum variabilium in aliquo termino fuerit 1, vel 2, aut 3, vel generatim numerus integer m.

E. gr. Functio $a+x-y$ duarum variabilium x, y est *1mi* ordinis seu unius dimensionis: functiones autem $a+bx y$, $c+dx^2-ey^2$ sunt *2di* ordinis seu duarum dimensionum: et functio $a+bx-cx^2+exy^2$ est *3tii* ordinis seu trium dimensionum.

9. Corollarium.

Functio integra et rationalis unius variabilis x est *1mi*, *2di*, *3tii*, *4ti*, *mti* ordinis, si exponens maximae potestatis variabilis x est 1, vel 2, aut 3, vel 4, aut generatim numerus integer m (8. §).

10. DEFINITIO.

Functio fracta rationalis (6. 7. §.) est fractio *propria* seu *genuina*, aut *impropria*: prioris numerator est inferioris ordinis quam denominator: numerator vero posterioris ejusdem est aut altioris ordinis, quam denominator (8. 9. §.).

11. Corollarium.

Fractio impropria, si ejus numerator dividatur per denominatorem, resolvetur in duas partes, quarum una erit fractio propria, altera vero aut quantitas constans, aut functio integra, nisi fors numerator sit per denominatorem divisibilis, quo casu data functio fracta aut constanti cuipiam quantitati, aut integrae functioni aequabitur.

E. gr.

$$\begin{aligned} \text{E. gr. } \frac{ax^2 - 2x}{bx^2 - 1} &= \frac{a}{b} + \frac{\frac{a}{b} - 2x}{bx^2 - 1} \\ \frac{x^5 + 2x^3 - x + 1}{x^3 - 3x} &= x^2 + 5 + \frac{14x + 1}{x^3 - 3x} \\ \frac{x^2 - 1}{x - 1} &= x + 1. \end{aligned}$$

12. DEFINITIO.

Numerus dimensionum in quovis termino datae functionis est summa exponentium, quibus quantitates variables in eodem termino sunt praeditae. Hinc repetenda est divisio functionum in *homogeneas* et *heterogeneas*. Functio integra vocatur *homogenea*, si idem est dimensionum numerus in quovis ejus termino: functio autem fracta erit *homogenea*, si numerator et denominator fuerint functiones homogeneae, ejusdem aut diversi ordinis (8.9. §.).

13. DEFINITIO.

Denique notetur adhuc divisio functionum in *uniformes* et *multiformes*. Functio *uniformis* appellatur, quae pro quovis determinato valore quantitatis variabilis unum tantum valorem obtinet: *multiformis* vero functio vocatur, quae pro quolibet valore variabilis plures obtinet valores.

14. DEFINITIO.

Si variabilis absoluta x , ad quam functio y relata sit, crescere cogitur, debeat ipsa functio y mutari (nimirum crescere vel decrescere); omne incrementum, quod variabilis x supponitur capere, vocatur *Differentia variabilis* x , cujus signum est Δx : quantitas vero, qua functio y mutatur (crescit nimirum vel decrescit), dum variabilis x augetur incremento Δx , dicitur *Differentia functionis* y , quae simili signo Δy deinceps exprimitur.

15. Corollarium 1.

Differentia Δx variabilis absolutae x potest denotare quamvis partem variabilis x , ita e. gr. ut inter omnes possibiles partes aliquotas $\frac{1}{2}x$, $\frac{1}{3}x$, $\frac{1}{4}x$, $\frac{1}{5}x$, etc. nulla sit, cui Δx non possit aequari (14. §.).

16. Corollarium 2.

Quantitas constans C (1. §.) nullam recipit differentiam; quocirca debeat poni $\Delta C = 0$ (14. §.).

17. Corollarium 3.

Si y^r denotet valorem, quem functio y relata ad variabilem absolutam x , hac in $x + \Delta x$ abeunte, obtineat; differentia ejusdem functionis erit $\Delta y = y^r - y$, vel $\Delta y = y - y^r$, prout nimirum functio y , crescente variabili, pariter crescit vel decrescit (14 §.).

18. Corollarium 4.

Cum tamen sit $y - y^r = -(y^r - y)$, semper licebit differentiam Δy functionis y relatae ad variabilem absolutam x considerare instar incrementi, quod ipsa capit, dum variabilis x augetur incremento Δx , ita ut, si, x abeunte in $x + \Delta x$, y abeat in y^r , sit $\Delta y = y^r - y$, modo differentia hac ratione determinata sumatur cum signis contrariis, utprimum functio y ejuscemodi esse deprehenditur, ut illa, crescente variabili x , debeat decrescere (17. §.).

19. Corollarium 5.

Quaelibet functio ϕ data per variabilem quamcunque censebitur valorem $\phi^r = \phi + \Delta \phi$ obtinere, si variabilis absoluta x , ad quam illa refertur (4. §.), augeatur incremento Δx (18. §.).

20. Corollarium 6.

Ex his elucet *methodus generalis quaerendi expressionem differentiae* Δy datae cujuscunque functionis y variabilis x : si enim ubique in y supponatur x abire in $x + \Delta x$, noteturque valor y^r , quem functio y hoc casu induat, et ab eo subtrahatur ipsa functio y ; erit residuum aequale differentiae Δy (18. §.)

Exempla.

$$y = ax; \quad y^r = a(x + \Delta x);$$

$$\Delta y = y^r - y = ax + a\Delta x - ax = a\Delta x.$$

$$y = ax^2; \quad y^r = a(x + \Delta x)^2;$$

$$\Delta y = y^r - y = 2ax\Delta x + a\Delta x^2.$$

$$y = ax^3; \quad y^r = a(x + \Delta x)^3$$

$$\Delta y = y^r - y = 3ax^2\Delta x + 3ax\Delta x^2 + a\Delta x^3.$$

21. Corollarium. 7.

Quidquid sit functio Z variabilis absolutae x , quantitasque constans C , si x abeat in $x + \Delta x$; abibit functio $y = Z + C$ in $y^r = Z + \Delta Z + C$, et $u = CZ$ abibit in $C(Z + \Delta Z) = u^r$ (19. §.): erit ergo $\Delta y = \Delta Z$, et $\Delta u = C\Delta Z$ (18. §.)

22. Corollarium 8.

Et si $P, Q, R, \dots Z$ sint quaecunque functiones variabilis absolutae x , debet functionis $y = P + Q + R + \dots + Z$ obtinere aliquem valorem $y' = P + \Delta P + Q + \Delta Q + R + \Delta R + \dots + Z + \Delta Z$, si x augeatur incremento ΔX (19. §): consequenter erit $\Delta y = \Delta P + \Delta Q + \Delta R + \dots + \Delta Z$ (18. §).

23. Corollarium 9.

Duae functiones Z, X relatae ad unam variabilem absolutam x nequeunt dici aequales, nisi aequatio $Z = X$ pro quolibet valore variabilis x supponatur subsistere: quodsi ergo x abeat in $x + \Delta x$, quo casu functiones Z, X certos valores $Z + \Delta Z, X + \Delta X$ induent (19. §); debet esse etiam $Z + \Delta Z = X + \Delta X$, hinc $\Delta Z = \Delta X$.

24. Theorema.

Si certo constet, quanta Z et X esse independentia a variabili z , esseque $Z = X + \alpha z^a + \beta z^b + \gamma z^c + \delta z^d + \text{etc.}$ pro certis quantitativibus, $\alpha, \beta, \gamma, \dots a, b, c, \text{etc.}$ pariter independentibus a z , et quovis valore ipsius variabilis z ; erunt quanta Z, X inter se aequalia, et $\alpha z^a + \beta z^b + \gamma z^c + \delta z^d + \text{etc.} = 0$.

Demonstratio.

Clarum est, functionem $S = \alpha z^a + \beta z^b + \gamma z^c + \delta z^d + \text{etc.}$ si ea non est aequalis nihilo, diversos valores posse induere, pendentes a diversis valoribus quantitativis variabilis z , et quantitativibus $\alpha, \beta, \gamma, \dots a, b, c, \text{etc.}$: cum igitur quantum X , utpote independentes a variabili z , eundem perpetuo valorem retinere censeatur, quomocunque mutetur variabilis z ; poterit quantum $Z = X + S$, si non est $S = 0$, diversos valores obtinere a certis valoribus variabilis z pendentes, quod pugnat cum assumpta hypothese. Eapropter debet esse $S = 0$, et $Z = X$.

25. Corollarium 1.

Impossibile est, ut pro quantis $Z, X, P, Q, R, \dots L, M, N, \text{etc.}$ independentibus a variabili z , et quovis valore hujus variabilis sit $Z + Pz + Qz^2 + Rz^3 + \text{etc.} = X + Lz + Mz^2 + Nz^3 + \text{etc.}$, quin sit $Z = X$; nimirum $Z = X + (L - P)z + (M - Q)z^2 + (N - R)z^3 + \text{etc.}$ (24. §).

26. Corollarium 2.

Functionis $y = A + Bz^a + Cz^b + Dz^c + \text{etc.}$, in qua coefficientes et exponentes sint quantitates independentes a variabili z , non poterit esse

aequalis nihilo pro quovis valore variabilis z , quin sit eo ipso $A=0$ et $Bz^a + Cz^b + Dz^c + \text{etc.} = 0$ (24. §.).

27. Corollarium 3.

Si exponentes $a, b, c, d, \dots p, q, r, s, \text{etc.}$ ordine crescant, certumque sit, pro quovis valore variabilis z tam functionem $y = A + Bz^a + Cz^b + \dots + Pz^p + Qz^q + Rz^r + Sz^s + \text{etc.}$ quam aliquot primos coefficientes $A, B, C, \dots P$, seorsim sumptos aequari nihilo; erit eo ipso etiam $Qz^q + Rz^r + Sz^s + \text{etc.} = 0$, hinc $Q + Rz^{r-q} + Sz^{s-q} + \text{etc.} = 0$, et ideo etiam proxime sequens coefficientes $Q = 0$ (26. §.).

28. Corollarium 4.

Quoties ergo constiterit, certam functionem $y = A + Bz^a + Cz^b + Dz^c + Ez^d + \text{etc.}$ pro quantitativis $A, B, C, D, E, \dots a, b, c, d, \text{etc.}$ independentibus a variabili z , et quovis valore ejusdem variabilis debere aequari nihilo; certum erit, singulos coefficientes $A, B, C, D, \text{etc.}$ aequales esse nihilo (26. 27. §.).

29. Corollarium 5.

Et si binae functiones $P + Qz^a + Rz^b + Sz^c + \text{etc.}$, $p + qz^a + rz^b + sz^c + \text{etc.}$ pro quovis valore variabilis z inter se aequales sint; erunt etiam coefficientes potestatum aequalium variabilis z inter se aequales; nimirum erit $P - p + (Q - q)z^a + (R - r)z^b + (S - s)z^c + \text{etc.} = 0$; hinc $P - p = 0$, $Q - q = 0$, $R - r = 0$, $S - s = 0$, etc. (28. §.); proinde $P = p$, $Q = q$, $R = r$, $S = s$, etc.

30. Corollarium 6.

His principiis innititur methodus quaerendi seriem formae $Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$ aequalem datae functioni y variabilis z formam ab illa distinctam habenti. Si enim interea indeterminati coefficientes $A, B, C, \text{etc.}$ et determinati exponentes $a, b, c, \text{etc.}$, quales nimirum functio transformanda postulare visa fuerit, sumantur, assumtaque aequatio $y = Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$ in aliam $U = V$ ita transformetur, ut utrumque membrum complectatur aliquam seriem illius formae, tum aut coaequantur coefficientes potestatum aequalium variabilis z contentarum in functionibus U, V , (29. §.), aut, translatis omnibus terminis ad unicum membrum, quo e. gr. fiat $U - V = 0$, singuli coefficientes in $U - V$ ponantur aequales nihilo (28. §.); optinebuntur hac ratione diversae aequationes inter coefficientes inde.

indeterminatos A, B, C, etc. et quantitates constantes, a quibus pendet functio y, unde quaeri poterunt valores eorundem coefficientium.

31. Lemma.

Proprietas, quae tributa quantis A, B, C, D, - - - P numero indeterminato n sumtis eo ipso etiam uno pluribus quantis A, B, C, D, - - - P, Q, debet convenire, conveniet quantis A, B, C, D, - - - P, Q, R, S, T, etc. quovis numero sumtis, ut primum ea aliquot, e. gr. duobus tribusve, quantis convenerit.

Demonstratio.

Si enim certum est, proprietatem, duobus tribusve quantis A, B, C, reipsa competentem, ejusmodi esse, ut, si ea generatim numero n quantis A, B, - - - P tribuatur, eo ipso etiam uno pluribus quantis A, B, - - - P, Q tribui debeat; debebit utique illa competere etiam quatuor quantis A, B, C, D, et ideo etiam quinque quantis A, B, C, D, E, hinc etiam sex quantis A, B, C, D, E, F; atque hac ratione licebit ex quovis quantorum numero ad numerum ipsorum unitate majorem concludere, quin sit possibile ad talem quantorum numerum n pervenire, ultra quem illam proprietatem non liceat extendere.

32. Theorema.

Si a, b, c, d, etc. sint coefficientes independentes a variabili z, sitque r quiscunque numerus integer positivus; possibiles debebunt esse alii coefficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, etc. independentes a variabili z, pro quibus fieret $(a + bz + cz^2 + dz^3 + \text{etc.})^r = a^r + ra^{r-1}bz + \alpha z^2 + \beta z^3 + \gamma z^4 + \text{etc.}$

Demonstratio.

1. Si M, N, O, - - - p, q, r, etc. sint quanta independentia a variabili z; possibiles erunt, prout id evidenter ex natura multiplicationis elu et, coefficientes α, β, γ , etc., pariter independentes a variabili z, pro quibus fieret

$$(M + Nz + Oz^2 + \text{etc.})(p + qz + rz^2 + \text{etc.}) = \\ = Mp + (Mq + Np)z + \alpha z^2 + \beta z^3 + \gamma z^4 + \text{etc.}$$

2. Quare, sumta functione $Z = a + bz + cz^2 + dz^3 + \text{etc.}$, extabunt certi coefficientes α, β, γ , etc. independentes a z, pro quibus fieret $Z^2 = ZZ = a^2 + 2abz + \alpha z^2 + \beta z^3 + \gamma z^4 + \text{etc.}$ ob (1).

3. Et si pro quocunque indeterminato numero n , literis k, l, m , etc. quantitates independentes a variabili z denotantibus, ponatur $Z^n = a^n + na^{n-1}bz + kz^2 + lz^3 + mz^4 + \text{etc.}$; possibiles debebunt esse alii coefficientes α, β, γ , etc. independentes a variabili z , pro quibus fieret $Z^{n+1} = Z^n \cdot Z = a^{n+1} + (n+1)a^n bz + \alpha z^2 + \beta z^3 + \gamma z^4 + \text{etc.}$, ob (1.).

Hinc vero (2) (3) et (31. §.) evidenter sequitur, quod demonstrari debebat.

33. Corollarium 1.

Differentia cujuslibet functionis $u = A + Bv + Cv^2 + Dv^3 + Ev^4 + \text{etc.}$ variabilis v erit $\Delta y = A + B(v + \Delta v) + C(v + \Delta v)^2 + D(v + \Delta v)^3 + E(v + \Delta v)^4 + \text{etc.}$ — u (20. §.) $= (B + 2Cv + 3Dv^2 + 4Ev^3 + \text{etc.}) \Delta v + \alpha \Delta v^2 + \beta \Delta v^3 + \gamma \Delta v^4 + \text{etc.}$, pro quibusdam coefficientibus α, β, γ , etc. independentibus a differentia Δv (32. §.).

34. Corollarium 2.

Datis quoque binis functionibus $\phi = K + L\omega + M\omega^2 + N\omega^3 + \text{etc.}$ $\omega = pe + qe^2 + re^3 + se^4 + \text{etc.}$, possibiles erunt coefficientes α, β, γ , etc. independentes a quantitate e , pro quibus fieret $\phi = K + Lpe + \alpha e^2 + \beta e^3 + \gamma e^4 + \text{etc.}$ (32. §.).

35. Problema.

Invenire seriem aequalem logarithmo functionis $u = 1 + z$ pertinenti ad systema indeterminatum.

Solutio.

1. Sint A, B, C, D , etc. coefficientes, pro quibus et quovis valore variabilis z debeat fieri.

$$\log u = Az + Bz^2 + Cz^3 + Dz^4 + \dots + Pz^r + Qz^{r+1}.$$

2. Extrare debebunt coefficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, etc. independentes a differentia Δz variabilis z , pro quibus fieret (33. §.)

$$\Delta \log u = (A + 2Bz + 3Cz^2 + 4Dz^3 + \dots + rPz^{r-1} + (r+1)Qz^r) \Delta z + \alpha \Delta z^2 + \beta \Delta z^3 + \gamma \Delta z^4 + \delta \Delta z^5 + \text{etc.}$$

3. Est autem $\Delta \log u = \log u^r - \log u$ (20. §.) $= \log(1 + z + \Delta z) - \log(1 + z)$ (19. §.) $= \log\left(1 + \frac{\Delta z}{1+z}\right)$: ob (1.) deberet ergo esse etiam

$$\Delta \log u = \frac{A \Delta z}{1+z} + \frac{B \Delta z^2}{(1+z)^2} + \frac{C \Delta z^3}{(1+z)^3} + \frac{D \Delta z^4}{(1+z)^4} + \text{etc.}$$

4. Quam-

4. Quamobrem habebimus aequales series in (2) (3), quae, etiam divisa per Δz debebunt esse inter se aequales, pro quovis possibili valore differentiae Δz , quod est impossibile, quin per (25. §.) fit

$$A + 2Bz + 3Cz^2 + 4Dz^3 + \dots + rPz^{r-1} + (r+1)Qz^r = \frac{A}{1+z};$$

$$\text{hinc } \left(\frac{2B}{1+A} \right) z + \left(\frac{3C}{1+2B} \right) z^2 + \left(\frac{4D}{1+3C} \right) z^3 + \dots + \left(\frac{r+1}{1+rP} \right) Q z^r = 0;$$

igitur per (28. §.)

$$\begin{array}{l|l} 2B + A = 0 & B = -\frac{1}{2}A. \\ 3C + 2B = 0 & C = +\frac{1}{3}A. \\ 4D + 3C = 0 & D = -\frac{1}{4}A. \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ (r+1)Q + rP = 0 & Q = -P \cdot \frac{r}{r+1}. \end{array}$$

Adeoque series in (1) quaesita erit

$$1 + l(1+z) = A \left(z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 + \dots - \frac{z^{2n}}{2n} + \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \right).$$

36. Corollarium 1.

Series in (35. §.) inventa semper subsistet, quemcunque valorem habeat z , positivum aut negativum; pro $-z$ loco z erit ergo

$$1(1-z) = -A \left(z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{4}z^4 + \dots + \frac{z^{2n}}{2n} + \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \right).$$

37. Corollarium 2.

Et quia est $1(1+z) - 1(1-z) = 1 \left(\frac{1+z}{1-z} \right)$, obtinebimus ex (35. 36. §.) sequentem seriem:

$$1 \left(\frac{1+z}{1-z} \right) = 2A \left(z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^7}{7} + \dots + \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \right).$$

38. Corollarium 3.

Si b denotet basin systematis logarithmici, ponaturque $\frac{1+z}{1-z} = b$; erit $z = \frac{b-1}{b+1}$ et $1 \left(\frac{1+z}{1-z} \right) = 1b = 1$: pro his valoribus obtinebitur ex (37. §.) sequens aequatio:

$$A = \frac{1}{2 \left(\frac{-1}{b+1} + \frac{(b-1)^3}{3(b+1)^3} + \frac{(b-1)^5}{5(b+1)^5} + \frac{(b-1)^7}{7(b+1)^7} + \text{etc.} \right)}.$$

39. Pro.

39. Problema.

Invenire seriem, quae numerum z dato logarithmo y in quocunque systemate respondentem exprimat.

Solutio.

1. Pro quovis logarithmo y et certis coefficientibus a, b, c, d, etc. independentibus ab y fit

$$z = 1 + ay + by^2 + cy^3 + dy^4 + \dots + py^r + qy^{r+1}.$$

2. Erit differentia numeri z considerati iuxta unius functionis logarithmi variabilis y per (33. §.):

$$\Delta z = (a + 2by + 3cy^2 + 4dy^3 + \dots + rPy^{r-1} + (r+1)qy^r) \Delta y + \alpha \Delta y^2 + \beta \Delta y^3 + \gamma \Delta y^4 + \delta \Delta y^5 + \text{etc.}$$

3. Cum autem fit in (2) $\Delta y = y^r - y = lz^r - lz = l(z + \Delta z) - lz = l \left(1 + \frac{\Delta z}{z} \right)$; erit per (35. §.)

$$\Delta y = \frac{A \Delta z}{z} - \frac{A \Delta z^2}{2z^2} + \frac{A \Delta z^3}{3z^3} - \frac{A \Delta z^4}{4z^4} + \text{etc.}$$

4. Quamobrem debebunt dari certi coefficientes k, l, m, etc. independentes a differentia Δz , pro quibus et quovis valore ejusdem differentiae per (34. §.) in (2) (3) fieret

$$\Delta z = (a + 2by + 3cy^2 + 4dy^3 + \dots + (r+1)qy^r) \frac{A}{z} \Delta z + k \Delta z^2 + l \Delta z^3 + m \Delta z^4 + n \Delta z^5 + \text{etc.}$$

et ideo etiam

$$z = Aa + 2Aby + 3Acy^2 + 4Ady^3 + \dots + (r+1)Aqy^r + k \Delta z + l \Delta z^2 + m \Delta z^3 + \text{etc.};$$

quod est impossibile, quin fit (24. §.)

$$z = Aa + 2Aby + 3Acy^2 + 4Ady^3 + \dots + (r+1)Aqy^r.$$

Ob (1) per (29. §.) fiet ergo

$Aa = 1$	$a = \frac{1}{1 \cdot A}$
$2Ab = a$	$b = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot A^2}$
$3Ac = b$	$c = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot A^3}$
$4Ad = c$	$d = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot A^4}$
$\vdots$	$\vdots$
$(r+1)Aq = p$	$q = p \cdot \frac{1}{(r+1) \cdot A}$

Et

Et pro istis valoribus in (1) substitutis obtinebimus sequentem seriem pro numero z :

$$z = 1 + \frac{y}{A} + \frac{y^2}{2A^2} + \frac{y^3}{2.3.A^3} + \dots + \frac{y^r}{2.3.4\dots rA^r},$$

nimirum

$$z = 1 + \frac{1z}{A} + \frac{(1z)^2}{2A^2} + \frac{(1z)^3}{2.3.A^3} + \frac{(1z)^4}{2.3.4.A^4} + \dots + \frac{(1z)^r}{2.3.4\dots rA^r}.$$

40. Corollarium.

Si $z=b$ sit basis systematis, ad quod logarithmus $y=1z$ pertineat; erit $y=1z=1b=1$: igitur in (39 §.)

$$b = 1 + \frac{1}{A} + \frac{1}{2A^2} + \frac{1}{2.3.A^3} + \dots + \frac{1}{2.3\dots rA^r}.$$

41. DEFINITIO.

In quolibet systemate logarithmico datur, praeter ejus basim b , alter per ipsam determinatus numerus A (38. §.), per quem series $S = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 + \text{etc.}$ multiplicata generat productum aequale logarithmo functionis $1+z$ (35. §.): numerum hunc vocant *Modulum* systematis, quo dato dabitur eo ipso etiam ejus basis (40. §.). *Logarithmi naturales* appellantur, quorum systema habet modulum unitati aequalem: omnes alii logarithmi ad quemcunque alium modulum, unitate majorem vel minorem, relati vocantur *artificiales*, inter quos praecipui sunt logarithmi *vulgares*, relati ad basim $=10$.

42. Corollarium 1.

Denotante $b=e$ basim logarithmorum naturalium, erit, ob modulum $A=1$ (41. §.), per (40. §.)

$$e = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \frac{1}{2.3.4.5} + \text{etc.} = 2,71828182 \text{ etc.}$$

43. Corollarium 2.

Pro basi $b=10$ logarithmorum vulgarium (41. §.) reperietur illorum modulus A per (38. §.), et fractio $\frac{1}{A}$, quae seorsum notari meretur; erit enim:

$$A = \frac{1}{2 \left(\frac{9}{11} + \frac{9^3}{3 \cdot 11^3} + \frac{9^5}{5 \cdot 11^5} + \frac{9^7}{7 \cdot 11^7} + \text{etc.} \right)} =$$

$$= 0.434294481903 \text{ etc.}$$

$$\frac{1}{A} = 2.302585092994 \text{ etc.}$$

44. Corollarium 3.

Si logarithmi $l(1+z)$, $L(1+z)$ unius numeri $1+z$ ad duo diversa systemata pertineant, quorum moduli sint m , M ; erit $l(1+z) = mS$, $L(1+z) = MS$ (41. §.); hinc $l(1+z) : L(1+z) = m : M$: logarithmi cujusvis numeri pertinentes ad duo diversa systemata sunt ergo inter se in ratione directa modulorum eorundem systematum.

45. Corollarium 4.

Adeoque, si A denotet modulum logarithmorum vulgarium, ob modulum $= 1$ logarithmorum naturalium (41. §.), erit $1 : A = \log \text{ nat } u : \log \text{ vulg } u$ pro quovis numero u (44. §.): igitur fiet $l \text{ vulg } u = A \text{ nat } u$, et $l \text{ nat } u = l \text{ vulg } u \cdot \frac{1}{A}$. Quare, cognitis logarithmis naturalibus certorum numerorum, reperientur logarithmi vulgares eorundem numerorum, si priores multiplicentur per modulum A logarithmorum vulgarium (43. §.); logarithmi autem vulgares quorumlibet numerorum ducti in fractionem $\frac{1}{A}$ (43. §.) dabunt logarithmos naturales eorundem numerorum.

46. Corollarium 5.

Si fiat $\frac{1+z}{1-z} = \frac{m^2}{m^2-1} = \frac{m^2}{(m+1)(m-1)}$; erit $z = \frac{1}{2m^2-1}$, et $l\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = l\left(\frac{m^2}{(m+1)(m-1)}\right) = 2lm - (l(m+1) + l(m-1))$: quod si jam hi valores substituantur in (37. §.), obtinebitur sequens admodum convergens series, pro logarithmis, quorum modulus est A (41. §.)

$$lm = \frac{1}{2} (l(m+1) + l(m-1))$$

$$+ A \left(\frac{1}{2m^2-1} + \frac{1}{3(2m^2-1)^3} + \frac{1}{5(2m^2-1)^5} + \frac{1}{7(2m^2-1)^7} + \text{etc.} \right).$$

47. Corollarium 6.

Quamobrem, posito modulo systematis $A=1$ (41. §.), conversisque fractionibus $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{11}$, etc. in decimales derivabitur ex (46. §.) sequens formula pro logarithmis naturalibus.

$$\log \text{ nat } m = \frac{1}{2}(\log(m+1) + \log(m-1))$$

$$+ \frac{1.000000000000}{2m^2-1}$$

$$+ \frac{0.333333333333}{(2m^2-1)^3}$$

$$+ \frac{0.200000000000}{(2m^2-1)^5}$$

$$+ \frac{0.142857142857}{(2m^2-1)^7}$$

$$+ \frac{0.111111111111}{(2m^2-1)^9}$$

$$+ \frac{0.090909090909}{(2m^2-1)^{11}}$$

$$+ \frac{0.076923076923}{(2m^2-1)^{13}}$$

$$+ \text{etc. etc.}$$

48. Corollarium 7.

Similem formulam pro logarithmo vulgari numeri m ex (46. §.) elicies, si, sumto modulo A per (43. §.), fractiones $\frac{A}{3}$, $\frac{A}{5}$, $\frac{A}{7}$, $\frac{A}{9}$, $\frac{A}{11}$, $\frac{A}{13}$, etc. in pure decimales convertas: erit enim

$$\log \text{ vulg } m = \frac{1}{2}(\log(m+1) + \log(m-1))$$

$$+ \frac{0.434294481903}{2m^2-1}$$

$$+ \frac{0.144764827301}{(2m^2-1)^3}$$

$$+ \frac{0.086858896380}{(2m^2-1)^5}$$

$$+ \frac{0.062042068843}{(2m^2-1)^7}$$

$$+ \frac{0.048254947433}{2m^2 - 1^9}$$

$$+ \frac{0.039481316536}{(2m^2 - 1)^{12}}$$

$$+ \frac{0.033407267838}{(2m^2 - 1)^{13}}$$

$$+ \text{etc. etc.}$$

Scholion.

Insignis est usus harum formularum in condendis tabulis logarithmicis, et corrigendis ampliandisque jam conditis. Si enim pro quocunque systemate quaerendi forent logarithmi numerorum naturalium 2, 3, 4, 5, 6, 7, et sic porro, ante omnia deberet determinari modulus A systematis, aut independenter ab ejus basi, aut per hanc datam (38. §.). Cognito autem modulo A, inveniatur, posito $\frac{1+z}{1-z} = 2$, hinc $x = \frac{1}{2}$, logarithmus binarii 2 per (37. §.): invento hoc logarithmo, logarithmi omnium aliorum numerorum per (46. §.) commodissime determinabuntur: sufficiet autem omni casu solos logarithmos numerorum primorum $m=3$, $m=5$, $m=7$, $m=11$, $m=13$, et ita porro, per (46. §.) quaerere, cum logarithmi numerorum compositorum 4, 6, 8, 9, 10, 12, etc. sola additione logarithmorum illorum factoribus debitorum possint determinari.

49. Problema.

Invenire seriem aequalem datae cuicunque quantitati exponentiali u^v .

Solutio.

Sit $z = u^v$; erit $lz = vlu$: sumtis ergo logarithmis naturalibus obtinebimus per (39. §.) ob $A=1$ (41. §.) sequentem seriem

$$u^v = 1 + vlu + \frac{(vlu)^2}{2} + \frac{(vlu)^3}{2.3} + \frac{(vlu)^4}{2.3.4} + \text{etc.}$$

50. Corollarium.

Pro basi $u=e$ logarithmorum naturalium erit $lu=le=1$; adeoque in (49. §.).

$$e^v = 1 + v + \frac{v^2}{2} + \frac{v^3}{2.3} + \frac{v^4}{2.3.4} + \frac{v^5}{2.3.4.5} + \text{etc.}$$

51. Pro.

51. Problema.

Invenire seriem aequalem potentiae $(1+x)^m = y$ pro quovis exponente m , rationali et irrationali.

Solutio.

1. Si m esset numerus integer positivus, series aequalis functioni y haberet formam $1 + mx + \alpha x^2 + \beta x^3 + \text{etc.}$ (32. §): ponamus idcirco dari coefficientes $A, B, C, \text{etc.}$ pro quibus et quovis valore variabilis x , quolibet quoque alio exponente m fieri deberet.

$$y = 1 + mx + Ax^2 + Bx^3 + \dots + Qx^r + Rx^{r+1}.$$

2. Differentia hujus functionis debet esse juxta (33. §.) pro quibusdam coefficientibus $K, L, M, \text{etc.}$ independentibus a differentia Δx .

$$\Delta y = (m + 2Ax + 3Bx^2 + \dots + rQx^{r-1} + (r+1)Rx^r) \Delta x \\ + K\Delta x^2 + L\Delta x^3 + M\Delta x^4 + \text{etc.}$$

3. In (2) ob (1) erat $\Delta y = y^r - y$ pro $y = (1+x)^m$, $y^r = (1+x + \Delta x)^m$. Est autem pro quovis possibili exponente m

$$\frac{y^r}{y} = \frac{(1+x+\Delta x)^m}{(1+x)^m} = \left(1 + \frac{\Delta x}{1+x}\right)^m:$$

ob (1) debet ergo esse etiam

$$\frac{y^r}{y} = 1 + \frac{m\Delta x}{1+x} + \frac{A\Delta x^2}{(1+x)^2} + \frac{B\Delta x^3}{(1+x)^3} + \text{etc.};$$

et eo ipso

$$\Delta y = \frac{my}{1+x} \Delta x + \frac{Ay\Delta x^2}{(1+x)^2} + \frac{By\Delta x^3}{(1+x)^3} + \text{etc.}$$

4. Quare debebunt esse series pro Δy in (2) (3) pro quovis valore differentiae Δx inter se aequales, etiam si illae per Δx dividantur, quod est impossibile, quin per (25. §.) fit

$$m + 2Ax + 3Bx^2 + \dots + rQx^{r-1} + (r+1)Rx^r = \frac{my}{1+x}.$$

Hinc demum et ex (1) obtinebimus

$$\begin{array}{ccccccc} 2A & \left. \begin{array}{l} + 3B \\ + m \end{array} \right\} x & + 2A & \left. \begin{array}{l} + 4C \\ - m^2 \end{array} \right\} x^2 & + 3B & \left. \begin{array}{l} + (r+1)R \\ - mB \end{array} \right\} x^3 & + \dots + rQ \left. \begin{array}{l} \\ - mQ \end{array} \right\} x^r = 0. \end{array}$$

Unde per (28 §.) fiet

$$\begin{array}{l|l}
 2A + m - m^2 = 0 & A = \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} \\
 3B + 2A - mA = 0 & B = \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \\
 4C + 3B - mB = 0 & C = \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \\
 \vdots & \vdots \\
 (r+1)R + rQ - mQ = 0 & R = Q \cdot \frac{m-r}{r+1}
 \end{array}$$

5. Valores hi in (1) substituti dabunt sequentem seriem, in qua terminus ultimus est indeterminatus, ita ut ex illo singuli termini post primum $= 1$ ordine sequentes possint derivari, si successive fiat $r=1$, $r=2$, $r=3$, et sic porro.

$$\begin{aligned}
 (1+x)^m &= 1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 \\
 &+ \dots + \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-r+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots r}x^r,
 \end{aligned}$$

52. Corollarium 1.

Cum sit $(a+b)^m = (1+x)^m \cdot a^m$ pro $x = \frac{b}{a}$; prodibit pro his valoribus ex (51. §.) sequens formula exhibens potentiam indeterminatam cujuslibet binomii $a+b$.

$$\begin{aligned}
 (a+b)^m &= a^m + \frac{m}{1}a^{m-1}b + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2}a^{m-2}b^2 \\
 &+ \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}a^{m-3}b^3 + \dots \\
 &+ \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-r+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots r}a^{m-r}b^r.
 \end{aligned}$$

53. Corollarium 2.

Fiat $x = Q = \frac{b}{a}$ et $m = \frac{n}{v}$ in (51. §.); reperietur inde sequens formula, cujus ope nonnihil commodius poterit determinari potentia exponentis fractionis $\frac{n}{v}$ dati binomii $a+b$, literis A, B, C, D , etc., ut per se clarum

clarum est, singulos terminos seriei, primum, secundum, tertium, quartum, etc., designantibus,

$$(a+b)^{\frac{u}{v}} = \underbrace{a^{\frac{u}{v}}}_A + \underbrace{\frac{u}{v} A Q}_B + \underbrace{\frac{u-v}{2v} B Q}_{C} + \underbrace{\frac{u-2v}{3v} C Q}_D + \text{etc.}$$

54. Corollarium 3.

Unum exemplum notatu dignum suppeditat functio $\sqrt{(ax^m + bx^n)}$
 $= (ax^m + bx^n)^{\frac{1}{2}}$: si ponas $Q = \frac{bx^n}{ax^m} = \frac{bx^{n-m}}{a}$, $u=1$, $v=2$ in (53. §.),
 invenies sequentem seriem:

$$\begin{aligned} \sqrt{(ax^m + bx^n)} &= a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{m}{2}} + \frac{bx^{\frac{n-m}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}} - \frac{1 \cdot b^2 x^{\frac{4n-3m}{2}}}{2 \cdot 4a^{\frac{3}{2}}} \\ &+ \frac{1 \cdot 3 \cdot b^3 x^{\frac{6n-5m}{2}}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot a^{\frac{5}{2}}} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot b^4 x^{\frac{8n-7m}{2}}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot a^{\frac{7}{2}}} + \dots \\ &+ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2r-3) b^r x^{\frac{2rn-(2r-1)m}{2}}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2ra^{\frac{2r-1}{2}}} \end{aligned}$$

55. Corollarium 4.

Aliud aequae memorabile exemplum praebet functio $\frac{1}{\sqrt{(ax^m + bx^n)}}$
 $= (ax^m + bx^n)^{-\frac{1}{2}}$. Si ponas $Q = \frac{bx^{n-m}}{a}$, $u=-1$, $v=2$; obtinebis
 ex (53. §.) sequentem seriem.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{(ax^m + bx^n)}} &= \frac{1}{a \cdot x^{\frac{m}{2}}} - \frac{1 \cdot b}{2a \cdot x^{\frac{3m-2n}{2}}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot b^2}{2 \cdot 4 a \cdot x^{\frac{5m-4n}{2}}} \\ &- \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 b^3}{2 \cdot 4 \cdot 6 a \cdot x^{\frac{7m-6n}{2}}} + \dots \\ &+ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2r-1) b^r}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2ra^{\frac{2r+1}{2}} \cdot x^{\frac{(2r+1)m-2rn}{2}}} \end{aligned}$$

56. Pro.

56. Problema.

Assumta serie $\text{Sin } \varphi = \varphi + b\varphi^2 + c\varphi^3 + d\varphi^4 + \dots + p\varphi^{2n} + q\varphi^{2n+1}$,
invenire seriem pro $\text{Cosin } \varphi$.

Solutio.

1. Si arcus variabilis φ crescat differentia $\Delta\varphi$; erit per (5. §. 1. Schol.)

$$\text{Sin}(\varphi + \Delta\varphi) = \text{Sin } \varphi \text{Cosin } \Delta\varphi + \text{Cosin } \varphi \text{Sin } \Delta\varphi.$$

$$\text{Cosin}(\varphi + \Delta\varphi) = \text{Cosin } \varphi \text{Cosin } \Delta\varphi - \text{Sin } \varphi \text{Sin } \Delta\varphi.$$

2. Cum jam per hypothesin pro quovis arcu debeat esse $\text{Sin } \varphi = \varphi + b\varphi^2 + c\varphi^3 + d\varphi^4 + \dots + p\varphi^{2n} + q\varphi^{2n+1}$:

3. Erit etiam $\text{Sin } \Delta\varphi = \Delta\varphi + b\Delta\varphi^2 + c\Delta\varphi^3 + d\Delta\varphi^4 + \dots + q\Delta\varphi^{2n+1}$.

4. Porro est $\text{Cosin } \Delta\varphi = (1 - \text{Sin } \Delta\varphi^2)^{\frac{1}{2}}$, unde evidenter elucet, $\text{Cosin } \Delta\varphi$ aequari certae seriei, cujus terminus primus est unitas, reliqui vero termini post primum ordine sequentes aequales sunt productis ex $\text{Sin } \Delta\varphi^2$, $\text{Sin } \Delta\varphi^4$, $\text{Sin } \Delta\varphi^6$, etc. in quospiam coefficientes independentes a $\text{Sin } \Delta\varphi^2$ (52. §.): ob (3) per (34. §.) debebunt ergo dari aliqui coefficientes k, l, m , etc. independentes a $\Delta\varphi$, pro quibus fieret

$$\text{Cosin } \Delta\varphi = 1 + k\Delta\varphi^2 + l\Delta\varphi^3 + m\Delta\varphi^4 + \text{etc.}$$

5. Differentia $\Delta \text{Sin } \varphi = \text{Sin}(\varphi + \Delta\varphi) - \text{Sin } \varphi$ debebit esse ob (2) per (33. §.)

$$\Delta \text{Sin } \varphi = (1 + 2b\varphi + 3c\varphi^2 + 4d\varphi^3 + \dots + 2np\varphi^{2n-1} + (2n+1)q\varphi^{2n})\Delta\varphi + \alpha\Delta\varphi^2 + \beta\Delta\varphi^3 + \gamma\Delta\varphi^4 + \delta\Delta\varphi^5 + \text{etc.}$$

6. Si autem $\text{sin}(\varphi + \Delta\varphi)$ determinetur per (1) (4) (3), tum subtrahatur $\text{Sin } \varphi$; obtinebitur pro differentia

$$\Delta \text{Sin } \varphi = \text{Cosin } \varphi \cdot \Delta\varphi + (k\text{Sin } \varphi + b\text{Cosin } \varphi)\Delta\varphi^2 + (l\text{Sin } \varphi + c\text{Cosin } \varphi)\Delta\varphi^3 + (m\text{Sin } \varphi + d\text{Cosin } \varphi)\Delta\varphi^4 + \text{etc.}$$

7. Quare, cum series (5) (6) inter se aequari debeant, divisaeque etiam per $\Delta\varphi$ semper sint futurae aequales, quidquid sit differentia $\Delta\varphi$; dabunt illae per (25. §.).

$$\text{Cosin } \varphi = 1 + 2b\varphi + 3c\varphi^2 + 4d\varphi^3 + \dots + 2np\varphi^{2n-1} + (2n+1)q\varphi^{2n}.$$

57. Corollarium 1.

Ex hac porro serie aliam pro $\sin \phi$ simili modo licebit elicere. Si enim ϕ crescat differentia $\Delta \phi$, crescet $\cos \phi$ differentia $\Delta \cos \phi = \cos(\phi + \Delta \phi) - \cos \phi$ (18. 20. §.), quae ob (56. §. 7. n) per (33. §.) erit

$$1. \Delta \cos \phi = (2b + 2.3c\phi + 3.4d\phi^2 + \dots + (2n-1)2np\phi^{2n-2} + 2n(2n+1)q\phi^{2n-1} + \text{etc.}) \Delta \phi + \alpha \Delta \phi^2 + \beta \Delta \phi^3 + \gamma \Delta \phi^4 + \text{etc.}$$

Et si $\cos(\phi + \Delta \phi)$ per (56. §. n. 1. 4. 3.) determinetur; erit, subtracto indidem $\cos \phi$.

$$2. \Delta \cos \phi = -\sin \phi \cdot \Delta \phi + (k \cos \phi - b \sin \phi) \Delta \phi^2 + (l \cos \phi - c \sin \phi) \Delta \phi^3 + (m \cos \phi - d \sin \phi) \Delta \phi^4 + \text{etc.}$$

Adeoque, quia series (1) (2), etiam per $\Delta \phi$ divisae, pro quavis possibili differentia $\Delta \phi$ inter se aequari debent, erit per (25. §.) factor differentiae $\Delta \phi$ in (1) aequalis factori $-\sin \phi$ ejusdem differentiae in (2), proinde $\sin \phi = -2b - 2.3c\phi - 3.4d\phi^2 - \dots - (2n-1)2np\phi^{2n-2} - 2n(2n+1)q\phi^{2n-1} - \text{etc.}$

58. Corollarium 2.

In seriebus aequalibus finum ejusdem arcus ϕ exprimentibus (56. 57. §.) deberet ergo esse $-2b=0$, et $-(2n+1)(2n+2)r=p$, denotante r coefficientem potentiae ϕ^{2n+2} in serie pro $\sin \phi$ (56. §.) per (29. §.): igitur esset $b=0$, et $r=-p:(2n+1)(2n+2)$, unde necessario sequitur, coefficientem b potentiae ϕ^2 in serie pro $\sin \phi$ (56. §.) aequari nihilo, et coefficientem r cujuslibet potentiae ϕ^{2n+2} exponentis paris in eadem serie aequari debere nihilo, si coefficientens p potentiae ϕ^{2n} proxime inferioris exponentisque paris est aequalis nihilo. Series ergo in (56. §.) assumpta non potest subsistere, nisi coefficientes omnium potentiarum $\phi^2, \phi^4, \phi^6, \phi^8$, et sic porro aequentur nihilo.

59. Problema.

Invenire series aequales finui et cosinui dati cujuscunque arcus ϕ .

Solutio.

Sumtis interea indeterminatis coefficientibus $C, E, \dots Q, S$, etc. ponatur per (56. 58. 57. §.).

$$1. \sin \phi = \phi + C\phi^3 + E\phi^5 + \dots + Q\phi^{2n+1} + S\phi^{2n+3}.$$

$$2. \cos \phi = 1 + 3C\phi^2 + 5E\phi^4 + \dots + (2n+1)Q\phi^{2n} + (2n+3)S\phi^{2n+2}.$$

$$3. \sin \phi = -2.3C\phi - \dots - 2n(2n+1)Q\phi^{2n-1} - (2n+2)(2n+3)S\phi^{2n+1}.$$

In seriebus (1) (3) inter se aequalibus erit per (29. §.) $-2.3C=1$,
et generatim $-(2n+2)(2n+3)S=Q$: igitur

$$C=\frac{-1}{2.3}; \text{ et } S=\frac{-Q}{(2n+2)(2n+3)}.$$

Hinc facile determinantur valores singulorum coefficientum pro serie
(1), et eo ipso etiam pro altera serie (2): pro iis idcirco debet esse

$$\text{Sin } \phi = \phi - \frac{\phi^3}{1.2.3} + \frac{\phi^5}{1.2.3.4.5} - \frac{\phi^7}{1.2...7} + \dots + \frac{\phi^{2n+1}}{1.2.3... (2n+1)}$$

$$\text{Cof } \phi = 1 - \frac{\phi^2}{1.2} + \frac{\phi^4}{1.2.3.4} - \frac{\phi^6}{1.2...6} + \dots + \frac{\phi^{2n}}{1.2.3... 2n}.$$

60. Problema.

Dato sinu arcus ϕ invenire seriem aequalem ipsi arcui ϕ .

Solutio.

1. Sit $\text{Sin } \phi = z$; erit $\text{Cof } \phi = (1-z^2)^{\frac{1}{2}}$: per (52. §.) reperietur ergo
sequens series.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\text{Cof } \phi} &= (1-z^2)^{-\frac{1}{2}} = \\ &= 1 + \frac{1. z^2}{2} + \frac{1.3 z^4}{2.4} + \dots + \frac{1.3.5 \dots (2r-1) z^{2r}}{2.4.6 \dots 2r}. \end{aligned}$$

2. Ponamus jam, debere fieri $\phi = z + Az^2 + Bz^3 + Cz^4 + Dz^5 + Ez^6$
 $+ \dots + Pz^{2r-1} + Qz^{2r} + Rz^{2r+1} + Sz^{2r+2} + \text{etc.}$

3. Hinc, si $\text{Sin } \phi = z$ crescat differentia Δz , debet arcus ϕ cresce-
re differentia (33. §.) =

$$\begin{aligned} \Delta \phi &= (1+2Az+3Bz^2+4Cz^3+5Dz^4+6Ez^5+\dots+(2r-1)Pz^{2r-2} \\ &+ 2rQz^{2r-1}+(2r+1)Rz^{2r}+(2r+2)Sz^{2r+1}+\text{etc.}) \Delta z + \alpha \Delta z^2 + \beta \Delta z^3 \\ &+ \gamma \Delta z^4 + \text{etc.} \end{aligned}$$

4. Sed est, ob $z = \text{Sin } \phi$, $\Delta z = \text{Sin}(\phi + \Delta \phi) - \text{Sin } \phi = \text{Sin } \phi \text{Cof } \Delta \phi$
 $+ \text{Cof } \phi \text{Sin } \Delta \phi - \text{Sin } \phi$ (5. §. 1. Schol.): quod si ergo $\text{Cof } \Delta \phi$, $\text{Sin } \Delta \phi$
exprimas per series juxta (59. §.), invenies, pro certis coefficientibus
 k, l, m , etc. debere esse

$$\Delta z = \text{Cof } \phi. \Delta \phi + k \Delta \phi^2 + l \Delta \phi^3 + m \Delta \phi^4 + \text{etc.}$$

5. Quamobrem in (3) (4) habebimus pro quibusdam coefficientibus
 K, L, M , etc. independentibus a $\Delta \phi$ (34. §.)

$$\Delta \phi = (1+2Az+\dots+(2r+2)Sz^{2r+1}) \text{Cof } \phi. \Delta \phi + K \Delta \phi^2 + L \Delta \phi^3 + \text{etc.}$$

Hinc

Hinc, quia aequatio haec, etiam divisa per $\Delta\Phi$, pro quavis differentia $\Delta\Phi$ debet subsistere, necessario sequitur, unitatem aequalem factori ipsius $\Delta\Phi$ in primo membro aequari factori ejusdem differentiae in altero membro (24. §.), consequenter debere etiam esse

$$\frac{1}{\Delta\Phi} = 1 + 2Az + 3Bz^2 + 4Cz^3 + 5Dz^4 + 6Ez^5 + \dots + (2r-1)Pz^{2r-2} + 2rQz^{2r-1} + (2r+1)Rz^{2r} + (2r+2)Sz^{2r+1}.$$

6. Hæc modo nascuntur binæ inter se æquales series (1) (5), quarum idcirco coefficientes per (29. §.) coæquati dabunt

$$A=0; B=\frac{1}{2.3}; C=0; D=\frac{1.3}{2.4.5}; E=0;$$

$$Q=0; R=\frac{1.3.5}{2.4.6} - \dots - \frac{(2r-1)}{2r(2r+1)};$$

et pro his valoribus debet esse in (2)

$$\Phi = z + \frac{1. z^3}{2.3} + \frac{1.3. z^5}{2.4.5} + \dots + \frac{1.3.5. (2r-1) z^{2r+1}}{2.4. \dots 2r(2r+1)}.$$

61. Theorema.

Quaelibet potentia polynomii $Az^a + Bz^b + Cz^c + Dz^d + \text{etc.} = Z$, in quo $A, B, C, D, \dots a, b, c, d, \text{etc.}$ sint quaecunque quantitates independentes a variabili z , aequatur alicui polynomio similis formae.

Demonstratio.

1. Si binomium $Az^a + Bz^b$ elevetur ad potentiam exponentis m , quisquis sit is, rationalis aut irrationalis, debet haec potentia aequari certo polynomio formae in theoremate determinatae (52. §.).

2. Supponamus porro, quamvis potentiam polynomii $X = Az^a + Bz^b + Cz^c + \dots + Pz^p$ habentis terminos numero n aequari alicui polynomio similis formae.

3. Sumto adhuc uno termino Qz^q , habebimus per (52. §.) pro certis coefficientibus $\alpha, \beta, \gamma, \text{etc.}$ independentibus a z .

$$(X + Qz^q)^m = X^m + \alpha X^{m-1}.Qz^q + \beta X^{m-2}.Q^2z^{2q} + \gamma X^{m-3}.Q^3z^{3q} + \text{etc.}$$

Cum igitur singulae potentiae $X^m, X^{m-1}, X^{m-2}, \text{etc.}$ aequentur polynomiis formae $Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$, ob (2); necesse est, ut eo ipso etiam potentia $(X + Qz^q)^m$ aequalis sit alicui polynomio similis formae.

Hinc jam (1) 2) 3) per (31. §.) evidenter sequitur, quod erat demonstrandum.

62. Corollarium.

Facile ex natura operationum algebraicarum colligitur, quocunque functiones formae $Az^a + Bz^b + Cz^c + Dz^d + \text{etc.}$ seu illae in unam summam addantur, seu subtrahantur ab invicem, seu inter se multiplicentur, aut dividantur, semper generare aliquam functionem similis formae: quare, cum praeterea omnis potentia talis functionis, quisquis sit ejus exponens, rationalis vel irrationalis, aequetur alicui functioni formae similis (61. §.), haud difficulter demonstratur, omnem functionem algebraicam unius variabilis z , fracta illa sit, vel integra, rationalis vel irrationalis, aut ex illis et his quomodocunque composita, aequalem esse alicui seriei formae $Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$

63. Theorema.

Omnis functio, algebraica, logarithmica, trigonometrica, et ex his quacunque ratione composita, unius variabilis v aequalis est certae seriei formae $Av^a + Bv^b + Cv^c + Dv^d + \text{etc.}$

Demonstratio.

1. Demonstravimus, sinum et cosinum cujuslibet arcus variabilis v aequalem esse certae functioni algebraicae ejusdem arcus, determinatae per seriem variarum potentiarum hujus arcus (59. 5. §.): cum igitur omnes reliquae functiones, ut Sinus versus, Cosinus versus, Tangens, Cotangens, Secans, Cosecans, certi arcus per Sinum et Cosinum ejusdem arcus perfecte possint determinari (5. §. 1. Schol.); certum est, omnes has functiones todidem functionibus algebraicis variabilis v aequari.

Ex iisdem principiis, ob (60. §.), patet eadem ratione, quemvis arcum variabilem v aequari posse certae functioni algebraicae sui sinus, vel cosinus, sinus versi, cosinus versi, tangentis, cotangentis, secantis, vel cosecantis.

2. Porro demonstratum est, logarithmum cujusvis variabilis $v = 1 + z$ aequari certae functioni algebraicae ejusdem variabilis (35. §.), et v aequari certae functioni algebraicae ipsius logarithmi lv spectati instar quantitatis variabilis (39. §.), quod deinde ad quantitates exponentiales extendimus (49. §.).

3. Ex his vero manifestum sit, omnem functionem logarithmicam, trigonometricam, et quocunque modo ex functionibus his et algebraicis compositam, aequari certae functioni algebraicae: consequenter debet quaevis
functio

functio variabilis v , algebraica, trigonometrica, logarithmica, et quoquo modo ex his composita, aequari alicui seriei formae $Av^a + Bv^b + Cv^c + Dv^d + \text{etc.}$ quidquid sint coefficientes $A, B, C, D, - - -$ et exponentes $a, b, c, d, \text{etc.}$ independentes a v , et quisquis sit numerus terminorum ejus seriei (62. §.).

64. Corollarium 1.

Si y^r denotet valorem, quem functio $y = Av^a + Bv^b + Cv^c + Dv^d + \text{etc.}$ variabilis v indueret, si haec augeretur quantitate ω ; erit $y^r = A(v + \omega)^a + B(v + \omega)^b + C(v + \omega)^c + \text{etc.}$: igitur per (52. §.)

$$y^r = \left(\begin{aligned} &Av^a + \frac{a}{1} Av^{a-1} \omega + \frac{a(a-1)}{1 \cdot 2} \omega^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-r+1)}{1 \cdot 2 \dots r} Av^{a-r} \omega^r \\ &+ Bv^b + \frac{b}{1} Bv^{b-1} \omega + \frac{b(b-1)}{1 \cdot 2} \omega^2 + \dots + \frac{b(b-1)\dots(b-r+1)}{1 \cdot 2 \dots r} Bv^{b-r} \omega^r \\ &+ Cv^c + \frac{c}{1} Cv^{c-1} \omega + \frac{c(c-1)}{1 \cdot 2} \omega^2 + \dots + \frac{c(c-1)\dots(c-r+1)}{1 \cdot 2 \dots r} Cv^{c-r} \omega^r \\ &+ Dv^d + \frac{d}{1} Dv^{d-1} \omega + \frac{d(d-1)}{1 \cdot 2} \omega^2 + \dots + \frac{d(d-1)\dots(d-r+1)}{1 \cdot 2 \dots r} Dv^{d-r} \omega^r \\ &+ \quad \text{etc.} \quad \text{etc.} \quad - \quad - \quad - \quad \text{etc.} \end{aligned} \right)$$

Haec igitur formula exhibet expressionem generalem valoris, quem data quaevis functio y variabilis v eo casu deberet obtinere, si haec quantitate ω augeretur, sicut series $Av^a + Bv^b + Cv^c + Dv^d + \text{etc.}$ generatim datae cuivis functioni y variabilis v potest aequari (63. §.).

65. Corollarium 2.

Cum autem prima series verticalis in (64. §.), eius terminis in unam summam collectis, exaequet ipsam functionem y , secunda vero series verticalis aequalis sit producto $\alpha\omega$ pro $\alpha = \frac{aAv^{a-1}}{1} + \frac{bBv^{b-1}}{1} + \frac{cCv^{c-1}}{1} + \frac{dDv^{d-1}}{1} + \text{etc.}$; cumque tertia series verticalis sit indeterminata, ita ut ex illa omnes series verticales, post primam ordine sequentes possint determinari, si successive fiat $r=1, r=2, r=3, r=4, \text{etc.}$: evidens est, esse $y^r = y + \alpha\omega + \beta\omega^2 + \gamma\omega^3 + \delta\omega^4 + \text{etc.}$ literis $\beta, \gamma, \delta, \text{etc.}$ ejusmodi quantitates, ab ω independentes denotantibus, ut quaevis illarum ex proxime praecedente eadem prorsus lege possit determinari, qua lege quantitas α determinatur ex ipsa functione y (64. §.).

66. Corollarium 3.

Quidquid sit variabilis v , absoluta, aut aliqua functio cujuscumque variabilis absolutae x , necesse est, ut, dum variabilis absoluta, ad quam functio y variabilis v relata sit, certa differentia augetur, v valorem aliquem $v + \Delta v$, et y certum valorem y^1 obtineat (19. §.): sicut ergo quaevis data functio y variabilis v alicui seriei formae $Av^a + Bv^b + Cv^c + Dv^d + \text{etc.}$ aequatur (63. §.); sic quoque debet differentia Δy cujusvis datae functionis y variabilis v aequalis esse certae seriei formae $\alpha \Delta v + \beta \Delta v^2 + \gamma \Delta v^3 + \delta \Delta v^4 + \text{etc.}$, literis $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, etc. quantitates independentes a Δv , et per ipsam functionem y ita determinatas designantibus, ut sit $\alpha = \frac{a A v^{a-1}}{1} + \frac{b B v^{b-1}}{1} + \frac{c C v^{c-1}}{1} + \frac{d D v^{d-1}}{1} + \text{etc.}$, quaevis vero quantitatibus $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, etc. ex proxime praecedente, nimirum β ex α , γ ex β , δ ex γ , et sic porro, eadem prorsus lege possit derivari, qua quantitas α derivatur ex functione y (64. 65. §.).

67. Corollarium 4.

Ceterum per se liquet, series, quarum uni functio y variabilis v , alteri vero ejus differentia Δy aequatur (66. §.), seu illae constant terminis numero finitis, seu in infinitum excurrant, valoris esse finiti, quamdiu ipsa functio y , et differentia Δv variabilis v finita est.

CAPUT II.
DE
NATURA ET INVENTIONE RATIONUM
DIFFERENTIALIUM.

68. DEFINITIO.

Quantum variabile Z crescens continuo aut decrescens eo propius accedet ad determinatum aliquem valorem V , quo minor fuerit differentia inter illud et hunc valorem; et si haec differentia possit evadere minor data quavis quantitate homogenea; erit V *Limes* seu *Terminus* quanti variabilis Z crescentis continuo vel decrescents.

69. DEFINITIO.

Ratio variabilis $Z:X$ continuo crescens vel decrescens eo propius accedet ad aliquam determinatam rationem $u:v$, quo minor fuerit differentia inter illam et hanc rationem: erit autem ratio determinata $u:v$ *Limes* seu *Terminus* rationis variabilis $Z:X$ crescentis continuo vel decrescents, si differentia inter has rationes possit evadere minor data quavis ratione.

70. Corollarium.

Ex (68. 69. §.) et natura rationum geometricarum facile colligitur differentiam inter rationem variabilem $Z:X$ et rationem determinatam $u:v$ posse fieri minorem data quavis ratione, si differentia inter exponentes $\frac{Z}{X}$, $\frac{u}{v}$ harum rationum fieri potest minor dato quovis exponente, adeoque rationem $u:v$ exhibituram limitem rationis variabilis $Z:X$ crescentis continuo vel decrescents, si exponens prioris rationis fuerit limes exponentis rationis posterioris.

71. Theorema.

Dato quanto P magnitudinis determinatae, et alio U , quod aequetur limiti quanti variabilis Z continuo crescentis vel decrescents; erunt fractiones $\frac{U}{P}$, $\frac{P}{U}$ limites fractionum variabilium $\frac{Z}{P}$, $\frac{P}{Z}$.

Demon-

Demonstratio.

Necesse est, ut extet differentia D , quae minor possit fieri dato quovis quanto, et pro qua semper sit $Z = U \pm D$ (68. §.), consequenter

$$\frac{Z}{P} = \frac{U}{P} \pm \frac{D}{P} \cdot \frac{P}{Z} = \frac{P}{U} \pm \frac{PD}{U^2 \pm UD}.$$

Casu primo est $\frac{D}{P}$ differentia inter $\frac{Z}{P}$ et $\frac{U}{P}$, eaque potest fieri minor data quavis quantitate u : cum enim per hypothesin possit fieri $D < Pu$; poterit quoque fieri $\frac{D}{P} < u$. Casu altero est $\frac{PD}{U^2 \pm UD}$ differentia inter $\frac{P}{Z}$ et $\frac{P}{U}$, eaque potest minor evadere data quacunque quantitate u : nam per hypothesin poterit fieri $D < \frac{U^2 u}{P \pm uU}$; hinc etiam $PD \pm uUD < U^2 u$, eoque ipso etiam $\frac{PD}{U^2 \pm UD} < u$.

72. Corollarium.

Si quantum U fuerit limes quanti variabilis Z crescentis continuo vel decrescantis, deturque quodcunque aliud quantum homogeneum P determinatae magnitudinis; erunt rationes determinatae $U:P$, $P:U$ limites rationum variabilium $Z:P$, $P:Z$ (71. 70. §.).

73. Theorema.

Si quanta U , V exhibeant limites quantorum variabilium Z , X , crescentium continuo, vel decrescantium, seu ambo crescant simul, vel decrescant, aut crescente alterutro decrescat alterum; erit quotus $\frac{U}{V}$ limes quoti $\frac{Z}{X}$.

Demonstratio.

Dari debent differentiae D , d , pro quibus semper sit $Z = U \pm D$, et $X = V \pm d$, ita ut differentiae D , d possint minores evadere datis quibilibet quantitatis homogeneis (68. §.): habebimus igitur

$$\frac{Z}{X} = \frac{U \pm D}{V \pm d} = \frac{U}{V} \pm \frac{\pm VD \mp Ud}{V^2 \pm Vd}.$$

Hinc autem elucet, differentiam inter $\frac{Z}{X}$ et $\frac{U}{V}$ seu sit prior quotus major, seu minor posteriore, generatim esse $= \frac{\pm VD \mp Ud}{V^2 \pm Vd}$, quae porerit fieri

fieri minor data quavis quantitate u . Cum enim possit evadere $D < \frac{1}{2}uV$, $d < \frac{1}{2}\frac{uV^2}{U}$, $d < \frac{1}{2}V$, adeoque $DV < \frac{1}{2}uV^2$, $dU < \frac{1}{2}uV^2$, $duV < \frac{1}{2}uV^2$; poterit etiam fieri $DV + dU + duV < uV^2$; igitur a fortiori generationem $\pm DV \mp dU \mp duV < uV^2$, hinc $\frac{\pm DV \mp dU}{V^2 \pm dV} < u$.

74. Corollarium.

Cognitis limitibus U , V duorum quantorum variabilium Z , X ; erit ratio $U:V$ limes rationis variabilis $Z:X$ (73. 70. §.).

75. Theorema.

Datis quibuscunque quantis finitis P , Q , R , S , T , etc. independentibus a quantitate variabili ω , possibilis erit valor hujus variabilis, pro quo fieret $P\omega > Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + T\omega^5 + \text{etc.}$, existente P quanto positivo, quidquid sint reliqua quanta.

Demonstratio.

1. Constat, quantitatem variabilem ω in determinatione productorum $P\omega$, $Q\omega^2$, $R\omega^3$, etc. instar certi numeri considerari posse, qui nimirum aequatur exponenti rationis ejusdem quantitatis ad quantitatem pro ipsius mensura assumptam.

2. Porro certum est, quovis quanto finito majus esse possibile; et, datis duobus quibuscunque quantis $M > v$, possibilem esse numerum integrum n aequalem denominatori partis aliquotae $M\frac{1}{n}$ quanti majoris M , quae minor sit quanto v .

3. Iam vero pro positivo quanto P supponi possunt reliqua omnia quanta Q , R , S , T , etc. esse positiva: si enim in hac hypothese fieri potest $P\omega > Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \text{etc.}$; poterit id a fortiori eo casu fieri, quo aliqua quantorum Q , R , S , T , etc. fuerint negativa. Quomocunque autem dicantur crescere, vel decrescere, aut alterne crescere et decrescere quanta finita P , Q , R , S , T , etc.; semper erit possibile quantum Z majus singulis his quantis (2), pro quo idcirco fieret.

$$Z(\omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \text{etc.}) > Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \text{etc.}$$

4. Pro quovis porro numero ω (1) est $Z\omega^2 > Z(\omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \text{etc.})$ ($1 - \omega$), hinc $\frac{Z\omega^2}{1 - \omega} > Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \text{etc.}$, ob (3).

5. Cum igitur possibilis debeat esse numerus $\omega = \frac{1}{n}$, pro quo fieret $P > (P+Z)\omega$ ob (2), hinc $P\omega > \frac{Z\omega^2}{1-\omega}$; deberet esse pro eodem numero etiam $P\omega > Q\omega^2 + R\omega^3 + S\omega^4 + \text{etc.}$, ob (4).

76. Corollarium 1.

Pro quibuscumque quantis finitis $\mu, M, N, O, \text{etc.}$ independentibus a variabili ω possibilis est valor hujus variabilis, pro quo summa $M\omega + N\omega^2 + O\omega^3 + \text{etc.}$ minor fieret dato quomodocumque parvo quanto μ , nimirum pro illo numero, pro quo esset $\mu\omega > M\omega^2 + N\omega^3 + O\omega^4 + \text{etc.}$ (75. §.).

77. Corollarium 2.

Assumpto quoque indeterminato numero integro positivo r fieri poterit $P\omega^r > Q\omega^{r+1} + R\omega^{r+2} + S\omega^{r+3} + \text{etc.}$ pro certo valore variabilis ω (75. §.). Hinc autem facile perspicitur, cur sit impossibile, ut pro quantis $K, L, M, N, \text{etc.}$ finitis independentibus a variabili ω , et pro quovis possibili valore hujus variabilis, summa $K\omega^r + L\omega^{r+1} + M\omega^{r+2} + N\omega^{r+3} + \text{etc.}$ sit valoris positivi aut negativi, quin primus terminus $K\omega^r$ habeat valorem positivum vel negativum.

78. Corollarium 3.

Functio $M\omega + N\omega^2 + O\omega^3 + \text{etc.} = F$ est differentia inter U et $U+F$; quodsi ergo $U, M, N, O, \text{etc.}$ sint quaecumque quanta finita independentia a variabili ω , quae continuo decrescere cogitetur; erunt quantum U et ratio $U:1$ limites, ad quos functio $U+F$ et ratio $(U+F):1$ eo propius accedent, quo magis decreverit ω (76. 72. §.).

Scholion 1.

Quod hic factum est, in sequentibus constanter observabitur, quanta nimirum, quae nonnunquam heterogenea esse videntur, inter se comparabuntur: sic generatim differentiae omnium functionum variabiliumque abso-
lutarum inter se erunt comparabiles, licet eae quanta heterogenea, puta lineas, superficies, solida, tempora, celeritates, etc. exprimere videantur. Quaelibet nimirum functio y , ejus differentia Δy , et differentia Δx variabilis absolutae, ad quam illa refertur, censi potest exhibere exponentem rationis geometricae quanti, cui ea deberet aequari, ad quantum pro ipsius mensura assumptum, quo ipso omnes expressiones pro $y, \Delta y, \Delta x$, ut numeri abstracti, redduntur inter se comparabiles.

Scho.

Scholion 2.

Pari prorsus ratione potest demonstrari, possibilem esse valorem variabilis ω , pro quo et dato quovis numero integro positivo m , quibuslibet quoque quantis positivis $K, L, M, \dots U, V$, fiat $\omega^m > K\omega^{m-1} + L\omega^{m-2} + M\omega^{m-3} + \dots U\omega + V$. Possibile est enim quantum Z majus singulis quantis $K, L, M, \dots U, V$ seorsum sumtis, pro quo idcirco, posita summa $K\omega^{m-1} + L\omega^{m-2} + \dots U\omega + V = S$, fieret $Z(\omega^{m-1} + \omega^{m-2} + \omega^{m-3} + \dots + \omega^1 + \omega^0) > S$: igitur etiam $\frac{Z(\omega^m - 1)}{\omega - 1} > S$, et a fortiori $\frac{Z\omega^m}{\omega - 1} > S$. Quare, cum possit fieri $\omega > Z + 1$, hinc $\omega^m > \frac{Z\omega^m}{\omega - 1}$: poterit etiam fieri $\omega^m > S$.

79. DEFINITIO.

Sit y quaecunque functio variabilis absolutae x , et Δy ejus differentia debita differentiae Δx (14. §). Possibile est, ut, differentia Δx continuo decrescente (15. §), ratio $\Delta y : \Delta x$ eundem perpetuo valorem retineat, (e.gr. si sit $y = ax$, hinc $\Delta y = a\Delta x$, et $\Delta y : \Delta x = a : 1$): verum plerumque fiet, ut eo casu ratio $\Delta y : \Delta x$ continuo mutetur, crescat nimirum, vel decrescat. Ratio constans, cui ratio $\Delta y : \Delta x$ differentiae functionis y ad differentiam variabilis absolutae x , ad quam ea functio refertur (4. §), perpetuo manet aequalis, vel, si haec ratio sit variabilis, limes, ad quem ratio $\Delta y : \Delta x$, differentia Δx continuo decrescente, propius semper et propius accesserit, vocabitur *Ratio differentialis* functionis y , cujus exponentem signo εy exprimemus. Methodus inveniendi rationes differentiales functionum est *Calculus differentialis*.

80. Corollarium 1.

Quantitas constans C nullius rationis differentialis est capax, quocirca ponetur hujus exponent $\varepsilon C = 0$ (16. 79. §).

81. Corollarium 2.

Cum $y = x$ det $\Delta y = \Delta x$, hinc $\Delta y : \Delta x = 1 : 1$; patet, $1 : 1$ esse rationem differentialem variabilis absolutae x , ejusdemque exponentem $\varepsilon x = 1$ (79. §).

82. Corollarium 3.

Si differentia alicujus functionis u relatae ad variabilem absolutam x ita dependeat a differentia Δx , ut pro certis quantitibus finitis P, A, B, C , etc.

independentibus a Δx fit $\Delta u = P \Delta x + A \Delta x^2 + B \Delta x^3 + C \Delta x^4 + \text{etc.}$ (66. 67. §.), hinc $\Delta u : \Delta x = (P + A \Delta x + B \Delta x^2 + C \Delta x^3 + \text{etc.}) : 1$; erit $P : x$ ratio differentialis functionis u , et ejus exponent $\varepsilon u = P$ (79. 78. §.).

83. Theorema.

Cuius functioni y relatae ad variabilem absolutam x debetur aliqua ratio differentialis, cujus exponent εy aequalis est quantitati finitae per ipsam functionem y certa lege determinatae.

Demonstratio.

Quidquid sit functio finita y variabilis absolutae x, necesse est, ut extent quaequam quantitates $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, etc. pariter finitae per ipsam functionem y certa lege determinatae, pro quibus fieret (66. 67. §.) $\Delta y = \alpha \Delta x + \beta \Delta x^2 + \gamma \Delta x^3 + \delta \Delta x^4 + \text{etc.}$: igitur $\varepsilon y = \alpha$ (82. §.).

84. Corollarium 1.

Quaelibet functio z valoris finiti relata ad variabilem absolutam x ita debet esse comparata, ut ejus differentia Δz pro quibusdam quantitatibus finitis k, l, m, etc. independentibus a Δx atque per ipsam functionem z perfecte determinatis aequetur seriei $\varepsilon z \Delta x + k \Delta x^2 + l \Delta x^3 + m \Delta x^4 + \text{etc.}$ (83. §.).

85. Corollarium 2.

Quamobrem, si εz fuerit valoris positivi vel negativi, indicio id erit, etiam $\Delta z = \varepsilon z \Delta x + k \Delta x^2 + l \Delta x^3 + m \Delta x^4 + \text{etc.}$ positivi esse vel negativi valoris (84. 77. §.): cum igitur sit $\Delta z = z^1 - z$, adeoque $z^1 > z$ vel $z^1 < z$ pro positivo vel negativo valore exponentis εz ; necesse est, ut functio z, crescente variabili x, crescat vel decrescat, prout εz est positivi vel negativi valoris (20. §.).

86. Corollarium 3.

Pro $y = Ax^a + Bx^b + Cx^c + \text{etc.}$ esset $\alpha = aAx^{a-1} + bBx^{b-1} + cCx^{c-1} + \text{etc.}$ et ideo etiam $\varepsilon y = aAx^{a-1} + bBx^{b-1} + cCx^{c-1} + \text{etc.}$ (83. 66. §.)

87. Corollarium 4.

Sed etiam denotante v quamcunque functionem finitam variabilis absolutae x extabunt certae quantitates finitae P, Q, R, etc. independentes a Δv , pro quibus differentia cujuslibet functionis u datae per variabilem v fieret $\Delta u = P \Delta v + Q \Delta v^2 + R \Delta v^3 + S \Delta v^4 + \text{etc.}$ (66. 67. §.): cum igitur

Δv

Δv aequetur alicui seriei $\varepsilon v \Delta x + k \Delta x^2 + l \Delta x^3 + \text{etc.}$ (84. §.); patet, debere dari alios finitos coefficientes $M, N, O, \text{etc.}$ independentes a Δx , pro quibus ob (34. §.) fieret $\Delta u = P \varepsilon v \Delta x + M \Delta x^2 + N \Delta x^3 + O \Delta x^4 + \text{etc.}$, et ideo $\varepsilon u = P \varepsilon v$ (82. §.).

88. Corollarium 5.

Pro $u = A v^a + B v^b + C v^c + \text{etc.}$ et quavis functione v variabilis absolutae x esset $P = a A v^{a-1} + b B v^{b-1} + c C v^{c-1} + \text{etc.}$, et $\varepsilon u = P \varepsilon v$ (87. 66. §.).

89. Corollarium 6.

Hinc generatim possumus statuere, exponentem rationis differentialis cujusvis functionis ϕ datae per variabilem z , si ejus differentia pro certis quantitativibus $p, q, r, s, \text{etc.}$ independentibus a Δz sit $\Delta \phi = p \Delta z + q \Delta z^2 + r \Delta z^3 + s \Delta z^4 + \text{etc.}$, debere esse $\varepsilon \phi = p \varepsilon z$, ita ut exponents εz aut unitati, aut alicui quantitati finitae aequetur, prout est z aut variabilis absoluta (4. §.), aut certa functio alicujus variabilis absolutae (83. 87. §.).

90. Theorema.

Exponens rationis differentialis producti CZ ex quacunque functione Z variabilis absolutae x in quantitatem constantem C aequatur producto ex exponente rationis differentialis functionis Z in eandem constantem C, seu est $\varepsilon . CZ = C \varepsilon Z$.

Demonstratio.

Est enim $\Delta . CZ = C \Delta Z$ (21. §.) $= C \varepsilon Z \Delta x + C k \Delta x^2 + C l \Delta x^3 + C m \Delta x^4 + \text{etc.}$ (84. §.): igitur $\varepsilon . CZ = C \varepsilon Z$ (82. §.).

91. Theorema.

Exponens rationis differentialis summae $Z + C$ quantitatis constantis C et cujuscunque functionis Z relatae ad variabilem absolutam x aequatur exponenti rationis differentialis ejusdem functionis Z, seu est $\varepsilon (Z + C) = \varepsilon Z$.

Demonstratio.

Cum sit $\Delta (Z + C) = \Delta Z$ (21. §.) $= \varepsilon Z \Delta x + k \Delta x^2 + l \Delta x^3 + m \Delta x^4 + \text{etc.}$ (84. §.); debet esse $\varepsilon (Z + C) = \varepsilon Z$ (82. §.).

92. Theorema.

Exponens rationis differentialis summae plurium functionum P, Q, R, --- Z unius variabilis absolutae x aequatur summae exponentium rationum different

tialium singulis his functionibus debitarum, seu est $\varepsilon(P+Q+R+---+Z)$
 $\equiv \varepsilon P + \varepsilon Q + \varepsilon R + --- \varepsilon Z$.

Demonstratio.

Per (22. §.) fieret $\Delta(P+Q+R+---+Z) \equiv \Delta P + \Delta Q + \Delta R$
 $+ --- + \Delta Z$: igitur pro certis quantitibus K, L, M, etc. independen-
 tibus a Δx deberet fieri $\Delta(P+Q+R+---+Z) \equiv (\varepsilon P + \varepsilon Q + \varepsilon R + ---$
 $+ \varepsilon Z) \Delta x + K \Delta x^2 + L \Delta x^3 + M \Delta x^4 + \text{etc.}$ (84. §.), eoque ipso $\varepsilon(P+Q$
 $+ --- + Z) \equiv \varepsilon P + \varepsilon Q + --- + \varepsilon Z$ (82. §.).

93. DEFINITIO.

Quam in (79. §.) definivimus, vocetur *prima* ratio differentialis fun-
 ctionis y relatae ad unam variabilem absolutam x: tum *secunda* ratio diffe-
 rentialis functionis y sit aequalis primae rationi differentiali exponentis
 primae rationis differentialis functionis y: et sic generatim quaevis *mta*
 ratio differentialis functionis y aequetur primae rationi differentiali expo-
 nentis proxime inferioris, nimirum $\frac{(m-1)}{2}$ *esima*, rationis differen-
 tialis functionis y, ita ut, signis εy , $\varepsilon^2 y$, $\varepsilon^3 y$, --- $\varepsilon^r y$, $\varepsilon^{r+1} y$ denotantibus
 exponentes rationum differentialium, primae, secundae, tertiae, et sic
 porro, functionis y, sit $\varepsilon^2 y \equiv \varepsilon \cdot \varepsilon y$; $\varepsilon^3 y \equiv \varepsilon \cdot \varepsilon^2 y$; --- $\varepsilon^{r+1} y \equiv \varepsilon \cdot \varepsilon^r y$.

94. Corollarium.

Concessa methodo inveniendi exponentem primae rationis differentialis
 cujusvis assignabilis functionis, habebitur eo ipso methodus determinandi
 exponentes rationum differentialium omnium ordinum (93. §.).

Scholion.

Attendat tyro, ne expressiones $\varepsilon^n y$, εy^n , $\varepsilon \cdot y^n$ inter se confundat
 Expressio enim $\varepsilon^n y$ denotat exponentem *ntae* rationis differentialis fun-
 ctionis y: εy^n autem tantundem ac $(\varepsilon y)^n$ significat, nimirum *ntam* po-
 tentiam exponentis εy primae rationis differentialis functionis y: et $\varepsilon \cdot y^n$
 idem, quod $\varepsilon(y^n)$, indigitat, nimirum exponentem primae rationis diffe-
 rentialis *ntae* potentiae functionis y. Quod autem ad signum ε generatim
 adtinet, censebitur id illam duntaxat totam quantitatem afficere, cui imme-
 diate fuerit praefixum, nullo interjecto signo, aut puncto interposito: sic
 e. gr. expressio $\varepsilon \cdot z \varepsilon y$ denotabit exponentem primae rationis differentialis
 functionis per $z \varepsilon y$ expressae; contra $\varepsilon z \varepsilon y$ denotabit productum ex ex-
 ponentibus εz , εy rationum differentialium debitarum functionibus z, y.

Sic

Sic quoque $\varepsilon \cdot z \sqrt{(1-z^2)}$ exprimit exponentem rationis differentialis functionis $z \sqrt{(1-z^2)}$, et $\varepsilon z \sqrt{(1-z^2)}$ denotat productum ex exponente εz rationis differentialis functionis z in functionem $\sqrt{(1-z^2)}$.

95. Theorema.

Exponentes εy , εz rationum differentialium functionibus aequalibus $y=Y+A$, $z=Z+B$ unius variabilis absolutae x debitarum debent esse inter se aequales.

Demonstratio.

Quidquid sint constantes A, B ; erit $\varepsilon y = \varepsilon Y$, $\varepsilon z = \varepsilon Z$ (91. §.), et $\Delta y = \Delta z$, si est $y = z$ (23. §.): pro certis coefficientibus $k, l, m, \dots$ K, L, M , etc. independentibus a Δx ; erit ergo $\varepsilon y \Delta x + k \Delta x^2 + l \Delta x^3 + m \Delta x^4 + \text{etc.} = \varepsilon z \Delta x + K \Delta x^2 + L \Delta x^3 + M \Delta x^4 + \text{etc.}$ (84. §.), quod est impossibile, quin sit $\varepsilon y = \varepsilon z$ (29. §.).

96. Theorema.

Si vero partes variabiles $Y > Z$ duarum functionum $y=Y+A$, $z=Z+B$ unius variabilis absolutae x sint inaequales, quidquid sint partes constantes A, B ; erit exponens rationis differentialis functionis y habentis majorem partem variabilem, major exponente rationis differentialis alterius functionis z , nimirum $\varepsilon y > \varepsilon z$.

Demonstratio.

Suppono partem variabilem in quavis functione y et z a parte constanti perfecte esse separatam, ita ut e. gr. in functione y resoluta in seriem (63. §.) A denotet summam illorum duntaxat terminorum, qui carent variabili x , et Y exprimat summam reliquorum terminorum complectentium variabilem x . Sic si esset $y=Y+A=(a+x)^2+2b$, cum sit $(a+x)^2=a^2+2ax+x^2$; deberet esse pars variabilis $Y=2ax+x^2$, et pars constans $A=a^2+2b$.

Hoc praemisso manifestum fit, non posse esse $Y > Z$, nisi detur tertia aliqua functio X variabilis x , pro qua sit $Y=Z+X$: igitur $\varepsilon Y = \varepsilon Z + \varepsilon X$ (92. §.), hinc $\varepsilon Y > \varepsilon Z$, et $\varepsilon y > \varepsilon z$ (91. §.).

97. Corollarium 1.

Quoties exponentes εy , εz rationum differentialium debitarum duabus functionibus y, z unius variabilis absolutae x inter se aequales fuerint; toties debebunt esse etiam aut integrae functiones y, z , aut saltem illarum partes

partes variables inter se aequales (96. §.): eapropter est absolute impossibile, ut determinatus quispiam exponens rationis differentialis pluribus functionibus respondeat, quarum partes variables, non forma duntaxat, sed etiam magnitudine a se invicem differant.

98. Corollarium 2.

Si vero exponentes $ez \supset ey$ duarum rationum differentialium debitarum functionibus z , y unius variabilis absolutae x fuerint inaequales; erit quoque pars variabilis functionis z , cui major exponens respondet, major parte variabili alterius functionis y (95. 96. §.): et ideo est absolute impossibile, ut certa functio plures rationes differentiales recipiat. quarum exponentes, non tantum forma, sed et magnitudine a se invicem discrepent.

99. DEFINITIO.

Si $y = Z$ fit aliqua functio variabilis z (e. gr. $y = 1 - z^2$), poterit quoque z spectari instar certae functionis $z = Y$ variabilis y , quae per aequationem $y = Z$ est determinata (in assumpto exemplo erit ea functio $z = \sqrt{1 - y}$): determinatio functionis $z = Y$ variabilis y per functionem $y = Z$ variabilis z vocari potest *inversio functionis* y .

100. Corollarium.

Si data quaecunque functio $y = Z$ variabilis z inversa generet functionem $z = Y$ variabilis y ; erit y respectu functionis $z = Y$ aut variabilis absoluta, aut aliqua functio cuiuspiam variabilis absolutae x , prout fuerit z respectu functionis $y = Z$ vel variabilis absoluta, vel certa functio variabilis absolutae x (99. 4. §.): erit quoque functio $y = Z$ ita connexa cum functione $z = Y$, ut, dum pro quopiam valore v variabilis z ejus functio $y = Z$ certum valorem V induerit, valore V tributo ipsi y , tanquam quantitati variabili, ejus functio $z = Y$ valorem v debeat obtinere (99. §.).

101. Problema.

Si data quaecunque functio $y = Z$ variabilis z invertatur, ut $z = Y$ fiat certa functio variabilis y (99. §.); determinare relationem inter exponentes rationum differentialium, datae functioni $y = Z$ variabilis z , et alteri per illius inversionem obtentae functioni $z = Y$ variabilis y , debitarum.

Solutio.

Solutio.

1. Sit $y = Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$, unde per inversionem (99. §.) nascatur $z = Py^p + Qy^q + Ry^r + \text{etc.}$ (63. §.).

2. Erit $\varepsilon y = (aAz^{a-1} + bBz^{b-1} + cCz^{c-1} + \text{etc.})\varepsilon z$, et $\varepsilon z = (pPy^{p-1} + qQy^{q-1} + rRy^{r-1} + \text{etc.})\varepsilon y$, ubi erit $\varepsilon z = 1$ in prima, et $\varepsilon y = 1$ in secunda expressione, si z in functione y (1), adeoque y in functione z (1) fuerit variabilis absoluta (100. 86 88 §.).

3. Ponamus autem, assumpta utcumque parva quantitate e , variabilem y in functione z (1) abire in $y + e$, ipsam idcirco functionem z in (1) capere incrementum $E = (pPy^{p-1} + qQy^{q-1} + rRy^{r-1} + \text{etc.})e + ke^2 + le^3 + me^4 + \text{etc.}$ (65. §.).

4. Quodsi jam $z + E$ sumatur loco z in functione y (1); debet functio y in (1) ob (100. §.) capere incrementum e , nimirum abire in $y + e$, sicut z in (3) supponitur abire in $z + E$: incrementum hoc e functionis y in (1) erit ergo per (65. §.) $e = (aAz^{a-1} + bBz^{b-1} + cCz^{c-1} + \text{etc.})E + \beta E^2 + \gamma E^3 + \text{etc.}$

5. Ex (3) per (32. §.) elucet, quamvis *ntam* potentiam incrementi E aequari alicui polynomio formae generalis $\Phi^n e^n + K e^{n+1} + L e^{n+2} + \text{etc.}$, pro $\Phi = pPy^{p-1} + qQy^{q-1} + rRy^{r-1} + \text{etc.}$: si igitur potentiae $E, E^2, E^3, E^4, \text{etc.}$ per ejusmodi polynomia determinatae in (4) substitui cogitentur; debet inde pro certis coefficientibus $f, g, h, \text{etc.}$ independentibus ab e nasci aequatio $e = (aAz^{a-1} + bBz^{b-1} + cCz^{c-1} + \text{etc.})(pPy^{p-1} + qQy^{q-1} + rRy^{r-1} + \text{etc.})e + fe^2 + ge^3 + he^4 + \text{etc.}$, quae per e divisa dabit ob (24. §.) $1 = (aAz^{a-1} + bBz^{b-1} + cCz^{c-1} + \text{etc.})(pPy^{p-1} + qQy^{q-1} + rRy^{r-1} + \text{etc.})$, unde et ex (2) elucet quaesita relatio.

102. Corollarium.

Quoties fuerit $\varepsilon y = \alpha \varepsilon z$ exponens rationis differentialis functionis y datae per variabilem z ; toties exprimet $\varepsilon z = \frac{\varepsilon y}{\alpha}$ exponentem rationis differentialis functionis z variabilis y , quae per inversionem ex data functione y variabilis z potest obtineri, ita ut, si fuerit $\varepsilon z = 1$ in $\varepsilon y = \alpha \varepsilon z$ ob functionem y relata ad variabilem absolutam z , debeat etiam esse $\varepsilon y = 1$ in $\varepsilon z = \frac{\varepsilon y}{\alpha}$ ob functionem z relata ad variabilem absolutam y (100. 101. §.).

103. DEFINITIO.

Differentiatio datae functionis y est determinatio illius rationis differentialis dependens ab inventione exponentis ϵy (79. §.), quem deinceps nomine exponentis differentialis intelligemus.

104. Problema.

Differentiare functionem formae $y = Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$ pro quibuscumque coefficientibus A, B, C, etc. et exponentibus a, b, c, etc. rationalibus et irrationalibus, quavis item variabili z, absoluta sit, aut aliqua functio certae variabilis absolutae x. (4. §.).

Solutio.

Multiplicentur singuli termini per exponentes potentiarum variabilis z in iisdem contentarum, ipsis autem potentiis substituantur potentiae uno gradu inferiores, tum totum ducatur adhuc in exponentem ϵz rationis differentialis variabilis z; erit quaesitus exponens differentialis (103. §.) $\epsilon y = (a A z^{a-1} + b B z^{b-1} + c C z^{c-1} + \text{etc.}) \epsilon z$, pro $\epsilon z = 1$, si z est variabilis absoluta (86. 88. §.).

105. Problema.

Differentiare functionem $y = ZX$ aequalem producto ex duabus functionibus Z, X unius variabilis absolutae x.

Solutio.

Multiplicetur exponens differentialis cujusvis factoris seorsim sumti per factorem alterum; erit summa productorum aequalis quaesito exponenti differentiali ϵy (103. §.), nimirum $Z \epsilon X + X \epsilon Z = \epsilon y$.

Demonstratio.

Si variabilis absoluta x, ad quam functiones Z, X sunt relatae, augeatur differentia Δx ; abibit functio $y = ZX$ in $y^1 = (Z + \Delta Z)(X + \Delta X)$, eritque $\Delta y = Z \Delta X + X \Delta Z + \Delta X \Delta Z$ (19. 20. §.). Si ergo sumantur series differentiarum ΔX , ΔZ aequales per (84. §.); debet pro certis coefficientibus α, β, γ , etc. independentibus a Δx fieri $\Delta y = (Z \epsilon X + X \epsilon Z) \Delta x + \alpha \Delta x^2 + \beta \Delta x^3 + \gamma \Delta x^4 + \text{etc.}$, hinc $\epsilon y = Z \epsilon X + X \epsilon Z$ (82. §.).

106. Corollarium I.

Si functio $u = PQR - - - U$ aequetur producto ex functionibus P, Q, R, - - - U numero n, et $y = PQR - - - UV$ sit productum ex functionibus

ctionibus numero $n+1$; erit $\varepsilon y = \varepsilon \cdot PQR \dots UV = PQR \dots U \varepsilon V + V \varepsilon PQR \dots U$ (105. §.): quare, si $\varepsilon \cdot P, Q, R, \dots U$ supponatur aequari summae productorum ex exponentibus differentialibus singulorum factorum $P, Q, R, \dots U$ in omnes reliquos factores, debet εy aequari summae productorum, quae nascerentur, si exponens differentialis cujusvis functionis $P, Q, R, \dots U, V$ seorsim duceretur in omnes reliquas functiones.

107. Corollarium 2.

Hinc (106. §.) et ex (105. §.) per (31. §.) sequitur generatim, exponentem differentialem producti ex quocunque functionibus aequalem esse summae productorum, quae obtinerentur, si exponens differentialis cujuslibet functionis seorsim sumtae multiplicaretur per omnes reliquas functiones.

108. Problema.

Differentiare functionem fractam $y = \frac{U}{V}$ relata ad unam variabilem absolutam x .

Solutio.

Subtrahatur productum ex numeratore in exponentem differentialem denominatoris a producto ex denominatore in exponentem differentialem numeratoris, et residuum dividatur per quadratum denominatoris; erit quotus aequalis quaesito exponenti differentiali (103. §.), nimirum

$$\varepsilon y = \frac{V \varepsilon U - U \varepsilon V}{V^2}.$$

Demonstratio.

Ob $yV = U$ erit $y \varepsilon V + V \varepsilon y = \varepsilon U$ (95. 105. §.), unde facile elucet, quod erat demonstrandum.

109. Problema.

Differentiare logarithmum $y = \log u$ spectatum instar unius functionis variabilis u , absoluta ea fit, aut aequalis cuicunque functioni alicujus variabilis absolutae x .

Solutio.

Capto exponente differentiali variabilis u , dividatur is per ipsam variabilem u , et quotus ducatur in modulum M systematis, ad quod logarithmus $y = \log u$ spectat; erit productum aequale exponenti differentiali logarithmi

rithmi $y = lu$, qui petebatur (103. §.) nimirum $\varepsilon y = \frac{\varepsilon u}{u} M$, vel $\varepsilon y = \frac{M}{u}$, si u est variabilis absoluta.

Demonstratio.

In (35. §. 3. n.) per (41. §.), sumto modulo M pro A , et posita variabili $u = 1 + z$, hinc $\Delta u = \Delta z$ (21. §.), erit pro numeris ibidem determinatis B, C, D , etc., $\Delta lu = \frac{M \Delta u}{u} + \frac{B \Delta u^2}{u^2} + \frac{C \Delta u^3}{u^3} + \text{etc.}$; hinc $\varepsilon lu = \frac{M \varepsilon u}{u}$ (89. §.).

110. Corollarium 1.

Pro logarithmis naturalibus, quibus deinceps constanter utemur, est modulus $M = 1$ (41. §.): igitur $\varepsilon y = \varepsilon lu = \frac{\varepsilon u}{u}$, vel $\varepsilon lu = \frac{1}{u}$, si u est variabilis absoluta (109. §.).

111. Corollarium 2.

Si dati quicunque logarithmi spectentur instar quantitatum variabilium; poterunt per (110. §.) etiam logarithmi logarithmorum facile differentiari. Sic e. gr. $y = llu$ dabit $\varepsilon y = \frac{\varepsilon lu}{lu} = \frac{\varepsilon u}{ulu}$ (110. §.); et $y = llлу$ dabit $\varepsilon y = \frac{\varepsilon ll u}{ll u} = \frac{\varepsilon u}{ulu.ll u}$; et ita porro.

112. Corollarium 3.

Quantitates vero exponentiales differentiabuntur per eadem praecepta, si capiantur illarum logarithmi naturales. Sic functio $y = a^z$ dat $ly = zla$, hinc $\frac{\varepsilon y}{y} = \varepsilon zla$ (95. 110. 90. §.), adeoque $\varepsilon y = a^z \varepsilon zla$. Et si in $y = v^z$ sint v, z duae quaecunque functiones relatae ad unam variabilem absolutam x ; erit $ly = zlv$, et $\frac{\varepsilon y}{y} = z \frac{\varepsilon v}{v} + \varepsilon zlv$ (105. 110. §.), hinc $\varepsilon y = z v^{z-1} \varepsilon v + v^z \varepsilon zlv$.

113. Corollarium 4.

Pro basi e logarithmorum naturalium est $le = 1$; hinc $\varepsilon.e^z = e^z \varepsilon z$ (112. §.).

114. Corollarium 5.

Cognito autem exponente differentiali logarithmi naturalis datae cuiuscunque variabilis u , si is ducatur in modulum aut logarithmorum vulgarium (43. §.), aut aliorum logarithmorum artificialium, obtinebitur exponentis differentialis logarithmi vulgaris, aut alterius logarithmi artificialis ejusdem variabilis u (109. 110. §.).

115. Problema.

Consideratis sinu et cosinu arcus variabilis ϕ instar duarum functionum ejusdem arcus, invenire exponentes rationum differentialium iis functionibus debitarum.

Solutio.

Functiones ejusmodi habentur in (59. §.), et illarum differentiae in (56. §. 6. n. 57. §. 2. n.): nimirum pro certis coefficientibus $M, N, O, \dots p, q, r$, etc. independentibus a $\Delta \phi$ debet esse $\Delta \sin \phi = \Delta \phi \cos \phi + M \Delta \phi^2 + N \Delta \phi^3 + O \Delta \phi^4 + \text{etc.}$, et $\Delta \cos \phi = -\Delta \phi \sin \phi + p \Delta \phi^2 + q \Delta \phi^3 + r \Delta \phi^4 + \text{etc.}$ Quidquid sit ergo ϕ , variabilis absoluta, aut functio quaecunque alicujus variabilis absolutae; erit per (89. §.).

$$\varepsilon \sin \phi = \phi \cos \phi. \quad \varepsilon \cos \phi = -\varepsilon \phi \sin \phi.$$

116. Corollarium 1.

Cum sit $\sin v \phi = 1 - \cos \phi$ et $\cos v \phi = 1 - \sin \phi$; obtinebimus per (91. 115. §.) sequentes exponentes differentiales:

$$\varepsilon \sin v \phi = \varepsilon \phi \sin \phi. \quad \varepsilon \cos v \phi = -\varepsilon \phi \cos \phi.$$

117. Corollarium 2.

Est porro $\text{Tang } \phi = \frac{\sin \phi}{\cos \phi}$, et $\text{Cot } \phi = \frac{\cos \phi}{\sin \phi}$: per (108. 115. §.) debeat igitur esse.

$$\varepsilon \text{Tang } \phi = \frac{\varepsilon \phi}{\cos \phi^2} = \varepsilon \phi \sec \phi^2.$$

$$\varepsilon \text{Cot } \phi = \frac{-\varepsilon \phi}{\sin \phi^2} = -\varepsilon \phi \text{cosec } \phi^2.$$

118. Corollarium 3.

Denique est $\sec \phi = \cos \phi^{-1}$, et $\text{cosec } \phi = \sin \phi^{-1}$: per (104. 115. §.) inveniemus ergo

$$\varepsilon \sec \phi = \frac{\varepsilon \phi \sin \phi}{\cos \phi^2} = \varepsilon \phi \text{Tang } \phi \sec \phi.$$

$$\varepsilon \text{cosec } \phi = \frac{-\varepsilon \phi \cos \phi}{\sin \phi^2} = -\varepsilon \phi \text{Cot } \phi \text{cosec } \phi.$$

119. Corollarium 4.

Haecenus spectavimus sinus, cosinus, sinus et cosinus versos, tangentes, cotangentes, secantes, et cosecantes arcuum variabilium φ instar totidem functionum horum arcuum, quo casu erit ubique in praecedentibus $\varepsilon \varphi = 1$, si φ nulli functioni alicujus variabilis absolutae aequetur, sed sit ipsa variabilis absoluta; si ergo illae functiones cogitentur inverti, ut ex iis nascantur functiones exprimentes arcus φ per ipsorum sinus, cosinus, etc. (99. §.); obtinebimus pro his novis functionibus per (102. §.) ex (115, 116, 117, 118. §.) sequentes exponentes differentiales:

$$1. \varepsilon \varphi = \frac{\varepsilon \sin \varphi}{\cos \varphi}.$$

$$2. \varepsilon \varphi = -\frac{\varepsilon \cos \varphi}{\sin \varphi}.$$

$$3. \varepsilon \varphi = \frac{\varepsilon \sin v \varphi}{\sin \varphi}.$$

$$4. \varepsilon \varphi = -\frac{\varepsilon \cos v \varphi}{\cos \varphi}.$$

$$5. \varepsilon \varphi = \frac{\varepsilon \tan \varphi}{\sec \varphi^2}.$$

$$6. \varepsilon \varphi = -\frac{\varepsilon \cot \varphi}{\operatorname{cosec} \varphi^2}.$$

$$7. \varepsilon \varphi = \frac{\varepsilon \sec \varphi}{\tan \varphi \sec \varphi}.$$

$$8. \varepsilon \varphi = -\frac{\varepsilon \operatorname{cosec} \varphi}{\cot \varphi \operatorname{cosec} \varphi}.$$

120. Corollarium 5.

Si $\varphi = \operatorname{Arc} \sin z$, vel $\varphi = \operatorname{Arc} \cos z$ denotet arcum circuli, cujus sinus vel cosinus sit z ; erit $\sin \varphi = z$ et $\cos \varphi = \sqrt{1-z^2}$ casu primo, vel $\cos \varphi = z$ et $\sin \varphi = \sqrt{1-z^2}$ casu secundo: ob (119. §. 1. 2. n.) erit igitur

$$\varepsilon \operatorname{Arc} \sin z = \frac{\varepsilon z}{\sqrt{1-z^2}}. \quad \varepsilon \operatorname{Arc} \cos z = \frac{-\varepsilon z}{\sqrt{1-z^2}}.$$

121. Corollarium 6.

Si vero $\varphi = \operatorname{Arc} \sin v z$ vel $\varphi = \operatorname{Arc} \cos v z$ significet arcum, cujus sinus vel cosinus versus est z ; erit $\sin v \varphi = z$ et $\sin \varphi = \sqrt{2z-z^2}$ casu primo, vel $\cos v \varphi = z$ et $\cos \varphi = \sqrt{2z-z^2}$ casu altero: per (119. §. 3. 4. n.) obtinebimus igitur

$$\varepsilon \operatorname{Arc} \sin v z = \frac{\varepsilon z}{\sqrt{2z-z^2}}. \quad \varepsilon \operatorname{Arc} \cos v z = \frac{-\varepsilon z}{\sqrt{2z-z^2}}.$$

122. Corollarium 7.

Si porro $\varphi = \operatorname{Arc} \tan z$ vel $\varphi = \operatorname{Arc} \cot z$ exprimat arcum, cujus tangens vel cotangens est z ; erit $\tan \varphi = z$ et $\sec \varphi^2 = 1+z^2$ casu primo,

mo, vel $\text{Cot } \phi = z$ et $\text{Cofec } \phi^2 = 1 + z^2$ casu secundo: debet itaque esse per (119. §. 5. 6. n.)

$$\varepsilon \text{ Arc Tang } z = \frac{\varepsilon z}{1 + z^2} \quad \varepsilon \text{ Arc Cot } z = \frac{-\varepsilon z}{1 + z^2}.$$

123. Corollarium 8.

Si denique $\phi = \text{Arc Sec } z$ vel $\phi = \text{Arc Cofec } z$ denotet arcum, cujus fecans vel cofecans est z ; erit $\text{Sec } \phi = z$ et $\text{Tang } \phi \text{ Sec } \phi = z\sqrt{(1 - z^2)}$ casu primo, vel $\text{Cofec } \phi = z$ et $\text{Cot } \phi \text{ Cofec } \phi = z\sqrt{(1 - z^2)}$: igitur per (119. §. 7. 8. n.) fiet.

$$\varepsilon \text{ Arc Sec. } z = \frac{\varepsilon z}{z\sqrt{(1 - z^2)}} \quad \varepsilon \text{ Arc Cofec } z = \frac{-\varepsilon z}{z\sqrt{(1 - z^2)}}.$$

124. Problema.

Dato exponents primae rationis differentialis certae functionis y, invenire exponentes quarumvis altiorum rationum differentialium ejusdem functionis.

Solutio.

Dato $\varepsilon y = P$, quaeratur $\varepsilon \cdot \varepsilon y = \varepsilon^2 P$ exponens primae rationis differentialis functionis datae P ; erit $\varepsilon^2 y = \varepsilon^2 P$ exponens secundae rationis differentialis functionis y : invento $\varepsilon^2 y = \varepsilon^2 P = Q$, quaeratur $\varepsilon \cdot \varepsilon^2 y = \varepsilon^3 Q$ exponens primae rationis differentialis functionis Q ; erit $\varepsilon^3 y = \varepsilon^3 Q$ exponens tertiae rationis differentialis functionis y : et generatim cognito exponente $\varepsilon^n y = Z$ ntae rationis differentialis functionis y , quaeratur $\varepsilon \cdot \varepsilon^n y = \varepsilon^{n+1} Z$ exponens primae rationis differentialis functionis Z ; erit $\varepsilon^{n+1} y = \varepsilon^{n+1} Z$ exponens proximae altioris $(n + 1)$ esimae rationis differentialis functionis y (93. §.).

125. Corollarium 1.

Cum nulla sit functio assignabilis unius variabilis absolutae, pro qua exponens primae rationis differentialis ope praecedentium principiorum nequeat determinari; sufficient eadem principia ad inveniendos exponentes omnium altiorum rationum differentialium quarumvis functionum unius variabilis absolutae (124. 94. §.).

variabilis absolutae x exprimant, debebunt exponentes differentiales variabilium z, u, v instar totidem functionum variabilis absolutae x tractari, quo fiet, ut non modo primi exponentes differentiales $\varepsilon z, \varepsilon u, \varepsilon v$, sed etiam altiores, ut $\varepsilon^2 z, \varepsilon^3 z$, etc. in expressiones pro $\varepsilon y, \varepsilon^2 y, \varepsilon^3 y$, etc. ingre-
diantur. Sic functio $y = z^2$ dabit $\varepsilon y = 2z\varepsilon z$ (104. §.); $\varepsilon^2 y = 2z\varepsilon^2 z$
+ $2\varepsilon z^2$ (124. 105. §.); $\varepsilon^3 y = 2z\varepsilon^3 z + 6\varepsilon z\varepsilon^2 z$ (124. 92. 105. 104. §.),
et ita porro: functio $y = uv$ dabit $\varepsilon y = u\varepsilon v + v\varepsilon u$ (105. §.); $\varepsilon^2 y = u\varepsilon^2 v$
+ $v\varepsilon^2 u + 2\varepsilon u\varepsilon v$ (124. 92. 105. §.); $\varepsilon^3 y = u\varepsilon^3 v + v\varepsilon^3 u + 3\varepsilon u\varepsilon^2 v + 3\varepsilon v\varepsilon^2 u$
(124. 92. 105. 104. §.); et ita porro: functio autem $y = ux^2$, in qua est
 x variabilis absoluta, hinc $\varepsilon x = 1$, dabit $\varepsilon y = \varepsilon ux^2 + 2xu$ (105. 104. §.);
 $\varepsilon^2 y = 2u + 4x\varepsilon u + x^2\varepsilon^2 u$ (124. 92. 105. 104. §.); $\varepsilon^3 y = 6\varepsilon u + 6x\varepsilon^2 u + x^2\varepsilon^3 u$
(124. 92. 105. 104. §.), et sic porro.

129. Theorema.

Si, datis quantis Z, X determinatae magnitudinis, et duobus aliis U, V variabilibus, quorum quodvis possit fieri minus quovis dato quanto, pro quibuslibet valoribus quantorum U, V fuerit $Z > X \pm U$ et simul $Z < X \pm V$; erunt quanta Z, X inter se aequalia.

Demonstratio.

Impossibile est, ut sit $Z > X + U$ et simul $Z < X - V$ vel $Z < X + V$: si enim est $Z < X - V$; debet esse a fortiori $Z < X$, et $Z < X + U$: Si porro est $Z > X + U$; erit a fortiori $Z > X$; hinc, quia quanta Z, X sunt determinatae magnitudinis, extabit quantum tertium D magnitudinis pariter determinatae, pro quo fiat $Z = X + D$: cum autem, per hypothesin possit fieri $V < D$, poterit etiam fieri $X + V < Z$, eoque ipso est impossibile, ut, existente $Z > X + U$, sit simul $Z < X + V$ pro quibuslibet valoribus quantorum variabilium U, V .

Vi theorematís habebimus igitur binas sequentes condiciones possibili-
les, atque ex his evidenter potest demonstrari absoluta necessitas aequalita-
tis quantorum Z, X .

I. $Z > X - U$ et simul $Z < X + V$.

II. $Z > X - U$ et simul $Z < X - V$.

Si enim quanta Z, X non essent aequalia; deberet esse $Z > X$, vel $Z < X$, quorum utrumque pugnat cum assumtis conditionibus. Nam pro $Z > X$ absurda esset conditio secunda in (II), extaretque differentia $Z - X = D$ determinatae magnitudinis, pro qua fieret $Z = X + D$, hinc $D < V$ ob secundam conditionem in (I): igitur, cum per hypothesein possit fieri $V < D$, posset esse $D < V$ et simul $D > V$. Porro pro $Z < X$ esset $X = Z + D$ pro certo quanto D determinatae magnitudinis, hinc $Z = X - D$, et ideo $D < U$ ob primam conditionem in (I) et (II): quare, cum per hypothesein possit fieri $U < D$, posset esse $U < D$ et simul $U > D$.

130. Corollarium 1.

Ex hoc principio generali methodi exhaustionis antiquorum sequitur aliud principium analyticum, quod insignem habet usum in plurimis disquisitionibus maximi momenti: si nimirum $Z, X, P, Q, R, \dots p, q, r$, etc. sint quanta independentia a variabili ω , sitque pro quovis valore hujus variabilis $Z > X + p\omega + q\omega^2 + r\omega^3 + \text{etc.}$, et simul $Z < X + P\omega + Q\omega^2 + R\omega^3 + \text{etc.}$; debeat esse $Z = X$ (76. 129. §.).

131. Corollarium 2.

Quamobrem, si differentia Δy certae functionis y relatae ad variabilem absolutam x ita dependeat a differentia Δx ejusdem variabilis, ut pro certis quantitatibus $E, F, G, \dots e, f, g$, etc. independentibus a Δx et quovis possibili valore differentiae Δx (15. §.) debeat esse $\Delta y > X\Delta x + e\Delta x^2 + f\Delta x^3 + g\Delta x^4 + \text{etc.}$ et simul $\Delta y < X\Delta x + E\Delta x^2 + F\Delta x^3 + G\Delta x^4 + \text{etc.}$, quia eo ipso debet etiam fieri $\epsilon y > X + (e - k)\Delta x + (f - l)\Delta x^2 + (g - m)\Delta x^3 + \text{etc.}$, et $\epsilon y < X + (E - k)\Delta x + (F - l)\Delta x^2 + (G - m)\Delta x^3 + \text{etc.}$ (84. §.); erit $\epsilon y = X$ exponens differentialis functionis y (130. §.), cui $\epsilon y = X\epsilon x$ poterit substitui (81. §.).

132. Corollarium 3.

Huic principio (131. §.) innititur methodus quaerendi exponentes differentiales functionum incognitarum, qua in sequentibus frequenter utemur; quacunque vero methodo, hac aut alia simili, determinatus fuerit exponens differentialis ϵy , debeat is sumi cum signis contrariis, si constet, functionem y decrescere, crescente variabili (18. 79.).

133. DEFINITIO.

Quantitates variables u, v dependent a se invicem, si quoties alterutra ipsarum mutatur, ex hac mutatione certa mutatio in alteram redundat: quodsi autem quantitates u, v tales sint, ut quaevis ipsarum possit mutari, quin ideo etiam altera mutari debeat, erunt eae independentes a se invicem.

134. Corollarium 1.

Quaevis duarum a se invicem dependentium variabilium u, v potest spectari instar certae functionis alterius variabilis; quocirca erit alterutra ipsarum variabilis absoluta; vel ambae aequabuntur duabus functionibus unius variabilis absolutae x (133. 4. §.).

135. Corollarium 2.

Omnis functio y plurium a se invicem dependentium variabilium censenda est referri ad unicam variabilem absolutam (134. §.), cujus differentiatio idcirco praecedentibus praeceptis subjacet.

136. Corollarium 3.

Si vero quantitates variables u, v sint independentes a se invicem, non poterit una ipsarum aequari certae functioni alterius (133. §.): quamobrem debet esse quaevis ipsarum variabilis absoluta (4. §.); aut alterutra erit variabilis absoluta, et altera aequalis certae functioni alicujus variabilis absolutae x ; vel ambae aequabuntur quibusdam functionibus duarum variabilium absolutarum x, z .

137. Corollarium 4.

Omnis functio y plurium a se invicem independentium variabilium u, v, z , etc. censenda est referri ad plures variables absolutas, ita ut proprie nunquam liceat ejusmodi functionem y ad unicam aliquam variabilem absolutam p relatum spectare, a cujus mutationibus pendeant mutationes functionis y , singularumque variabilium u, v, z , etc.

138. Corollarium 5.

Quoties tamen variables u, v, z , etc. in data functione y a se invicem independentes fuerint; licebit illas mutationes seorsim considerare, quae ex certis mutationibus variabilium u, v, z , etc. seorsim sumtarum in functionem y debent redundare, ita e. gr., ut jam u, v , jam u, z , jam vero v, z pro constantibus quantitatibus possint sumi, adeoque y instar certae functionis

nis unius variabilis, z casu primo, v casu secundo, et u casu tertio queat spectari (133. §.).

139. DEFINITIO.

Nomine *primae rationis differentialis* functionis y plurium a se invicem independentium variabilium u, v, z , etc. intelligemus rationem, cujus exponens εy aequatur summae exponentium primarum rationum differentialium, quas functio y pro singulis seorsim sumtis variabilibus, u, v, z , etc. recipit (138. §.).

140. Corollarium 1.

Exponens *ntae* rationis differentialis functionis y plurium variabilium u, v, z commodissime exprimetur, vel simpliciter signo $\varepsilon^n y$, vel, quo ipsae variables in y contentae exhibeantur, signo $^{uvz} \varepsilon^n y$; signa vero $^u \varepsilon^n y$, $^v \varepsilon^n y$, $^z \varepsilon^n y$ expriment exponentes *ntarum* rationum differentialium functioni y pro variabilibus u, v, z seorsim sumtis (138. §.) debitarum: erit igitur $\varepsilon y = ^{uvz} \varepsilon y = ^u \varepsilon y + ^v \varepsilon y + ^z \varepsilon y$ (139. §.).

141. Corollarium 2.

Data functione y plurium a se invicem independentium variabilium u, v, z , invenietur exponens $\varepsilon y = ^{uvz} \varepsilon y$ illius primae rationis differentialis, si per praecedentia praecepta quaerantur exponentes primarum rationum differentialium, quas functio y pro singulis seorsim sumtis variabilibus u, v, z reciperet, iidem dein exponentes in unam summam addantur (140. 139. §.).

142. Corollarium 3.

Sicut autem ex data functione y plurium a se invicem independentium variabilium u, v, z per praecedentia praecepta elicitur exponens εy illius primae rationis differentialis (141. §.); sic poterit ex hoc ipso exponente elici exponens $\varepsilon^2 y$ secundae, ex isto vero exponens $\varepsilon^3 y$ tertiae, ex hoc porro exponens $\varepsilon^4 y$ quartae, etc. rationis differentialis ejusdem functionis y (139. 124. §.).

143. Corollarium 4.

Omnis functio plurium variabilium a se invicem dependentium u, v, z , etc. exprimi potest formula generali $y = Au^a v^b z^c$ etc. $+ Bu^d v^e z^f$ etc. $+ Cu^g v^h z^i$ etc. $+ \text{etc.}$ (63. §.), eritque (135. §.)

$$\begin{aligned} \epsilon y = & (c A u^a v^b z^{c-1} + f B u^d v^e z^{f-1} + i C u^g v^h z^{i-1} + \text{etc.}) \epsilon z \\ & + (b A u^a z^c v^{b-1} + e B u^d z^f v^{e-1} + h C u^d z^i v^{h-1} + \text{etc.}) \epsilon v \\ & + (a A v^b z^c u^{a-1} + d B v^e z^f u^{d-1} + g C v^h z^i u^{g-1} + \text{etc.}) \epsilon u \\ & + \quad \text{etc.} \quad \quad \quad \text{etc.} \quad \quad \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Ob (139. §.) est ergo $\epsilon y = {}^z \epsilon y + {}^v \epsilon y + {}^u \epsilon y$.

144. Corollarium 5.

Quamobrem methodus differentiandi functiones plurium a se invicem independentium variabilium in (141. 142. §.) praescripta, extendi potest generatim ad omnes functiones plurium variabilium, seu hae dependeant a se invicem, seu non (143. §.).

145. Theorema.

Exponens primae rationis differentialis cujusvis functionis y duarum variabilium u, v debet habere formam functionis $M \epsilon u + N \epsilon v$, in qua semper sit

$$\frac{{}^v \epsilon M}{\epsilon v} = \frac{{}^u \epsilon N}{\epsilon u}$$

Demonstratio.

Generatim potest poni $y = A u^a v^b + B u^c v^d + C u^e v^f + \text{etc.}$ (63. §.), unde pro $M = a A v^b u^{a-1} + c B v^d u^{c-1} + e C v^f u^{e-1} + \text{etc.}$, et $N = b A u^a v^{b-1} + d B u^c v^{d-1} + f C u^e v^{f-1} + \text{etc.}$, obtinetur ${}^u \epsilon y = M \epsilon u$, ${}^v \epsilon y = N \epsilon v$: igitur (140. 144. §.) ${}^{uv} \epsilon y = M \epsilon u + N \epsilon v$, et $\frac{{}^v \epsilon M}{\epsilon v} = \frac{{}^u \epsilon N}{\epsilon u}$.

146. Corollarium 1.

Ex ${}^u \epsilon y = M \epsilon u$, ${}^v \epsilon y = N \epsilon v$, obtinetur ${}^v \epsilon. {}^u \epsilon y = {}^v \epsilon M \epsilon u$, ${}^u \epsilon. {}^v \epsilon y = {}^u \epsilon N \epsilon v$: cum igitur debeat esse ${}^u \epsilon N \epsilon v = {}^v \epsilon M \epsilon u$ (145. §.), quaelibet functio y duarum variabilium u, v ita est comparata, ut pro ea debeat fieri ${}^v \epsilon. {}^u \epsilon y = {}^u \epsilon. {}^v \epsilon y$.

147. Corollarium 2.

Si functio quaecunque y duarum variabilium u, v bis continuo differentietur, ita ut primum capiatur exponens differentialis functionis y pro sola variabili u, tum exponens differentialis exponentis ${}^u \epsilon y$ pro sola variabili v, vel primum differentietur y pro sola variabili v, tum ipse exponens ${}^v \epsilon y$ differentietur pro sola variabili u; eadem utroque casu obtinebitur functio formae generalis $X \epsilon u \epsilon v$, denotante X functionem independentem ab exponentibus differentialibus ϵu , ϵv (146. §.).

148. Corollarium 3.

Ex his facilis est transitus ad inventionem legum, quibus tam exponentes altiorum rationum differentialium functionibus duarum variabilium debitarum, quam exponentes rationum differentialium debitarum functionibus trium, quatuor, etc. variabilium subjacent. Sic, quia exponens primae rationis differentialis functionis y duarum variabilium u, v debet habere formam functionis $\varepsilon y = M \varepsilon u + N \varepsilon v$; habebit exponens *differentio-differentialis*, seu exponens secundae rationis differentialis ejusdem functionis y formam functionis $\varepsilon^2 y = u_\varepsilon (M \varepsilon u + N \varepsilon v) + v_\varepsilon (M \varepsilon u + N \varepsilon v) = u_\varepsilon M \varepsilon u + M \varepsilon^2 u + u_\varepsilon N \varepsilon v + v_\varepsilon M \varepsilon u + v_\varepsilon N \varepsilon v + N \varepsilon^2 v$ (141. 142. §.); consequenter, posito $u_\varepsilon M = Q \varepsilon u$, $v_\varepsilon N = R \varepsilon v$, et $u_\varepsilon N = p \varepsilon u$, $v_\varepsilon M = q \varepsilon v$, erit semper.

$$\varepsilon^2 y = M \varepsilon^2 u + N \varepsilon^2 v + P \varepsilon u \varepsilon v + Q \varepsilon u^2 + R \varepsilon v^2,$$

$$\text{pro } Q = \frac{u_\varepsilon M}{\varepsilon u}, R = \frac{v_\varepsilon N}{\varepsilon v}, \text{ et ob (145. §.)}$$

$$P = p + q = \frac{v_\varepsilon M}{\varepsilon v} + \frac{u_\varepsilon N}{\varepsilon u} = 2 \left(\frac{v_\varepsilon M}{\varepsilon v} \right) = 2 \left(\frac{u_\varepsilon N}{\varepsilon u} \right).$$

149. Corollarium 4.

Exponens vero primae rationis differentialis cujusvis functionis y trium variabilium p, q, r continebitur formula generali $\varepsilon y = p_\varepsilon y + q_\varepsilon y + r_\varepsilon y$ (140. 141. §.) $= P \varepsilon p + Q \varepsilon q + R \varepsilon r$, ita ut, quia quaevis variabilium p, q, r seorsim sumta in ejusmodi differentiatione instar constantis quantitatis potest spectari, debeat esse $\frac{q_\varepsilon P}{\varepsilon q} = \frac{p_\varepsilon Q}{\varepsilon p}$, $\frac{r_\varepsilon P}{\varepsilon r} = \frac{p_\varepsilon R}{\varepsilon p}$, $\frac{r_\varepsilon Q}{\varepsilon r} = \frac{q_\varepsilon R}{\varepsilon q}$ (145. §.).

150. Corollarium 5.

Deinde si functio y trium variabilium p, q, r continuo ter differentietur, quocunque ordine haec differentiatio perficiatur, puta primum differentiendo ipsam functionem y pro sola variabili p , tum differentiendo exponentem $p_\varepsilon y$ pro sola variabili q , ac demum differentiendo exponentem $q_\varepsilon p_\varepsilon y$ pro variabili r , vel alio quovis ordine; eadem semper prodibit functio formae generalis $Z \varepsilon p \varepsilon q \varepsilon r$, exprimente Z functionem independentem ab exponentibus differentialibus $\varepsilon p, \varepsilon q, \varepsilon r$: id enim ex (149. §.), ut (147. §.) ex (145. §.) potest colligi.

151. Theorema.

Si capiatur ntus exponens differentialis ${}^m \epsilon y$, et ntus exponens differentialis ${}^n \epsilon y$ functionis y duarum variabilium u, v , prior pro sola variabili u , et posterior pro sola v , tum quaeratur ntus exponens differentialis ${}^n \epsilon y$ exponentis ${}^m \epsilon y$ pro sola variabili v , et ntus ${}^m \epsilon y$ exponentis ${}^n \epsilon y$ pro sola variabili u ; debet esse ${}^n \epsilon y \cdot {}^m \epsilon y = {}^m \epsilon y \cdot {}^n \epsilon y$.

Demonstratio.

1. Ponamus pro certo indice r esse ${}^r \epsilon y = {}^r \epsilon y$; erit etiam ${}^u \epsilon y \cdot {}^r \epsilon y = {}^u \epsilon y \cdot {}^r \epsilon y$: est autem ${}^u \epsilon y \cdot {}^r \epsilon y = {}^r \epsilon y \cdot {}^u \epsilon y$ (146. §.) = ${}^r \epsilon y \cdot {}^{r+1} \epsilon y$, et ${}^u \epsilon y \cdot {}^r \epsilon y = {}^r \epsilon y \cdot {}^u \epsilon y$: igitur debet esse ${}^r \epsilon y = {}^r \epsilon y$. Hinc et ex (146. §.) per (31. §.) sequitur, pro quovis possibili indice k debere esse ${}^k \epsilon y = {}^k \epsilon y$.

2. Porro fit pro indeterminatis indicibus r, m , ${}^r \epsilon y \cdot {}^m \epsilon y = {}^m \epsilon y \cdot {}^r \epsilon y$; erit etiam ${}^{r+1} \epsilon y \cdot {}^m \epsilon y = {}^m \epsilon y \cdot {}^{r+1} \epsilon y$ ob (1): quare, cum pro $r=1$ re ipsa sit ${}^u \epsilon y = {}^u \epsilon y$ ob (1), debet pro quovis possibili indice n ob (31. §.) esse ${}^n \epsilon y = {}^n \epsilon y$.

152. Corollarium 1.

Hinc (151. §.) per (140. 141. §.) obtinebimus sequentes expressiones pro exponentibus differentialibus ϵy , ${}^2 \epsilon y$, ${}^3 \epsilon y$, ${}^4 \epsilon y$ functionis indeterminatae y duarum variabilium u, v .

$$\epsilon y = {}^u \epsilon y + {}^v \epsilon y.$$

$${}^2 \epsilon y = {}^2 \epsilon y + 2 {}^u \epsilon y \cdot {}^v \epsilon y + {}^v {}^2 \epsilon y.$$

$${}^3 \epsilon y = {}^3 \epsilon y + 3 {}^u \epsilon y \cdot {}^2 \epsilon y + 3 {}^u \epsilon y \cdot {}^v {}^2 \epsilon y + {}^v {}^3 \epsilon y.$$

$${}^4 \epsilon y = {}^4 \epsilon y + 4 {}^u \epsilon y \cdot {}^3 \epsilon y + 6 {}^u \epsilon y \cdot {}^v {}^2 \epsilon y + 4 {}^u \epsilon y \cdot {}^v {}^3 \epsilon y + {}^v {}^4 \epsilon y.$$

153. Corollarium 2.

Lex, quam sequuntur termini singularum expressionum in (152. §.), manifesta est: si sumas expressionem exponentis differentialis ϵy pro in-

deter-

determinato indice r eidem lege conformem, tum ex illa elicias $\varepsilon y = s. \varepsilon y$ per (140. 142. §.), invenies, facta per (151. §.) reductione, etiam exponentem differentialem εy ei legi subjacere: hinc igitur per (31. §.) sequetur, quemvis $ntum$ exponentem differentialem cujuslibet functionis y duarum variabilium u, v sequenti formula contineri:

$$\begin{aligned} \varepsilon y = & u^n \varepsilon y + \frac{n}{1} \cdot u^{n-1} \cdot v \varepsilon y + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot u^{n-2} \cdot v^2 \varepsilon y \\ & + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot u^{n-3} \cdot v^3 \varepsilon y + \dots \\ & + \frac{n(n-1) \dots (n-r+1)}{1 \cdot 2 \dots r} \cdot u^{n-r} \cdot v^r \varepsilon y + \dots + v^n \varepsilon y. \end{aligned}$$

154. Corollarium 3.

Ex hac generalissima formula, ob $u^n(\varepsilon v) = v \varepsilon u$, $v^n(\varepsilon u) = u \varepsilon v$, et generatim $u^{n-r}(\varepsilon^r u v) = u^{n-r} \varepsilon^r v$, sequitur formula pro nto exponente differentiali producti $y = uv$ ex duabus variabilibus u, v , nimirum,

$$\begin{aligned} \varepsilon. uv = & v \varepsilon u + \frac{n}{1} \cdot u^{n-1} \varepsilon u \varepsilon v + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot u^{n-2} \varepsilon^2 u \varepsilon v + \dots \\ & + \frac{n(n-1) \dots (n-r+1)}{1 \cdot 2 \dots r} \cdot u^{n-r} \varepsilon^r u \varepsilon v + \dots + u \varepsilon v. \end{aligned}$$

155. Problema.

Invenire generalem expressionem valoris, quem functio y variabilis z obtineat, si haec variabilis augeatur data quantitate ω .

Solutio.

Variabilis z vel est absoluta, vel aequalis certae functioni alicujus variabilis absolutae x (4. §.): quidquid ea sit, spectetur ut absoluta, quo fiat $\varepsilon z = 1$, tum in hac hypothesi quaerantur exponentes differentiales εy , $\varepsilon^2 y$, $\varepsilon^3 y$, $\varepsilon^4 y$ etc.: si enim Y valorem denotet, quem functio y , variabili z abeunte in $z + \omega$, debet obtinere, erit per (64. 127. §.)

$$Y = y + \frac{\varepsilon y}{1} \omega + \frac{\varepsilon^2 y}{1 \cdot 2} \omega^2 + \frac{\varepsilon^3 y}{1 \cdot 2 \cdot 3} \omega^3 + \dots + \frac{\varepsilon^r y}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots r} \omega^r.$$

Seu, quod in idem recidit, ob $\varepsilon z = 1$

$$Y = y + \frac{\omega}{1} \cdot \frac{\varepsilon y}{\varepsilon z} + \frac{\omega^2}{1 \cdot 2} \cdot \frac{\varepsilon^2 y}{\varepsilon z^2} + \frac{\omega^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon z^3} + \dots + \frac{\omega^r}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots r} \cdot \frac{\varepsilon^r y}{\varepsilon z^r}.$$

156. Corollarium 1.

Si $-\omega$ loco ω fumatur in (155. §.), prodibit inde fequens generalis expreffio valoris, quem functio y data per variabilem z obtineret, fi haec variabilis minueretur quantitate ω .

$$Y = y - \frac{\varepsilon y}{1} \omega + \frac{\varepsilon^2 y}{1.2} \omega^2 - \frac{\varepsilon^3 y}{1.2.3} \omega^3 + \dots + \frac{\varepsilon^r y}{1.2.3 \dots r} \omega^r.$$

Vel ob $\varepsilon z = 1$.

$$Y = y - \frac{\omega}{1} \cdot \frac{\varepsilon y}{\varepsilon z} + \frac{\omega^2}{1.2} \cdot \frac{\varepsilon^2 y}{\varepsilon^2 z^2} - \frac{\omega^3}{1.2.3} \cdot \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon^3 z^3} + \dots + \frac{\omega^r}{1.2 \dots r} \cdot \frac{\varepsilon^r y}{\varepsilon^r z^r}.$$

157. Corollarium 2.

Quamobrem, pofitis coefficientibus numericis $\frac{1}{1} = \alpha$, $\frac{1}{1.2} = \alpha^2$, $\frac{1}{1.2.3} = \alpha^3$, $\dots$, $\frac{1}{1.2 \dots r} = \alpha^r$, erit generatim, prout variabilis z augetur, vel minuitur quantitate ω (155. 156. §.)

$$Y = y \pm \alpha \varepsilon y \omega + \alpha^2 \varepsilon^2 y \omega^2 \pm \alpha^3 \varepsilon^3 y \omega^3 + \dots \pm \alpha^r \varepsilon^r y \omega^r.$$

Vel

$$Y = y \pm \alpha \frac{\varepsilon y}{\varepsilon z} \omega + \alpha^2 \frac{\varepsilon^2 y}{\varepsilon^2 z^2} \omega^2 \pm \alpha^3 \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon^3 z^3} \omega^3 + \alpha^4 \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon^4 z^4} \omega^4 \pm \dots + \alpha^r \frac{\varepsilon^r y}{\varepsilon^r z^r} \omega^r.$$

158. Corollarium 3.

Si, data funtione Z duarum variabilium u, v , variabilis u maneat conftans, et v abeat in $v + \Delta v$; obtinebit Z fequentem valorem X per (155. §.), ubi, v confiderando inftar variabilis absolutae, eft $\varepsilon v = 1$; fi porro in X maneat v conftans, et u abeat in $u + \Delta u$; induet X fequentem valorem Z^1 (155. §.), fumta variabili u pro absoluta, quo fiat $\varepsilon u = 1$: fi igitur ex prima ferie eliciantur series pro εX , $\varepsilon^2 X$, $\varepsilon^3 X$, etc. eae dein fubftituantur in fecunda ferie, tum reductio fiat per (151. §.); obtinebitur tertia ferie, valorem Z^1 generatim exprimens, quem quaevis functio Z variabilium u, v eo cafu induet, fi hae ambae fimul in $u + \Delta u$, $v + \Delta v$ abeant.

$$X = Z + \frac{\varepsilon Z \Delta v}{1} + \frac{\varepsilon^2 Z \Delta v^2}{1.2} + \frac{\varepsilon^3 Z \Delta v^3}{1.2.3} + \dots + \frac{\varepsilon^r Z \Delta v^r}{1.2 \dots r}.$$

CAPUT III.
DE
PALMARIIS QUIBUSDAM ADPLICATIONIBUS
CALCULI DIFFERENTIALIS AD THEO-
RIAM FUNCTIONUM.

160. DEFINITIO.

Omnis aequatio, translatis ejus terminis ad unum membrum, induet formam aequationis $Z=0$. Si Z fuerit functio unius aut plurium variabilium, erit $Z=0$ aequatio *determinata casu primo*, et *indeterminata casu secundo*. Utroque porro casu appellabitur aequatio $Z=0$ *algebraica* vel *transcendens*, prout fuerit Z functio pure algebraica, vel saltem ex parte transcendens (5. §.).

161. Problema.

Datam aequationem $VX^{\frac{m}{n}} - U = 0$ continentem functionem irrationalem $X^{\frac{m}{n}}$ convertere in aliam, quae omni irrationalitate afficiente functionem X careat.

Solutio.

Cum sit $X^{\frac{m}{n}} = \frac{U}{V}$, erit differentiando $X^{\frac{m}{n}} = \frac{nX^{\varepsilon}\left(\frac{U}{V}\right)}{m\varepsilon X}$: igitur erit $\frac{U}{V} = \frac{nX^{\varepsilon}\left(\frac{U}{V}\right)}{m\varepsilon X}$ aequatio quaesita.

162. Corollarium 1.

Hac ratione poterit data quaevis aequatio $Z=0$ ab omni irrationalitate afficiente quantitates variables liberari: quare, cum praeterea omnis aequatio facile a fractionibus, si quas contineat, liberetur, licebit omnem aequationem algebraicam $Z=0$ ita considerare, ut Z sit aliqua functio integra et rationalis unius aut plurium variabilium (160. §.).

163. Corollarium 2.

Expressio generalis omnis aequationis algebraicae determinatae poterit esse haec; $Z = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots + Px + Q = 0$, aut alia hujus formae (162. §.): dicetur ea vero esse *1mi*, *2di*, *3tii*, vel generatim *mti ordinis*, prout functio Z fuerit *1mi*, *2di*, *3tii*, etc. ordinis (9. §.).

164. Corollarium 3.

Aequatio autem algebraica indeterminata $Z = 0$ inter plures variables u, v, z poterit induere formam similem praecedenti (163. §.), ita ut quilibet terminus vel aliquam potentiam unius tantum variabilis, vel productum ex certis potentiis plurium variabilium complectatur (160. 162. §.): pertinebit idcirco aequatio $Z = 0$ ad *ordinem 1mum*, vel *2dum*, aut *3tium*, vel generatim *mtum*, prout fuerit functio Z *1mi*, vel *2di*, aut *3tii*, vel *mti ordinis* (8. §.). Eapropter, si aequatio indeterminata $Z = 0$ fuerit *mti ordinis*, in nullo termino poterit summa exponentium quantitatum variabilium u, v, z in eodem termino contentarum indicem ordinis m excedere (8. §.).

165. DEFINITIO.

Radix aequationis determinatae (163. §.) vocatur is determinatus valor variabilis x , quo loco x assumpto functio $Z = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots$ re ipsa fit aequalis nihilo. Sic e. gr. functio $Z = x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6$ fiet pro quovis quatuor valorum $x = 2$, $x = -3$, $x = \sqrt{-1}$, $x = -\sqrt{-1}$ aequalis nihilo: quivis horum valorum dat igitur unam radicem aequationis $Z = x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6 = 0$.

166. Corollarium 1.

Cum functio Z nequeat aequari nihilo, nisi variabilis x determinatum aliquem valorem habeat, necesse est, ut omnis aequatio $Z = 0$ saltem unam habeat radicem, quidquid ea sit, realis, vel imaginaria (165. §.).

167. Corollarium 2.

Omnis aequatio quadratica $x^2 + Ax + B = 0$ habet duas radices, $x = -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}\sqrt{(A^2 - 4B)}$, et $x = -\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}\sqrt{(A^2 - 4B)}$, quarum utraque erit realis, pro $A^2 = 4B$, et $A^2 > 4B$, vel utraque imaginaria pro $A^2 < 4B$ (165. §.).

168. DEFINITIO.

Factores datae functionis integrae et rationalis $Z = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Px + Q$ vocantur functiones pariter integrae et rationales, quae inter se multiplicatae producant functionem Z : functiones ejusmodi *1mi*, vel *2di*, aut *3tii*, etc. ordinis (9. §.) appellantur *factores simplices*, vel *duplices* seu *quadratici*, aut *triplices* seu *cubici*, et ita porro.

169. Corollarium 1.

Functio integra et rationalis Z *divisibilis* est per aliam functionem integram et rationalem F , si ea per hanc divisa generet quotum aequalem functioni integrae et rationali X : omnis igitur functio integra et rationalis Z erit per quemvis suum factorem F divisibilis; et quaevis functio integra et rationalis F , per quam altera Z sit divisibilis, erit unus factor hujus functionis (168. §.).

170. Corollarium 2.

Pro $F = x - \mu$ in (169. §.) erit $Z = X(x - \mu)$, hinc $Z = 0$ pro $x = \mu$: quilibet ergo factor simplex $x - \mu$ functionis integrae et rationalis $Z = x^m + Ax^{m-1} + \dots + Px + Q$ dat unam radicem aequationis determinatae $Z = 0$ (165. §.).

171. Corollarium 3.

Omnis functio quadratica $\gamma x^2 + \beta x + \alpha$ habet duos factores simplices $x\sqrt{\gamma} + \frac{1}{2\sqrt{\gamma}}(\beta - \sqrt{(\beta^2 - 4\alpha\gamma)})$ et $x\sqrt{\gamma} + \frac{1}{2\sqrt{\gamma}}(\beta + \sqrt{(\beta^2 - 4\alpha\gamma)})$, utrumque realem, si sit $\beta^2 = 4\alpha\gamma$ vel $\beta^2 > 4\alpha\gamma$, aut utrumque imaginarium pro $\beta^2 < 4\alpha\gamma$ (168. §.).

172. Corollarium 4.

Arcus circuli ϕ , cujus sinus vel cosinus excedat radium, est impossibilis: quaelibet ergo functio quadratica $\gamma x^2 + \beta x + \alpha$ constans ex imaginariis factoribus simplicibus poterit exprimi formula $q^2 x^2 - 2pqx \cos \phi + p^2$, ipsi vero ejus factores imaginarii erunt $p(\cos \phi + \sin \phi \sqrt{-1}) - qx$ et $p(\cos \phi - \sin \phi \sqrt{-1}) - qx$ (171. §.).

173. Theorema.

Functio integra et rationalis $Z = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + Dx^{m-4} + \dots + Kx + L$ ordinis *mti* tot semper, nec plures,

neque pauciores, habebit factores simplices formæ $x - \mu$, quot unitates sunt in exponente m ordinis, ad quem ea pertinet.

Demonstratio.

1. Si sumantur numero m quantitates indeterminatae $a, b, c, d, \dots k, l$; erit productum $(x-a)(x-b)(x-c) \dots (x-k)(x-l) = x^m + Px^{m-1} + Qx^{m-2} + Rx^{m-3} + \dots + Ux + V$ certa functio ordinis m ti, in qua quantitates $a, b, c, \dots k, l$, lege per naturam multiplicationis determinata inter se connexae constituent coefficients $P, Q, R, \dots U, V$: quod si ergo supponamus hanc functionem aequari datae functioni Z , quo fiat $P=A, Q=B, R=C, \dots U=K, V=L$ (29. §.); nascentur numero m aequationes inter totidem indeterminatas quantitates $a, b, c, \dots k, l$ et datos coefficients $A, B, C, \dots K, L$, ex quibus porro poterunt derivari aequationes determinatae, quarum quaevis unicam duntaxat quantitatem incognitam $a, b, c, \dots k, l$ complectatur: quare, cum per quamvis harum aequationum determinatarum unus saltem valor incognitae $a, b, c, \dots k, l$, quam illa continet, perfecte sit determinatus (166. §.); extabunt eo ipso pro singulis incognitis $a, b, c, \dots k, l$ certi valores, quibus loco $a, b, c, \dots k, l$ assumtis re ipsa fiat $P=A, Q=B, R=C, \dots U=K, V=L$, hinc etiam $Z = (x-a)(x-b)(x-c) \dots (x-k)(x-l)$.

2. Est porro impossibile, ut functio Z praeter hos factores alium aliquem, ab illis distinctum, factorem simplicem $x - \alpha$ habeat. Nam pro certa functione X deberet fieri $Z = X(x - \alpha)$ per (168. §.); adeoque etiam $(x-a)(x-b)(x-c) \dots (x-k)(x-l) = X(x - \alpha)$: illud igitur productum fieret $= 0$ pro $x = \alpha$, quod est impossibile, quin eo ipso aliquis factorum $x-a, x-b, x-c, \dots x-k, x-l$ fiat aequalis nihilo, puta $x-a=0$, hinc $x=a=\alpha$, contra hypothesin, cum $x-\alpha$ debeat esse factor a singulis illis factoribus distinctus.

174. Corollarium 1.

Quaelibet radix $x=\alpha$ aequationis determinatae $Z = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots + Kx + L = 0$ dat unum factorem simplicem $x - \alpha$ functionis Z (165. 173. §. 2. n.).

175. Corollarium 2.

Omnis aequatio determinata $Z=0$ ordinis m ti (174. §.) habet radices numero m , nec plures, neque pauciores (170. 173. 174. §.).

176. Corollarium 3.

Quaelibet aequatio $Z = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Kx + L = 0$ ordinis *mti*, si ejus radices numero *m* sint *a*, *b*, *c*, --- *k*, *l*, potest spectari instar producti ex *m* aequationibus *radicalibus* $x - a = 0$, $x - b = 0$, $x - c = 0$, --- $x - k = 0$, $x - l = 0$, ita ut sit $Z = (x - a)(x - b)(x - c) \dots (x - k)(x - l) = 0$ (175. 174. §.).

177. Corollarium 4.

Duae radices *a*, *b* dabunt aequationem *2di* ordinis $(x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab = 0$. Tres radices *a*, *b*, *c* dabunt aequationem *3tii* ordinis $(x - a)(x - b)(x - c) = x^3 - (a + b + c)x^2 + (ab + ac + bc)x - abc = 0$. Et quatuor radices *a*, *b*, *c*, *d* dabunt aequationem *4ti* ordinis $x^4 - (a + b + c + d)x^3 + (ab + ac + ad + bc + bd + cd)x^2 - (abc + abd + acd + bcd)x + abcd = 0$ (176. §.).

178. Corollarium 5.

Et si generatim numero *r* radices *a*, *b*, *c*, --- *u* generent aequationem $Z = x^r + Ax^{r-1} + Bx^{r-2} + \dots + Lx^{r-(2n-2)} + Mx^{r-(2n-1)} + Nx^{r-2n} + \dots + Tx + U = 0$; nascetur ex illa aequatio ordinis *r* + *r* radices *a*, *b*, *c*, --- *u*, *v* habitura, nimirum $Z(x - v) = x^{r+1} + (A - v)x^r + \dots + (M - vL)x^{r-(2n-2)} + (N - vM)x^{r-(2n-1)} + \dots + (U - vT)x - vU = 0$ (176. §.).

179. Corollarium 6.

Lex, qua coefficientes ex radicibus componuntur, constans est in aequationibus *2di*, *3tii*, *4ti* ordinis (177. §.): et si illa assumatur pro coefficientibus aequationis ordinis *r*; subiicietur ei eo ipso etiam aequatio ordinis *r* + *r* (178. §.). Hac ratione per (31. §.) facile evincemus, coefficientem termini secundi cujuslibet aequationis *mti* ordinis aequari summae omnium radicum ejusdem aequationis summae cum signo contrario; terminum vero ultimum aequalem esse producto ex omnibus radicibus sumto cum signo proprio vel contrario, prout exponens *m* ordinis, ad quem aequatio pertinet, est par vel impar; quemvis vero intermedium coefficientem, puta coefficientem *nti* termini aequari summae productorum ex quibuslibet numero *n* — *r* radicibus summae cum signo proprio vel contrario, prout index *n* ejusdem termini est numerus impar vel par.

180. Corollarium 7.

Quamobrem, ut aequatio aliqua $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Kx + L = 0$ termino secundo Ax^{m-1} careat, necessarium est, ut ea nec omnes positivas, neque omnes negativas, sed positivas et negativas radices habeat, summaque radicum positivarum exaequet summam negativarum (179. §.).

181. Theorema.

Si functio $Z = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Px + Q$ pro certo valore α variabilis x positivum, et pro alio valore β negativum valorem obtineat; debet una saltem radix aequationis $Z = 0$ inter α et β jacere.

Demonstratio.

Sit $\alpha > \beta$ (idem ratiocinium est ad $\alpha < \beta$ adplicabile); necesse est, ut inter α et β innumeri valores, singuli minores valore α et majores valore β , locum habeant, atque inter omnes ejusmodi valores duo a, b extent, pro quibus functio Z ex valore positivo transeat in negativum: inter hos porro valores $a < b$ variabilis x intercedet necessario aliqua quantumcunque parva differentia $b - a = \epsilon$; quia secus functio Z pro $x = a = b$ valorem positivum simul et negativum obtineret, quod est impossibile. Quapropter dabitur inter a et b tertius aliquis valor $x = k$ variabilis x , pro quo functio Z nec positivum, neque negativum valorem indueret, qui eam idcirco redderet aequalem nihilo; quo ipso demonstratur, inter α et β unam radicem k aequationis $Z = 0$ jacere (165. §.).

182. Corollarium 1.

Aequatio $Z = 0$ habebit saltem unam radicem realem, si bini reales valores variabilis x extiterint, pro quorum uno functio Z obtineat valorem positivum, et pro altero negativum (181. §.).

183. Corollarium 2.

Si inter duas radices reales a, b datae aequationis $Z = 0$ nulla alia realis radix ejusdem aequationis jaceat; debet functio Z pro quovis valore variabilis x jacente inter radices a, b valorem positivum, vel pro quovis valorem negativum obtinere (181. §.).

184. Corollarium 3.

Inter valores α et β variabilis x , pro quorum uno functio Z (181. §.) induat valorem positivum, et pro altero negativum, aut unica jacebit radix

radix aequationis $Z=0$, aut, si plures radices inter ipsos jacuerint, numerus omnium erit impar (181. 183. §.).

185. Corollarium 4.

Si vero functio Z pro utroque valore reali α, β variabilis x induat valorem positivum, vel pro utroque negativum; aut nulla jacebit radix aequationis $Z=0$ inter valores reales α, β , aut numerus radicum realium inter ipsos jacentium erit par (181. 183. §.).

186. DEFINITIO.

Evidens est, functionem y relata ad variabilem absolutam x , quae, variabili x continuo crescente, aut perpetuo crescat, vel continuo decrescat, nunquam obtenturam valorem aliquem maximum vel minimum, certo valori variabilis x respondentem. Si autem functio y ita sit conformata, ut ea pro certo valore $x=v$ valorem V obtineat, majorem vel minorem singulis valoribus, quos ipsa pro quibuscunque aliis valoribus variabilis x , tam majoribus quam minoribus valore v , indueret; erit V *Maximum* vel *Minimum absolutum* functionis y . Si denique, variabili absoluta x continuo crescente, functio y pro certo valore $x=v$ talem valorem V recipiat, qui sit major vel minor singulis proxime sequentibus et praecedentibus valoribus, quos eadem functio pro aliquantillum majoribus et minoribus valoribus variabilis x obtineret, licet fors V non sit valor major vel minor quovis possibili valore functionis y ; appellabitur V quoddam *Maximum respectivum* casu primo, et *Minimum respectivum* casu secundo, atque de hujusmodi maximis et minimis sermo erit in sequentibus.

187. Corollarium 1.

Si functio y data per variabilem x obtineat valorem V pro $x=v$, valorem vero P pro $x=v+e$, et valorem Q pro $x=v-e$, sitque pro certo quantumcunque decrescante valore quantitatis e tam $V > P$, quam $V > Q$, vel $V < P$ et $V < Q$; erit V aliquod maximum casu primo, et aliquod minimum functionis y casu altero (186. §.).

188. Corollarium 2.

Et vicissim, si valor V , quem functio y pro valore $x=v$ induit, sit aliquod maximum aut minimum ejusdem functionis; debet extare certus valor quantitatis e , pro quo quantumcunque decrescante functio y ,

posito $x = v + e$, tum $x = v - e$, obtinebit valores, quorum uterque erit minor casu primo, et uterque major valore V casu secundo (186. §.).

Scholion 1.

Maxima minimaque functionum positiva a negativis distinguenda sunt. Constat, quantitibus negativis $-A$, —a nonnumquam valores inaequales ab Analystis ita tribui, ut quantitas negativa $-a$ major esse censeatur quantitate negativa $-A$, si positiva a minor sit quantitate positiva A . Qui hac ratione de quantitibus negativis sentiunt, methodum investigandi valores quantitatum variabilium, qui datas illarum functiones reddant maximas vel minimas, ad generales quasdam regulas solent revocare, nec est, cur utrumque casum, maximorum nimirum minimorumque positivorum et negativorum, perpetuo distinguere cogantur. Nos interea cum aliis maxima minimaque positiva et negativa seorsim considerabimus, per valorem inter plures valores negativos maximum vel minimum eum constanter intellegendi, qui inter eosdem valores, si omnes forent positivi, esset maximus vel minimus: sic e. gr. inter numeros negativos $-2, -3, -4, -5, -6, -7$, erit nobis -2 minimus, et -7 maximus numerus negativus.

Scholion 2.

Methodum universalem et compendiarium investigandi maxima et minima quarumvis functionum suppeditat calculus differentialis: priusquam ejus principia exponam, paucis attingam aliam methodum, quam pro simplicioribus casibus iis, qui in calculo differentiali haud sunt versati, offert methodus exhaustionis antiquorum. Supponatur nimirum functio y variabilis x re ipsa esse maxima vel minima pro x ; tum sumatur quantitas e indeterminata, quae ultra omnes terminos possit decrescere, ponaturque $x + e$, deinde $x - e$ loco x in y , quo fiat, ut y casu primo aliquem valorem P , et casu altero aliquem Q obtineat: pro casu maximi erit jam $y > P$ et simul $y > Q$; pro casu minimi vero debet poni $y < P$ et $y < Q$ (188. §.), unde ope congruae reductionis facile determinabuntur binae expressiones $Z > X + a e + b e^2 + c e^3 + \text{etc.}$, et $Z < X + \alpha e + \beta e^2 + \gamma e^3 + \text{etc.}$, quae ob quantitates $Z, X, a, b, c, \dots \alpha, \beta, \gamma, \text{etc.}$ independentes ab e dabunt aequationem $Z = X$ (130. §.) determinantem valorem variabilis x , pro quo functio y sit maxima vel minima.

Exem-

Exempla.

Pro valore x , qui functionem $y = ax - bx^2$ reddat maximam, debet esse

$$ax - bx^2 > a(x+e) - b(x+e)^2;$$

$$ax - bx^2 > a(x-e) - b(x-e)^2;$$

igitur erit

$$a \leq 2bx + be; \quad a \geq 2bx - be.$$

$$a = 2bx \quad (130. \S.), \quad \text{hinc } x = \frac{a}{2b}.$$

Pro valore x , qui functionem $y = \frac{x-n}{x^2+m}$ reddat maximam, debet poni

$$\frac{x-n}{x^2+m} > \frac{x+e-n}{(x+e)^2+m}, \quad \text{et} \quad \frac{x-n}{x^2+m} > \frac{x-e-n}{(x-e)^2+m}.$$

Hinc autem obtinebimus

$$x^2 - 2nx > m + ne - xe, \quad \text{et} \quad x^2 - 2nx < m + xe - ne;$$

$$\text{igitur } x^2 - 2nx = m \quad (130. \S.), \quad x = n \pm \sqrt{(m+n^2)}.$$

Pro valore x , qui functionem $y = \frac{A+Bx^2}{x}$ reddat minimam, oportebit ponere

$$\frac{A+Bx^2}{x} < \frac{A+B(x+e)^2}{x+e}, \quad \text{et} \quad \frac{A+Bx^2}{x} < \frac{A+B(x-e)^2}{x-e}.$$

Quamobrem erit

$$Bx^2 > A - Bxe \quad \text{et} \quad Bx^2 < A + Bxe;$$

$$Bx^2 = A \quad (130. \S.), \quad \text{hinc } x = \pm \sqrt{\frac{A}{B}}.$$

189. Theorema.

Si exponens εy primae rationis differentialis alicujus functionis y datae per variabilem x , hac pro absoluta sumta, ut sit $\varepsilon x = 1$, pro certo valore $x = v$ determinatum aliquem valorem positivum vel negativum obtineat; functio y nec maxima fiet neque minima pro valore $x = v$.

Demonstratio.

Fiat $y = \pm V$ pro $x = v$, et $\varepsilon y = P$, $\varepsilon^2 y = Q$, $\varepsilon^3 y = R$, $\varepsilon^4 y = S$, et sic porro pariter pro $x = v$; debeat functio y pro $x = v + e$ obtinere sequentem valorem A , et pro $x = v - e$ valorem B (157. §.)

$$A = \pm V + \alpha^1 P e + \alpha^2 Q e^2 + \alpha^3 R e^3 + \alpha^4 S e^4 + \text{etc.}$$

$$B = \pm V - \alpha^1 P e + \alpha^2 Q e^2 - \alpha^3 R e^3 + \alpha^4 S e^4 - \text{etc.}$$

Sit jam valor P exponentis εy debitus valori $x = v$ positivus; erit etiam $\alpha^1 P e$ valoris positivi, et $-\alpha^1 P e$ valoris negativi: pro certo valore e erit ergo pars valoris A sequens post $\pm V$ valoris positivi, et pars valoris B sequens post $\pm V$ erit valoris negativi (77. §.); consequenter valor $\pm V$ nec major erit, neque minor utroque valore A, B seorsim sumto, eoque ipso nequit esse $\pm V$ aliquod maximum, vel minimum functionis y (186. §. et 1. Schol. 188. §phi).

Si autem sit P valoris negativi, proinde $\alpha^1 P e$ negativi, et $-\alpha^1 P e$ positivi valoris; erit pars valoris A sequens post $\pm V$ valoris negativi, et pars valoris B sequens post $\pm V$ erit valoris positivi (77. §.): valor $\pm V$ nec ergo est major, neque minor utroque valore A, B seorsim accepto, quorum alterutrum locum haberet, si $\pm V$ esset aliquod maximum, vel minimum functionis y (186. §. et 1. Schol. 188. §phi).

190. Theorema.

Si exponens differentialis εy indicis imparis $2n+1$ pro certo valore v variabilis x determinatum aliquem positivum aut negativum valorem obtineat, singuli autem exponentes differentiales $\varepsilon y, \varepsilon^2 y, \varepsilon^3 y, \dots, \varepsilon^{2n} y$ inferiorum ordinum pro eodem valore $x = v$ aequentur nihilo; functio y nec maxima fiet neque minima pro $x = v$.

Demonstratio.

Si supponamus, pro $x = v$ fieri $y = \pm V, \varepsilon^{2n+1} y = P, \varepsilon^{2n+2} y = Q, \varepsilon^{2n+3} y = R, \varepsilon^{2n+4} y = S$, etc. cum per hypothesein sit $\varepsilon y = 0, \varepsilon^2 y = 0, \varepsilon^3 y = 0, \dots, \varepsilon^{2n} y = 0$ pro $x = v$; debet functio y pro $x = v + e$ obtinere sequentem valorem A , et valorem B pro $x = v - e$ (157. §.).

$$A = \pm V + (\alpha^1 P e + \alpha^2 Q e^2 + \alpha^3 R e^3 + \text{etc.}) \alpha^{2n} \cdot e.$$

$$B = \pm V + (-\alpha^1 P e + \alpha^2 Q e^2 - \alpha^3 R e^3 + \text{etc.}) \alpha^{2n} \cdot e.$$

Hinc autem evidenter sequitur, eodem prorsus ratiocinio, quo in (189 §.) sumus usi, posse ostendi, valorem $\pm V$ functionis y debitum valori

valori v variabilis x in assumpta hypothefi nec maximum esse, neque minimum.

191. Theorema.

Quodsi autem pro certo valore v variabilis x singuli exponentes εy , $\varepsilon^2 y$, $\varepsilon^3 y$, - - - $\varepsilon^{2n-1} y$ fiant aequales nihilo, exponens vero $\varepsilon^{2n} y$ pro $x=v$ determinatum aliquem valorem obtineat; erit valor functionis y debitus valori $x=v$ aliquod maximum positivum, vel minimum negativum, si valor exponentis $\varepsilon^{2n} y$ pro $x=v$ fuerit negativus: si vero hic valor fuerit positivus; erit valor functionis y debitus valori $x=v$ aliquod minimum positivum vel maximum negativum.

Demonstratio.

Pro $x=v$ fiat $y=\pm V$, et $\varepsilon^{2n} y=P$, $\varepsilon^{2n+1} y=Q$, $\varepsilon^{2n+2} y=R$, $\varepsilon^{2n+3} y=S$, et sic porro: cum per hypothefin sit $\varepsilon y=0$, $\varepsilon^2 y=0$, $\varepsilon^3 y=0$, - - - $\varepsilon^{2n-1} y=0$; debeat functio y pro $x=v+e$ habere sequentem valorem A vel C , et valorem B vel D pro $x=v-e$ (157. §.).

$$A=+V+(\alpha Pe + \alpha Qe^2 + \alpha Re^3 + \alpha Se^4 + \text{etc.})e^{2n-1}.$$

$$B=+V+(\alpha Pe - \alpha Qe^2 + \alpha Re^3 - \alpha Se^4 + \text{etc.})e^{2n-1}.$$

$$C=-V+(\alpha Pe + \alpha Qe^2 + \alpha Re^3 + \alpha Se^4 + \text{etc.})e^{2n-1}.$$

$$D=-V+(\alpha Pe - \alpha Qe^2 + \alpha Re^3 - \alpha Se^4 + \text{etc.})e^{2n-1}.$$

Sit jam $P=\varepsilon^{2n} y$ valoris positivi; erit etiam αPe quantitas positiva, proinde debeat esse etiam summa omnium terminorum post $\pm V$ in singulis expressionibus A , B , C , D sequentium valoris positivi (77. §.): igitur dabitur quantitas e , pro qua, utcumque ea decrescat, erit tam $A > V$ quam $B > V$, vel tam $C < -V$, quam $D < -V$, id est, valor functionis y debitus valori $x=v$ erit aliquod minimum positivum V , aut maximum negativum $-V$ (186. §. et 1. Schol. 188. §phi).

Porro sit $P=\varepsilon^{2n} y$ valoris negativi; erit quoque αPe quantitas negativa, eoque ipso erit summa omnium terminorum post $\pm V$ in singulis expressionibus A , B , C , D sequentium valoris negativi (77. §.): hoc igitur casu extabit quantitas e , pro qua, utcumque decrescante, debeat esse tam

$A < V$ quam $B < V$, vel $C > -V$ et $D > -V$, proinde erit valor functionis y debitus valori $x = v$ aut aliquod maximum positivum V , aut minimum negativum $-V$ (186. §. et Schol. 1.)

192. Problema.

Determinare valores variabilis x , pro quibus data functio y fiat maxima vel minima.

Solutio.

Sumta variabili x pro absoluta, positoque $\varepsilon x = 1$, capiatur εy , et, quia exponens εy pro illo valore variabilis x , qui functionem y reddit maximam vel minimam, nullum valorem finitum potest habere (189. §.), ponatur $\varepsilon y = 0$, tum quaerantur radices aequationis $\varepsilon y = 0$: si enim aequatio haec radices reales a, b, c , etc. habeat; erit fors functio y pro quavis radice $x = a, x = b, x = c$, etc. maxima, vel minima, quod sequenti ratione licebit explorare.

Sumtis successive exponentibus differentialibus $\varepsilon y, \varepsilon^2 y, \varepsilon^3 y, \dots$ $\varepsilon^{2r+1} y$, ponatur in quovis $x = a$: si pro radice $x = a$ aequationis $\varepsilon y = 0$ reliqui exponentes successive aequantur nihilo; incertum erit, an functio y pro $x = a$ fiat maxima vel minima: si autem deveniatur ad certum exponentem ε^y indicis imparis $2r+1$, qui pro $x = a$ determinatum quempiam valorem obtineat; constabit eo ipso, functionem y pro $x = a$ nec maximam fieri, neque minimam (190. §.): quodsi vero deventum fuerit ad exponentem ε^y indicis $2r$ paris, qui pro $x = a$ valorem aliquem determinatum induat, positivum aut negativum; dabit functio y pro $x = a$ quoddam minimum positivum vel maximum negativum casu primo, aut aliquod maximum positivum vel minimum negativum casu altero (191. §.).

193. Corollarium 1.

Valorem variabilis x , qui functionem y reddat maximam vel minimam, ex aequatione $\varepsilon y = 0$ quaeri oportere ideo solum asseruimus, quia certo conitat, exponentem εy pro illo valore nulli valori finito posse aequari: verum hinc haud necessario sequitur, debere fieri $\varepsilon y = 0$, cum possit esse $\varepsilon y = \infty = \frac{K}{0}$, denotante K quantitatem aliquam constantem. Quamobrem, si non subsistat aequatio $\varepsilon y = 0$; tentetur aequatio $\frac{1}{\varepsilon y} = 0$,
cujus

cujus radices reales debeant dare valores variabilis x functionem y reddentes maximam vel minimam.

194. Corollarium 2.

Ceterum elucet quoque ex (187. §.), quo modo possit explorari, utrum functio y pro certa radice reali $x = a$ aequationis $\varepsilon y = 0$ vel $\frac{1}{\varepsilon y} = 0$ fiat maxima vel minima.

195. Corollarium 3.

Perspicuum est, hanc methodum investigandi maxima et minima proprie ad illas tantum functiones pertinere, quae uniformes sunt (13. §.), aut pro uniformibus possunt haberi, quales sunt e. gr. radices potestatum imparium, utpote unicum valorem realem exhibentes, et radices potestatum parium, quae, dum reales sunt, binos quidem valores exhibent, unum positivum, et alterum negativum, quorum tamen quivis seorsum potest spectari.

196. DEFINITIO.

Si continua differentiatione functionis $y = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots + Px + Q$ ex aequatione $y = 0$ deriventur aequationes $\varepsilon y = 0$, $\varepsilon^2 y = 0$, $\varepsilon^3 y = 0$, $\varepsilon^4 y = 0$, etc.; vocabitur $y = 0$ aequatio *principalis*; reliquae autem aequationes appellabuntur ejus *aequationes differentiales*, $\varepsilon y = 0$ *prima*, $\varepsilon^2 y = 0$ *secunda*, $\varepsilon^3 y = 0$ *tertia*, et sic porro.

197. Corollarium 1.

Pro aequatione principali $X = 1 + Az + Bz^2 + Cz^3 + \dots + Qz^{r-1} + Rz^r + Sz^{r+1} + Tz^{r+2} + Uz^{r+3} + \dots + fz^{m-2} + gz^{m-1} + hz^m = 0$ erit ejus *ita* aequatio differentialis (196. 127. §.).

$$rX = \begin{pmatrix} r(r-1)(r-2)(r-3) & \dots & 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot R \\ + (r+1)r(r-1)(r-2) & \dots & 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot S z \\ + (r+2)(r+1)r(r-1) & \dots & 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot T z^2 \\ + (r+3)(r+2)(r+1)r & \dots & 5 \cdot 4 \cdot U z^3 \\ + \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} + (m-2)(m-3) & \dots & (m-r-1) f z^{m-(r+2)} \\ + (m-1)(m-2) & \dots & (m-r) g z^{m-(r+1)} \\ + m(m-1)(m-2) & \dots & (m-r+1) h z^{m-r} \end{pmatrix}$$

198. Corollarium 2.

Omnis aequatio differentialis $\varepsilon y = 0$ est aequatio principalis respectu aequationis differentialis $\varepsilon \cdot \varepsilon y = \varepsilon y = 0$ uno gradu superioris (196. §.)

199. Corollarium 3.

Si aequatio $y = 0$ praeter radices $a, b, \dots p$ habeat radices aequales $\alpha, \alpha, \alpha, \dots \alpha$ numero n , quo pro $U = (x - a)(x - b) \dots (x - p)$ fiat $Y = U(x - \alpha)^n = 0$ (176. §.); erit prima ejus aequatio differentialis $\varepsilon y = (x - \alpha)^n \varepsilon U + nU(x - \alpha)^{n-1} = 0$ (4. 81. §.), seu $\varepsilon y = ((x - \alpha)\varepsilon U + nU)(x - \alpha)^{n-1} = 0$, atque haec habebit radices aequales $\alpha, \alpha, \dots \alpha$ numero $n - 1$ (170. §.).

200. Corollarium 4.

Ex aequatione principali $y = 0$ habente radices aequales $\alpha, \alpha, \alpha \dots \alpha$ numero n derivari possunt aequationes differentialis $\varepsilon y = 0$, $\varepsilon^2 y = 0$, $\varepsilon^3 y = 0$, $\dots \varepsilon^{n-1} y = 0$, quarum prima habeat radices aequales α, α, α etc. numero $n - 1$, et quaevis sequens una pauciores quam proxime praecedens, ultima vero $\varepsilon^{n-1} y = 0$ unam tantum radicem α (199. 198. §.).

201. Corollarium 5.

Quoties igitur functio $y = U(x - \alpha)^n$ habuerit factorem $(x - \alpha)^n$, existente n numero integro positivo; toties erunt omnes exponentes differentiales εy , $\varepsilon^2 y$, $\varepsilon^3 y$, $\dots \varepsilon^{n-1} y$ aequales nihilo pro $x = \alpha$, exponentes vero $\varepsilon^n y$ pro $x = \alpha$, cum α nulla sit radix aequationis $\varepsilon^n y = 0$, valorem aliquem determinatum induet (200. 165. §.): functio y pro $x = \alpha$ nec ergo maxima fiet neque minima, si n sit numerus impar; maxima vero ea erit vel minima, si n fuerit numerus par (190. 191. §.).

202. Theorema.

Inter quasvis binas radices reales et inaequales p, q , aequationis $y = 0$ quarum una sit proxime major altera, ita ut inter eas nulla alia radix jaceat, jacebit una radix aequationis differentialis $\varepsilon y = 0$ exhibens unum valorem variabilis x , pro quo functio y dat quoddam maximum, positivum vel negativum.

Demon-

Demonstratio.

Sit $p > q$, poterunt inter p et q innumerari valores variabilis x cogitari, quorum quivis minor est radice p et major radice q , pro singulis vero his valoribus variabilis x obtineret functio y certos valores, vel omnes positivos, vel omnes negativos, cum inter p et q nulla radix aequationis $y=0$ jaceat (183. §.): quare cum fiat $y=0$ tam pro $x=p$ quam pro $x=q$ (165. §.), facile hinc colligitur, certo valori variabilis x jacenti inter p et q respondere quoddam maximum functionis y , positivum vel negativum (186. §. et 1. Schol.); eum vero valorem debet exhibere una radix aequationis $y=0$ (192. §.).

203. Corollarium 1.

Sint a, b duae radicum realium aequationis $y=0$, a omnium maxima, et b proxime minor, quo fiat, ut inter illas nulla alia radix jaceat. Sumto valore $x=v$ majore maxima radice a , pro quo functio $y=x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Px + Q$ induat valorem positivum (78. §. 2. Schol.), cum inter v et a nulla jaceat radix aequationis $y=0$; debet functio y pro quovis valore x jacente inter v et a manere valoris positivi (181. §.); igitur, quia inter quemvis ejusmodi valorem x jacentem inter v et a , et quemvis valorem x jacentem inter a et b unica radix a locum habet; debet functio y pro quovis valore x inter a et b fieri valoris negativi (184. 185. §.). Inter radicem realem maximam a et proxime minorem radicem b aequationis $y=0$ jacet igitur una radix aequationis differentialis $\varepsilon y=0$ exhibens unum valorem x , pro quo functio y dat quoddam maximum negativum (202. §.).

204. Corollarium 2.

Sint $i > k > l$ tres radices reales aequationis $y=0$, quarum secunda sit proxime minor prima, et tertia proxime minor secunda, ita ut nec inter i et k , neque inter k et l alia radix locum habeat; jacebunt inter illas duae radices aequationis differentialis, una inter i et k , altera vero inter k et l , ita quidem, ut alternatim una illarum det maximum positivum, altera vero maximum negativum functionis y , prima illud, et secunda istud, vel vicissim (202. 184. 185. §.).

205. Corollarium 3.

Aequatio $y=x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Px + Q=0$ m -ti ordinis habet m radices; aequatio autem differentialis $\varepsilon y=m x^{m-1}$

$\div (m-1)Ax^{m-2} + \dots + P=0$ debet habere radices una pauciores, nimirum numero $m-1$ (175. §.): quare, cum inter binas quantitates reales non nisi reales quantitates possint jacere, si omnes radices aequationis $y=0$ reales fuerint, erunt etiam omnes radices aequationis $\varepsilon y=0$ reales: si autem aequatio principalis $y=0$ quocunque numero $r < m$ radices reales habeat; habebit aequatio $\varepsilon y=0$ minimum $r-1$ radices reales (202. §.).

206. Corollarium 4.

Pro radicibus realibus $\overset{1}{a}, \overset{2}{a}, \overset{3}{a}, \overset{4}{a}, \dots, \overset{n}{a}, \overset{n+1}{a}, \overset{n+2}{a}, \text{etc.}$ aequationis $y=0$ habeat aequatio $\varepsilon y=0$ radices reales $\overset{1}{\alpha}, \overset{2}{\alpha}, \overset{3}{\alpha}, \overset{4}{\alpha}, \dots, \overset{n}{\alpha}, \overset{n+1}{\alpha}, \text{etc.}$ (205. §.): si hae et illae ita sint dispositae, ut utrobique prima sit omnium maxima, tum reliquae se invicem ordine magnitudinis sequantur; jacebit $\overset{1}{\alpha}$ inter $\overset{1}{a}$ et $\overset{2}{a}$, $\overset{2}{\alpha}$ inter $\overset{2}{a}$ et $\overset{3}{a}$, et generatim $\overset{n}{\alpha}$ inter $\overset{n}{a}$ et $\overset{n+1}{a}$; quaevis porro radix, prima $\overset{1}{\alpha}$, tertia $\overset{3}{\alpha}$, quinta $\overset{5}{\alpha}$, etc. aequationis $\varepsilon y=0$ dabit, sumta loco x , aliquod maximum negativum, radix autem secunda $\overset{2}{\alpha}$, quarta $\overset{4}{\alpha}$, sexta $\overset{6}{\alpha}$, etc. dabit quoddam maximum positivum functionis y (202. 203. 204. §.).

207. Corollarium 5.

Quoties aequatio differentialis $\varepsilon y=0$ habuerit radices imaginarias; toties eas habebit etiam aequatio principalis $y=0$ (205. §.).

208. Corollarium 6.

Ex radicibus tamen realibus aequationis differentialis $\varepsilon y=0$ non licet concludere in radices reales aequationis principalis $y=0$: possibile est, ut illae omnes sint reales, licet hae sint omnes imaginariae. Quodsi tamen radices reales aequationis differentialis $\varepsilon y=0$ ejusmodi fuerint, ut, iis, prout se invicem ordine magnitudinis sequuntur, loco x successive substitutis, functio y maxima positiva et negativa alternatim det, ut in (206. §.); jacebit necessario inter quasvis binas ejusmodi radices una radix aequationis $y=0$ (181. §.); proinde, si aequatio $\varepsilon y=0$ numero n ejusmodi radices reales habuerit, habebit aequatio $y=0$ ad minimum numero $n-1$ radices reales. Interea notandum est, aut omnes radices reales aequales, quas aequatio differentialis $\varepsilon y=0$ potest habere, aut omnes exempta una in forma-

formatione illius iudicii esse relinquendas, prout numerus illarum est par vel impar (201. §.).

209. Corollarium 7.

Ut quantitas positiva inter duas alias quantitates jaceat, oportet utramque hanc quantitatem esse positivam, vel unam positivam et alteram negativam: dum ergo omnes radices datae aequationis $y=0$ reales fuerint, et aequatio differentialis $\varepsilon y=0$ aliquot radices positivas habuerit; debet habere aequatio $y=0$ totidem vel una plures radices positivas (205, 206. §.).

210. Theorema.

Numerus omnium radicum realium, quas data quaecunque aequatio $y=x^m+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+---+Px\pm Q=0$ habuerit, debet esse par vel impar, prout exponens m ordinis, ad quem ea aequatio pertineat, fuerit par vel impar.

Demonstratio.

1. Sumatur quantitas $\pm v$ ita, ut v major sit singulis radicibus realibus aequationis $y=0$, radicibus negativis, si quae adsint, spectatis instar positivarum, sitque $v^m > Av^{m-1} + Bv^{m-2} + --- + Pv \pm Q$ (78. §. 2. Schol.)

2. Inter $+v$ et 0 jacebunt omnes radices positivae, inter $-v$ et 0 vero omnes negativae.

3. Sit jam m exponens par adeoque $(\pm v)^m$ valoris positivi; habebit functio y tam pro $x=+v$, quam pro $x=-v$ valorem positivum ob (1): pro $x=0$ autem fiet $y=\pm Q$. Existente igitur termino ultimo Q positivo; erit tam numerus radicum positivarum inter $+v$ et 0 , quam numerus negativarum inter $-v$ et 0 jacentium (2) seorsim par (185. §.): si autem terminus ultimus Q sit negativus; erit numerus illarum, et harum radicum seorsim impar (184. §.). Numerus omnium radicum, positivarum et negativarum simul, est igitur par utroque casu.

4. Sit m exponens impar, adeoque $(\pm v)^m$ valoris positivi pro $+v$, et negativi pro $-v$: hoc casu dabit ergo $x=+v$ valorem positivum, et $x=-v$ valorem negativum pro y , ob (1); $x=0$ autem dabit $y=\pm Q$. Pro termino ultimo positivo $+Q$ erit igitur numerus radicum positivarum inter $x=+v$ et $x=0$ jacentium (2) par; numerus vero negativarum jacentium inter $x=-v$ et $x=0$ (2) impar (185. 184. §.): et pro termino

ultimo negativo $-Q$ erit numerus radicum positivarum inter $x=+v$ et $x=0$ (2) impar; numerus vero negativarum inter $x=-v$ et $x=0$ (2) par (184. 185. §.). Utroque ergo casu erit numerus omnium radicum, positivarum et negativarum simul, impar.

211. Corollarium 1.

Terminus ultimus Q aequationis $y=x^m + Ax^{m-1} + \dots + Px + Q=0$, cujus omnes radices sint reales, erit positivus vel negativus, prout numerus radicum positivarum fuerit par vel impar. (210. 179. §.).

212. Corollarium 2.

Omnis aequatio $y=0$ m ti ordinis habet radices numero m (175. §.): si inter illas dentur radices reales numero n , erunt reliquae numero $m-n$ imaginariae. Quare, cum numerus $m-n$ semper sit par, si uterque numerus m , n est par, aut uterque impar, perspicuum est, numerum radicum imaginariarum, quas aequatio $y=0$ potest habere, semper esse parem (210. §.).

213. Corollarium 3.

Aequatio $y=0$ ordinis paris m (211. §.) potest habere omnes radices imaginarias: aequatio vero $y=0$ ordinis imparis m debet habere saltem unam radicem realem (212. §.).

214. Problema.

Determinare relationem inter coefficientem cujusvis termini datae aequationis $y=0$ et coefficientes duorum terminorum adjacentium, quorum unus illum proxime praecedat, et alter proxime sequatur, pro casu radicum imaginariarum ejusdem aequationis.

Solutio.

1. Data sit aequatio $y=x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots + Qx^{m-r+1} + Rx^{m-r} + Sx^{m-r-1} + Tx^{m-r-2} + Ux^{m-r-3} + \dots + fx^2 + gx + h=0$, quaeraturque relatio inter quemvis r um coefficientem R et coefficientes Q , S pro casu radicum imaginariarum.

2. Si ponas $x=\frac{1}{z}$ in (1), obtinebimus aequationem $X=1 + Az + Bz^2 + Cz^3 + \dots + Qz^{r-1} + Rz^r + Sz^{r+1} + Tz^{r+2} + Uz^{r+3} + \dots + fz^{m-2} + gz^{m-1} + hz^m=0$.

3. Hinc

3. Hinc (2) invenies per (197. §.) aequationes differentiales $\varepsilon X \equiv 0$, $\varepsilon^r X \equiv 0$, $\varepsilon^{r+1} X \equiv 0$; et si quaevis harum dividatur per primum ejus terminum, tum ponatur $m-r+1 \equiv n$, $m-r \equiv n-1$, $m-r-1 \equiv n-2$, fiet.

$$\varepsilon^{r-1} X = 1 + \alpha z + \beta z^2 + \gamma z^3 + \delta z^4 + \dots + \mu z^n = 0.$$

$$\varepsilon^r X = 1 + a z + b z^2 + c z^3 + \dots + u z^{n-1} = 0.$$

$$\varepsilon^{r+1} X = 1 + \mathfrak{A} z + \mathfrak{B} z^2 + \dots + \mathfrak{C} z^{n-2} = 0.$$

$$\text{Pro } \alpha = \frac{rR}{Q}; \quad \beta = \frac{(r+1)rS}{2Q}; \quad \gamma = \frac{(r+2)(r+1)rT}{3 \cdot 2 Q};$$

$$\delta = \frac{(r+3)(r+2)(r+1)rU}{4 \cdot 3 \cdot 2 Q}; \quad \dots$$

$$\mu = \frac{m(m-1)(m-2) \dots (m-r+2)h}{(r-1)(r-2) \dots 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot Q}.$$

$$a = \frac{(r+1)S}{R}; \quad b = \frac{(r+2)(r+1)T}{2R};$$

$$c = \frac{(r+3)(r+2)(r+1)U}{3 \cdot 2 R}; \quad \dots$$

$$u = \frac{m(m-1)(m-2) \dots (m-r+1)h}{r(r-1)(r-2) \dots 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot R}.$$

$$\mathfrak{A} = \frac{(r+2)T}{S}; \quad \mathfrak{B} = \frac{(r+3)(r+2)U}{2S};$$

$$\dots \mathfrak{C} = \frac{m(m-1) \dots (m-r)h}{(r+1)r(r-1) \dots 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot S}.$$

4. Aequationes hae (3) pro $z = \frac{1}{x}$ abibunt in tres sequentes aequationes.

$$L = x^n + \alpha x^{n-1} + \beta x^{n-2} + \gamma x^{n-3} + \delta x^{n-4} + \dots + \mu = 0.$$

$$M = x^{n-1} + a x^{n-2} + b x^{n-3} + c x^{n-4} + \dots + u = 0.$$

$$N = x^{n-2} + \mathfrak{A} x^{n-3} + \mathfrak{B} x^{n-4} + \dots + \mathfrak{C} = 0.$$

5. Ex his porro aequationibus (4) per (197. §.) facile eliciuntur sequentes aequationes differentiales.

$$\epsilon^{n-2} L = x^2 + \frac{2\alpha}{n}x + \frac{2\beta}{n(n-1)} = 0.$$

$$\epsilon^{n-3} M = x^2 + \frac{2a}{n-1}x + \frac{2b}{(n-1)(n-2)} = 0.$$

$$\epsilon^{n-4} N = x^2 + \frac{2\eta}{n-2}x + \frac{2\vartheta}{(n-2)(n-3)} = 0.$$

6. Iam vero fieri potest, ut aequationes quadraticae (5) habeant radices imaginarias, nimirum si sit per (167. §.),

$$\frac{\alpha^2}{n^2} < \frac{2\beta}{n(n-1)}; \quad \text{I. } R^2 < \frac{(m-r+1)(r+1)}{(m-r)^r}. \quad \text{S Q.}$$

$$\frac{a^2}{(n-1)^2} < \frac{2b}{(n-1)(n-2)}; \quad \text{hinc ob (3) II. } S^2 < \frac{(m-r)(r+2)}{(m-r-1)(r+1)}. \quad \text{R T.}$$

$$\frac{\eta^2}{(n-2)^2} < \frac{2\vartheta}{(n-2)(n-3)}; \quad \text{III. } T^2 < \frac{(m-r-1)(r+3)}{(m-r-2)(r+2)}. \quad \text{S U.}$$

7. Relatio (I) indicabit ergo, utramque radicem aequationis $\epsilon^{n-2} L = 0$ in (5) esse imaginariam; adeoque debebit hoc casu etiam aequatio $L = 0$ in (4) habere saltem unum par radicum imaginaryarum (207. 198. §.): cum igitur quaevis radix $x = \frac{1}{z}$ aequationis $L = 0$ in (4) det unam radicem $z = \frac{1}{x}$ aequationis $\epsilon^{r-1} X = 0$ in (3), haec autem nequeat habere radices imaginarias, quin illas eo ipso etiam aequatio $X = 0$ in (2) per (207. 198. §.) habeat; erunt in eadem hypothesi etiam aliquae radices z aequationis $X = 0$ in (2), proinde etiam aliquae radices x aequationis $y = 0$ in (1) imaginariae.

8. Si dicas, nullum *rtum* coefficientem R aequationis $y = 0$ in (1) talem esse, ut is conditionem (I) in (6) impleat, sed pro quovis ejusmodi coefficiente fore aut

$$R^2 = \frac{(m-r+1)(r+1)}{(m-r)^r}. \quad \text{SQ, aut } R^2 > \frac{(m-r+1)(r+1)}{(m-r)^r}. \quad \text{SQ,}$$

proinde etiam in (6)

$$\frac{\alpha^2}{n^2} = \frac{2\beta}{n(n-1)}, \quad \text{aut } \frac{\alpha^2}{n^2} > \frac{2\beta}{n(n-1)};$$

erunt quidem ambae radices aequationis $\epsilon^{n-2} L = 0$ in (5) reales (167. §.): verum inde nondum sequitur, aequationem $L = 0$ in (4) nullas habere radices

radices imaginarias (208. 198. §.): si vero eo non obstante aequatio $L=0$ in (4) radices imaginarias habeat; habebit illas etiam aequatio $y=0$ in (1), ob rationes in (7) relatas.

9. Sicut (I) dat saltem unum par radicum imaginaryarum aequationis $L=0$ in (4); sic quoque conditio (II), cum ea indicet radices imaginarias aequationis $\varepsilon M=0$ in (5), dabit saltem unum par radicum imaginaryarum aequationis $M=0$ in (4) per (207. 198. §.): eapropter, quia quaevis radix $x = \frac{1}{z}$ aequationis $L=0$ vel $M=0$ in (4) det unam radicem $z = \frac{1}{x}$ aequationis $\varepsilon X=0$ vel $\varepsilon X=0$ in (3); dabit conditio (I) unum saltem par radicum imaginaryarum aequationis $\varepsilon X=0$, et conditio (II) indicabit saltem unum par radicum imaginaryarum aequationis $\varepsilon X=0$ in (3). Debet autem aequatio $\varepsilon X=0$ eo ipso jam habere unum par radicum imaginaryarum, quia id habet aequatio $\varepsilon X = \varepsilon \cdot \varepsilon X = 0$ (207. §.): igitur habebit aequatio $\varepsilon X=0$ ad minimum duas radices imaginarias ob conditionem (I), et duas ob conditionem (II). Verum hinc haud elucet, radices imaginarias aequationis $\varepsilon X=0$ in (3), quas indicat conditio (I), ab illis ejus radicibus imaginariis, quas denotat conditio (II), distinctas esse; aliunde vero certo constat, eas non posse esse distinctas: secus enim posset habere aequatio $\varepsilon X=0$ in (3) pro quocunque ejus exponente n , adeoque etiam pro $n=3$ quatuor radices imaginarias, quod est impossibile. Itaque binae conditiones (I) (II) in (6) tantundem indicant, quantum una illarum indicat, nimirum unum par radicum imaginaryarum aequationis $y=0$ in (1), ob (7).

10. Quodsi autem conditiones (I) (III) in (6) locum habeant, quo casu radices aequationum $\varepsilon L=0$, $\varepsilon N=0$ in (5) debent esse imaginariae; habebunt etiam aequationes $L=0$, $N=0$ in (4) radices imaginarias (207. 198. §.): cum autem quaevis radix $x = \frac{1}{z}$ aequationis $L=0$ vel $N=0$ in (4) det unam radicem $z = \frac{1}{x}$ aequationis $\varepsilon X=0$ vel $\varepsilon X=0$ in (3); habebit quoque aequatio $\varepsilon X=0$ saltem unum par radicem

radicum imaginariarum ob conditionem (I), et aequatio $\varepsilon^{\frac{r+1}{2}} X = 0$ pariter unum par ob conditionem (III). Cum porro aequatio $\varepsilon^{\frac{r+1}{2}} X = 0$ sit *2da* aequatio differentialis $\varepsilon^{\frac{2}{2}} \cdot \varepsilon^{\frac{r-1}{2}} X = 0$ aequationis $\varepsilon^{\frac{r-1}{2}} X = 0$ (196. §.); debet aequatio $\varepsilon^{\frac{r-1}{2}} X = 0$ ea ipso solum unum par radicum imaginariarum habere, quia id habet aequatio $\varepsilon^{\frac{r+1}{2}} X = 0$ (207. 198. §.): aequatio igitur $\varepsilon^{\frac{r-1}{2}} X = 0$ habet unum par radicum imaginariarum ob conditionem (I), et aliud par ob conditionem (III), atque istud par ab illo distinctum est. Nam ante omnia evidens est, ut conditio (III) locum habeat, debere esse $n > 3$; adeoque aequatio $\varepsilon^{\frac{r-1}{2}} X = 0$ in (3) debet esse minimum 4ti gradus: hinc autem elucet, ipsam capacem esse quatuor radicum imaginariarum. Deinde certum est, coefficientes cujuslibet aequationis ab ejus radicibus certa lege dependere (179. §.), coefficientesque α, β ob (3) per diversos coefficientes aequationis principalis $y = 0$ determinari: igitur debent etiam radices imaginariae aequationis $\varepsilon^{\frac{r-1}{2}} X = 0$ in (3), quarum indicium est conditio (I), diversae esse ab ejus radicibus imaginariis, quas conditio (III) in (6) indicat. Ut primum vero aequatio $\varepsilon^{\frac{r-1}{2}} X = 0$ in (3) ob conditiones (I) (III) duo habet paria radicum imaginariarum; habet etiam aequatio $X = 0$ in (2), proinde etiam $y = 0$ in (1), saltem duo paria radicum imaginariarum (207. 198. §.).

215. Corollarium.

His principiis nititur regula Neutoniana ad explorandas radices imaginarias datae cujuscunque aequationis inventa. Singulis nimirum terminis datae aequationis, exceptis termino primo et ultimo, superscribantur fractiones, prout eos sequens exemplum exhibet: exploretur deinde, an quadratum cujusvis coefficientis minus sit fractione superscripta ducta in productum coefficientium adjacentium, vel non: casu primo subscribatur eidem termino signum —, et casu altero signum +, terminis vero primo et ultimo semper subscribatur signum +. Numerus enim alternationum signorum subscriptorum indicabit, aequationem datam ad minimum totidem radices imaginarias habere.

$$x^m + A \frac{2m}{1(m-1)} x^{m-1} + B \frac{3(m-1)}{2(m-2)} x^{m-2} + C \frac{4(m-2)}{3(m-3)} x^{m-3} + D \frac{5(m-3)}{4(m-4)} x^{m-4} + \dots = 0.$$

216. Theo-

216. Theorema.

In quavis aequatione 2di gradus, cujus ambae radices reales sunt, tot semper adsunt signorum + — vel — + alternationes, quot radices positivae, et tot successiones ++ vel — —, quot radices negativae.

Demonstratio.

Sequentes quatuor formulae exhibent omnes casus possibiles.

I. $x^2 + Ax + B = 0.$

II. $x^2 - Ax - B = 0.$

III. $x^2 - Ax + B = 0.$

IV. $x^2 + Ax - B = 0.$

Iam vero in (II) et (IV) necessario debet esse una radix positiva et altera negativa (179. §.), sicut una adest alternatio et una successio signorum. In (III) debet esse utraque radix positiva (179. §.), sicut duae adsunt signorum alternationes. In (I) demum sunt ambae radices negativae (179. §.), sicut binae signorum successiones.

217. Theorema.

Quoties omnes radices datae aequationis $y = 0$ fuerint reales, ejusque rta aequatio differentialis $\epsilon y = 0$ tot signorum alternationes quot radices positivae habuerit; toties debet quoque proxime inferior aequatio differentialis $\epsilon^{r-1} y = 0$ totidem signorum alternationes habere, quot ea habet radices positivae

Demonstratio.

1. Aequatio differentialis $(r-1)$ esima fit $\epsilon^{r-1} y = x^r + ax^{r-1} + bx^{r-2} + cx^{r-3} + dx^{r-4} + \dots + px + q = 0.$

2. Erit rta aequatio differentialis $\epsilon y = nx^{n-1} + (n-1)ax^{n-2} + (n-2)bx^{n-3} + (n-3)cx^{n-4} + \dots + p = 0.$

3. Omnes signorum alternationes et successiones, quas aequatio (2) complectitur, debent quoque in aequatione (1) contineri.

4. Aequatio (2) habeat alternationes signorum, proinde etiam radices positivas numero m, qui par sit, aut impar.

5. Si m in (4) est numerus par; terminus p in (2) debet esse positivus, adeoque + p (211. §.): prout igitur adest + q vel — q in (1), habet aequatio (1) aut totidem, aut una plures signorum alternationes, quam aequatio (2), nimirum numero m, aut m + 1, ob (3).

6. Habet vero aequatio (1) ad minimum totidem radices reales positivas, quot aequatio (2) ob (198. 209. §.); consequenter habet (1) ad minimum numero m radices positivas ob (4): cum igitur m sit numerus par; debet (1) habere $m+1$ vel m radices positivas, prout $-q$ vel $+q$ adest in (1) per (211. §.). Aequatio (1) tot igitur habet positivas radices, quot signorum alternationes (5).

7. Si vero numerus m in (4) alternationum signorum, et radicum positivarum aequationis (2) impar est; necesse est, ut ejus terminus ultimus sit $-p$ (211. §.): prout est ergo $+q$ vel $-q$ in (1), habet aequatio (1) alternationes signorum numero $m+1$ vel m , ob (3).

8. Deinde habet aequatio (1) ad minimum m radices positivas, sicut aequatio (2) ob (5) per (198. 209. §.): quare, cum m sit impar numerus, debet aequatio (1) habere radices positivas numero $m+1$ vel m , prout ea $+q$ vel $-q$ habet pro termino ultimo (211. §.); adeoque tot debet ea habere radices positivas, quot signorum alternationes, ob (7).

218. Corollarium 1.

Si aequatio $y=0$ ordinis m ti omnes radices reales habeat; habebit etiam quaevis aequationum differentialium $\epsilon y=0$, $\epsilon^2 y=0$, $\epsilon^3 y=0$, - - -
 $\epsilon^{m-1} y=0$ omnes radices reales (205. 198. §.), cumque ultima aequatio $\epsilon^{m-1} y=0$ debeat esse quadratica, habebit ea tot signorum alternationes, quot radices positivas (216. §.): igitur habebit etiam quaevis praecedentium aequationum, proinde ipsa quoque aequatio principalis $y=0$ tot alternationes signorum, quot radices positivas (217. §.).

219. Corollarium 2.

Aequatio ordinis m ti habet radices numero m , et terminos numero $m+1$, quorum quivis bini contigui dant unam signorum alternationem vel unam successionem, quocirca debet esse m numerus omnium alternationum et successioneum simul; quare, si aequatio m ti ordinis numero n radices positivas totidemque alternationes signorum habeat; habebit ea $m-n$ radices negativas, et totidem signorum successiones, si quidem omnes radices sint reales (218. §.).

Scholion.

Cum quaelibet radix μ aequationis $y=0$ debeat dare unum factorem simplicem $x-\mu$ functionis y (174. §.); quidquid hactenus de radicibus generatim demonstratum est, ad illustrandam etiam naturam factorum simplicium, in quos functiones integrae et rationales sunt resolubiles (173. §.), pertinet. Est autem resolutio functionum in factores simplices maximi momenti in calculo integrali; quocirca optandum foret, ut extaret aliqua methodus eam omni casu perficiendi: interea certum est, admissa resolutione omnis aequationis determinatae $y=0$, quae inventionem omnium illius radicum, reales sint, aut imaginariae, perficitur; eo ipso concedi etiam resolutionem cujuslibet functionis integrae et rationalis y in suos factores simplices (176. §.). Artificia autem, quae ad detegendas radices datarum aequationum hactenus excogitare licuit, admodum imperfecta sunt; qui ea noscere cupiant, scripta adeant, quorum praecipua in introductione commemoravi.

220. Theorema.

Si functio fracta $\frac{P}{Q}$ data per variabilem z ejus sit indolis, ut illa pro determinato quopiam valore $z=a$, evanescente numeratore P et denominatore Q , abeat in $\frac{0}{0}$, necesse est, ut ipsa pro $z=a$ eundem valorem habeat, quem quotus $\frac{\varepsilon P}{\varepsilon Q}$ pro $z=a$ obtineret.

Demonstratio.

1. Si pro $z=a$ exponentes differentiales εP , $\varepsilon^2 P$, ---- εQ , $\varepsilon^2 Q$, etc. obtineant valores εP^1 , $\varepsilon^2 P^1$, - - - - εQ^1 , $\varepsilon^2 Q^1$, etc.; obtinebit functio $\frac{P}{Q}$ pro $z=a+\omega$ per (157. §.) sequentem valorem.

$$\frac{\varepsilon^1 P^1 + \varepsilon^2 \omega \varepsilon^2 P^1 + - - - + \varepsilon^r \omega^{r-1} \varepsilon^r P^1}{\varepsilon^1 Q^1 + \varepsilon^2 \omega \varepsilon^2 Q^1 + - - - + \varepsilon^r \omega^{r-1} \varepsilon^r Q^1}$$

2. In eadem hypothefi debebit functio $\frac{P}{Q}$ pro $z=a-\omega$ sequentem valorem habere (157. §.).

$$\frac{-\varepsilon^1 P^1 + \varepsilon^2 \omega \varepsilon^2 P^1 - - - + \varepsilon^r \omega^{r-1} \varepsilon^r P^1}{-\varepsilon^1 Q^1 + \varepsilon^2 \omega \varepsilon^2 Q^1 - - - + \varepsilon^r \omega^{r-1} \varepsilon^r Q^1}$$

3. Iam vero vel functio $\frac{P}{Q}$ crescit, vel decrescit, crescente variabili z : casu primo erit ejus valor debitus valori $z=a$ minor valore (1), et major valore (2); casu autem altero erit is major valore (1), et minor valore (2) pro certa quantumcunque parva quantitate ω : quodsi igitur V denotet valorem functionis $\frac{P}{Q}$ debitum valori $z=a$; dabuntur certi coefficientes $K, L, M, \dots k, l, m, \text{etc.}$, pro quibus ob (1) (2) erit utroque casu

$$V > \frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} + k\omega + l\omega^2 + m\omega^3 + \text{etc.}; \text{ et } V < \frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} + K\omega + L\omega^2 + M\omega^3 + \text{etc.}$$

$$\text{Eapropter erit necessario } V = \frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} \text{ (130. §.)}$$

221. Corollarium 1.

Si pro $z=a$ etiam quivis rto inferior exponens differentialis tam functionis P , quam functionis Q fiat aequalis nihilo; debebunt in (n. 1. 2.) omnes termini praecedentes terminos, in quibus continentur exponentes differentiales $\varepsilon P^r, \varepsilon Q^r$ negligi; valores idcirco functionis $\frac{P}{Q}$ debiti valoribus $a+\omega, a-\omega$ variabilis z , exprimentur sequenti modo:

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} + \alpha \omega^r \cdot \frac{\varepsilon P^{r+1}}{\varepsilon Q^{r+1}} + \alpha^2 \omega^{2r} \cdot \frac{\varepsilon P^{r+2}}{\varepsilon Q^{r+2}} + \text{etc.}}{\frac{\varepsilon Q^r}{\varepsilon Q^r} + \alpha \omega^r \cdot \frac{\varepsilon Q^{r+1}}{\varepsilon Q^{r+1}} + \alpha^2 \omega^{2r} \cdot \frac{\varepsilon Q^{r+2}}{\varepsilon Q^{r+2}} + \text{etc.}}; \\ & \frac{+ \alpha \omega^{r-1} \cdot \frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} \mp \alpha \omega^r \cdot \frac{\varepsilon Q^r}{\varepsilon Q^r} + \alpha^2 \omega^{r+1} \cdot \frac{\varepsilon P^{r+1}}{\varepsilon Q^{r+1}} \mp \alpha^2 \omega^{r+1} \cdot \frac{\varepsilon Q^{r+1}}{\varepsilon Q^{r+1}} + \text{etc.}}{+ \alpha \omega^{r-1} \cdot \frac{\varepsilon Q^r}{\varepsilon Q^r} \mp \alpha \omega^r \cdot \frac{\varepsilon Q^r}{\varepsilon Q^r} + \alpha^2 \omega^{r+1} \cdot \frac{\varepsilon Q^{r+1}}{\varepsilon Q^{r+1}} \mp \alpha^2 \omega^{r+1} \cdot \frac{\varepsilon Q^{r+1}}{\varepsilon Q^{r+1}} + \text{etc.}} \end{aligned}$$

Hinc vero, denotante V valorem functionis $\frac{P}{Q}$ debitum valori $z=a$, sequitur ut in (n. 3.), pro certis coefficientibus $k, l, m, \dots K, L, M, \text{etc.}$ independentibus ab ω , et quapiam quantumcunque decresciente quantitate ω debere fieri

$$V \geq \frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} + k\omega + l\omega^2 + \text{etc.}; \text{ et } V < \frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} + K\omega + L\omega^2 + \text{etc.}:$$

$$\text{igitur } V = \frac{\varepsilon P^r}{\varepsilon Q^r} \text{ (130. §.)}$$

222. Corollarium 2.

Quamobrem, si petatur valor V , quem functio fracta $y = \frac{P}{Q}$ pro illo determinato valore a variabilis z debet habere, pro quo ea abit in $\frac{0}{0}$, fumantur quotientes $\frac{\varepsilon P}{\varepsilon Q}$, $\frac{\varepsilon^2 P}{\varepsilon^2 Q}$, $\frac{\varepsilon^3 P}{\varepsilon^3 Q}$, etc. posito $\varepsilon z = 1$, inchoandoque a primo fiat $z = a$: quoties enim aliquis horum quotorum pro $z = a$ in $\frac{0}{0}$ abiverit, nihil certi poterit inde colligi, sed quaeri debet valor proxime sequentis quoti pro $z = a$: si autem ad quotum deveniatur, qui pro $z = a$ aut fiat aequalis nihilo, evanescente solo numeratore, vel obtineat valorem indefinitum, evanescente solo denominatore, aut valorem quempiam determinatum induat; debet etiam data functio y pro $z = a$ casu primo aequari nihilo, casu autem secundo et tertio eundem indefinitum, vel determinatum valorem habere (220. 221. §.).

223. Corollarium 3.

Dum datur functio $y = PR$ variabilis z , quae pro certo valore $z = a$, evadente $P = 0$ et $R = \frac{1}{0} = \infty$, abit in $0 \cdot \infty$, poni potest $Q = \frac{1}{R}$, hinc $y = \frac{P}{Q}$, quo casu, pro $z = a$, abibit y in $\frac{0}{0}$: invento itaque valore functionis $y = \frac{P}{Q}$ pro $z = a$ per (222. §.), habebitur valor functionis $y = PR$ debitus valori $z = a$.

224. Corollarium 4.

Et si aliqua functio $\frac{q}{p}$ variabilis z pro certo valore $z = a$, pro quo abeant q, p in $\frac{1}{0} = \infty$, abeat in $\frac{\infty}{\infty}$; poterit sumi $P = \frac{1}{p}$, et $Q = \frac{1}{q}$, hinc $\frac{q}{p} = \frac{Q}{P}$, quae functio pro $z = a$ in $\frac{0}{0}$ debet abire: determinato igitur valore functionis $\frac{P}{Q}$ pro $z = a$ per (222. §.), obtinebitur eo ipso etiam valor functionis $\frac{q}{p}$ pro $z = a$.

225. Problema.

Fractionem rationalem genuinam $\frac{M}{N}$ (10. 11. §.) datis factoribus simplicibus denominatoris N , qui omnes sint inaequales, resolvere in totidem fractiones partiales, quarum summa exaequet datam fractionem $\frac{M}{N}$.

Solutio.

Pro quolibet factore simplici formae generalis $p - qx$ denominatoris N determinetur una fractio partialis $\frac{A}{p - qx}$, ita ut ejus numerator A eum valorem habeat, quem quotus $\frac{qM}{N}$ pro $x = \frac{p}{q}$, sumto exponente differentiali $dx = 1$, obtineret.

Demonstratio.

Cum $p - qx$ sit unus factor functionis N , dabitur alia functio integra et rationalis X , pro qua fiat $N = X(p - qx)$: poterit igitur functio $\frac{M}{N}$ pro quapiam functione integra et rationali Z resolvi in duas fractiones, ita ut sit

$$\frac{M}{N} = \frac{A}{p - qx} + \frac{Z}{X} = \frac{AX + Z(p - qx)}{N}.$$

Adeoque habebimus $M = AX + Z(p - qx)$, et $Z = \frac{M - AX}{p - qx}$: $p - qx$ debet ergo esse unus factor simplex functionis $M - AX$ (169. §.), et ideo $M - AX = 0$ pro $p - qx = 0$, seu $A = \frac{M}{X} = \frac{M(p - qx)}{N}$ pro $x = \frac{p}{q}$.

Verum pro $x = \frac{p}{q}$ fit $M(p - qx) = 0$, et $N = X(p - qx) = 0$: numerator A aequatur igitur ei determinato valori, quem quotus $\frac{M(p - qx)}{N}$ pro valore $x = \frac{p}{q}$, pro quo is abit in $\frac{0}{0}$, obtinet; hinc debet esse (220. §.)

$A =$

$$A = \frac{\varepsilon \cdot M(p - qx)}{\varepsilon N} = \frac{(p - qx)\varepsilon M}{\varepsilon N} = \frac{qM}{\varepsilon N} \text{ pro } x = \frac{p}{q},$$

$$\text{feu } A = \frac{-qM}{\varepsilon N} \text{ pro } x = \frac{p}{q}, \text{ ob } \frac{(p - qx)\varepsilon M}{\varepsilon N} = 0 \text{ pro } x = \frac{p}{q}.$$

226. Corollarium 1.

Si functio integra et rationalis $a + bx^n$ dicatur habere unum factorem simplicem $e - fx$, cum sit $\varepsilon(a + bx^n) = nbx^{n-1}$, adeoque

$$\frac{-fx^m}{\varepsilon(a + bx^n)} = \frac{-fx^m}{nbx^{n-1}} = \frac{-f^{n-m}}{nb\varepsilon^{n-m-1}} \text{ pro } x = \frac{e}{f};$$

obtinebimus per (225. §.) sequentem expressionem pro una fractionum partialium, in quas functio fracta rationalis $\frac{x^m}{a + bx^n}$, datis omnibus factoribus simplicibus denominatoris, potest resolvi, nimirum pro fractione partiali oriunda ex factore simplici $e - fx$ denominatoris $a + bx^n$

$$\frac{-f^{n-m}}{nb(e - fx)\varepsilon^{n-m-1}}.$$

227. Corollarium 2.

Si factores denominatoris N sint quidem omnes inaequales, sed vel omnes quadratici formae generalis $\alpha + \beta x + \gamma x^2$, vel aliqui quadratici et alii simplices; reperietur fractio partialis oriunda ex quovis factore quadratico, si hic resolvatur in duos factores simplices, fractionesque partiales his factoribus competentes per (225. §.) determinatae in unam summam addantur.

228. Corollarium 3.

Sic si $d^2 - c^2 x^2 = (d + cx)(d - cx)$ dicatur esse unus factor quadraticus functionis $a + bx^n$, functioque fracta rationalis $\frac{x^m}{a + bx^n}$ in fractiones partiales resolvi debeat; fractio partialis oriunda ex illo factore quadratico erit per (225. 227. §.),

$$\frac{\mp c^{n-m}}{nb(d + cx)d^{n-m-1}} = \frac{c^{n-m}}{nb(d - cx)d^{n-m-1}} =$$

$$= \frac{c^{n-m}}{nb d^{n-m-1}} \cdot \frac{\mp d - d + cx - cx}{d^2 - c^2 x^2};$$

consequenter, prout est $n - m$ par aut impar numerus, erit ea fractio

$$\frac{c^{n-m}}{nb d^{n-m-2}} \cdot \frac{-2}{d^2 - c^2 x^2}, \text{ vel } \frac{c^{n-m+1}}{nb d^{n-m-1}} \cdot \frac{-2x}{d^2 - c^2 x^2}.$$

229. Theo-

229. Theorema.

Pro $x = \text{Cof } \varphi \pm \text{Sin } \varphi \sqrt{-1}$ et quovis numero integro positivo n debet esse $x^n = \text{Cof } n\varphi \pm \text{Sin } n\varphi \sqrt{-1}$.

Demonstratio.

Est enim $x^2 = \text{Cof } \varphi^2 \pm 2 \text{Cof } \varphi \text{Sin } \varphi \sqrt{-1} - \text{Sin } \varphi^2$: igitur per (5. §. 1. Schol.) $x^2 = \text{Cof } 2\varphi \pm \text{Sin } 2\varphi \sqrt{-1}$. Et si pro quocunque numero integro r esset $x^r = \text{Cof } r\varphi \pm \text{Sin } r\varphi \sqrt{-1}$, deberet eo ipso esse etiam $x^{r+1} = \text{Cof } r\varphi \text{Cof } \varphi \pm \text{Cof } \varphi \text{Sin } r\varphi \sqrt{-1} \pm \text{Sin } \varphi \text{Cof } r\varphi \sqrt{-1} - \text{Sin } \varphi \text{Sin } r\varphi = \text{Cof } (r+1)\varphi \pm \text{Sin } (r+1)\varphi \sqrt{-1}$ per (5. §. 1. Schol.). Hinc itaque ob (31. §.) necessario sequitur, quod erat demonstrandum.

230. Corollarium 1.

Si $p(\text{Cof } \varphi + \text{Sin } \varphi \sqrt{-1}) - qx$ et $p(\text{Cof } \varphi - \text{Sin } \varphi \sqrt{-1}) - qx$ sint duo factores simplices imaginarii functionis rationalis $c + ex^n$; debeat haec functio bis aequari nihilo, pro $x = \frac{p}{q}(\text{Cof } \varphi + \text{Sin } \varphi \sqrt{-1})$ et $x = \frac{p}{q}(\text{Cof } \varphi - \text{Sin } \varphi \sqrt{-1})$: erit igitur per (229. §.)

$$c + \frac{ep^n}{q^n}(\text{Cof } n\varphi + \text{Sin } n\varphi \sqrt{-1}) = 0;$$

$$c + \frac{ep^n}{q^n}(\text{Cof } n\varphi - \text{Sin } n\varphi \sqrt{-1}) = 0.$$

$$\text{Hinc } 2c + \frac{2ep^n}{q^n} \text{Cof } n\varphi = 0; \text{ et } \frac{2ep^n}{q^n} \text{Sin } n\varphi \sqrt{-1} = 0;$$

$$\text{seu } c + \frac{ep^n}{q^n} \text{Cof } n\varphi = 0; \text{ et } \text{Sin } n\varphi = 0.$$

231. Corollarium 2.

Quidquid sit functio rationalis et integra $a + bx^n$, necesse est, ut pro quolibet ejus factore quadratico $p^2 - 2pqx \text{Cof } \varphi + q^2 x^2$ ob (172. 230. §.) fiat

$$\text{Cof } n\varphi = \frac{-a q^n}{b p^n}; \text{ et } \text{Sin } n\varphi = 0.$$

232. Problema.

Datam functionem integram rationalem $a + x^n$ resolvere in suos factores.

Solutio.

Solutio.

1. Exponens n est numerus par vel impar. Pro numero pari $n = 2m$ habebit functio $a^n + x^n$ omnes numero $n = 2m$ factores simplices imaginarios; adeoque, quia quivis bini factores simplices inter se multiplicati dant unum factorem quadraticum; habebit illa hoc casu factores quadraticos numero $m = \frac{1}{2}n$.

2. Si autem exponens $n = 2m + 1$ est impar numerus; habet functio $a^n + x^n$ unum factorem simplicem realem, et $n - 1$ factores simplices imaginarios, ex quibus numero $m = \frac{n-1}{2}$ factores quadratici possunt produci.

3. Quilibet factorum quadraticorum functionis $a^n + x^n$ (1) (2) exprimi potest formula generali $p^2 - 2pqx \operatorname{Cof} \phi + q^2x^2$ (172. §.); et pro quolibet debeat arcus ϕ ita determinari, ut sit per (230. §.) $a^n + \frac{p^n}{q^n} \operatorname{Cof} n\phi = 0$, et $\operatorname{Sin} n\phi = 0$.

4. Iam vero erit $\operatorname{Sin} n\phi = 0$, si, denotante k quemcunque terminum progressionis 0, 1, 2, 3, 4, etc., fiat $n\phi = 2k\pi$, vel $n\phi = (2k+1)\pi$ per (5. §. 1. Schol.): praecedens formula (3) semper ergo dabit unum factorem quadraticum functionis $a^n + x^n$, si fiat

$$\phi = \frac{2k\pi}{n}, \text{ et } a^n + \frac{p^n}{q^n} \operatorname{Cof} 2k\pi = 0;$$

$$\text{vel } \phi = \frac{2(k+1)\pi}{n}, \text{ et } a^n + \frac{p^n}{q^n} \operatorname{Cof} 2(k+1)\pi = 0.$$

5. Prima aequatio in (4) nequit subsistere: cum enim sit $\operatorname{Cof} 2k\pi = 1$; esset $a^n + \frac{p^n}{q^n} = 0$, hinc $\frac{p}{q} = \sqrt[n]{-a^n}$ valoris vel imaginarii, vel realis negativi, prout est n numerus par vel impar, cum tamen $\frac{p}{q}$ in (3) debeat habere valorem realem positivum.

6. Hinc, ob $\operatorname{Cof}(2k+1)\pi = -1$ (5. §. 1. Schol.), sequitur, formulam in (3) pro quolibet valore $k = 0, k = 1, k = 2, k = 3, k = 4$, et sic porro, daturam unum factorem quadraticum functionis $a^n + x^n$, si fiat $\phi = \frac{(2k+1)\pi}{n}$, et $a^n - \frac{p^n}{q^n} = 0$ ob (4) (5), adeoque $p = a$ pro $q = 1$:

his ergo valoribus in (3) substitutis, obtinebitur sequens generalis expressio omnium factorum quadraticorum functionis $a^n + x^n$.

$$a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{(2k+1)\pi}{n} + x^2.$$

7. Quamobrem, si in (6) loco k successive substituantur numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ita porro quamdiu est $2k+1 \leq n$, obtinebuntur omnes factores quadratici functionis $a^n + x^n$, ad quos praeterea eo casu, quo n fuerit numerus impar, factor simplex $a+x$ debet accedere (1, (2).

Exempla.

$$a^3 + x^3 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{\pi}{3} + x^2)(a+x).$$

$$a^4 + x^4 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{\pi}{4} + x^2)(a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{3\pi}{4} + x^2).$$

$$a^5 + x^5 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{\pi}{5} + x^2)(a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{3\pi}{5} + x^2)(a+x).$$

$$a^6 + x^6 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{\pi}{6} + x^2)(a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{3\pi}{6} + x^2)(a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{5\pi}{6} + x^2).$$

Scholion.

Sed, quaeret tyro, cur illi duntaxat numeri impares loco $2k+1$ in (7), qui numero n minores sunt, substitui praecipiuntur? dabit utique formula generalis in (6) etiam pro quovis alio majori numero impari $2k+1$ unum factorem quadraticum functionis $a^n + x^n$, ob (4). Verum id quoque certum est, factores quadraticos, qui pro numeris imparibus $2k+1 > n$ ex (6) possunt elici, ab iis, qui pro numeris $2k+1 \leq n$ indidem eliciuntur, haud esse distinctos. Sit enim generatim $2k+1 = 2rn \pm \alpha$ numerus major numero n , ita ut r quemlibet terminum seriei 1, 2, 3, 4, etc. possit denotare, α vero denotet numerum imparem minorem numero n ; dico ex (6) pro $2k+1 = 2rn \pm \alpha$ eundem sequi factorem, qui pro $2k+1 = \alpha$ obtineretur. Est enim $\operatorname{Cof} \frac{(2rn \pm \alpha)\pi}{n} = \operatorname{Cof}(2r\pi \pm \frac{\alpha\pi}{n}) = \operatorname{Cof} 2r\pi \mp \operatorname{Sin} 2r\pi \operatorname{Sin} \frac{\alpha\pi}{n} = \operatorname{Cof} \frac{\alpha\pi}{n}$ (5. §. 1. Schol.)

233. Problema.

Functionem integram rationalem $a^n - x^n$ resolvere in suos factores.

Solutio.

Solutio.

1. Pro exponente pari n habebit functio $a^n - x^n$ duos factores simplices reales, et $n-2$ factores simplices imaginarios, et ex his omnibus nascentur numero $\frac{n-2}{2}$ factores quadratici.

2. Et pro numero impari n habebit functio $a^n - x^n$ unum factorem simplicem realem, cum $n-1$ factoribus simplicibus imaginariis, qui simul dabunt numero $\frac{n-1}{2}$ factores quadraticos.

3. Quilibet factor quadraticus functionis $a^n - x^n$ (1) (2) obtinebitur ex $p^2 - 2pqx \operatorname{Cof} \varphi + q^2 x^2$ (172. §.), si pro quocunque termino progressionis arithmeticae 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. loco k assumpto fiat per (230. §) et (5. §. 1. Schol.).

$$\varphi = \frac{2k\pi}{n}, \quad a^n - \frac{p^n}{q^n} = 0; \quad \text{et} \quad \operatorname{Sin} 2k\pi = 0;$$

$$\text{vel } \varphi = \frac{(2k+1)\pi}{n}; \quad a^n + \frac{p^n}{q^n} = 0; \quad \text{et} \quad \operatorname{Sin}(2k+1)\pi = 0.$$

4. Cum vero secunda conditio in (3) absurda sit, ut in (232. §. n. 5.); certum est, formulam generalem factoris quadratici in (3) daturam quemvis factorem quadraticum functionis $a^n - x^n$, si in illa ponatur $\varphi = \frac{2k\pi}{n}$, et $a^n - \frac{p^n}{q^n} = 0$, hinc $a=p$ pro $q=1$, denotante k quemcunque terminum seriei arithmeticae 1, 2, 3, 4, etc.: his igitur valoribus in (3) substitutis obtinebimus sequentem expressionem generalem omnium factorum quadraticorum functionis $a^n - x^n$

$$a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{2k\pi}{n} + x^2.$$

5. Quare, si in hac formula (4) successive ponas $k=1, k=2, k=3, k=4$, et sic porro quamdiu est $2k < n$; derivabis inde omnes factores quadraticos functionis $a^n - x^n$, ad quos praeterea accedet factor simplex $a-x$, vel quadraticus $a^2 - x^2 = (a-x)(a+x)$, prout fuerit n numerus impar, vel par (2) (1).

Exempla.

$$a^3 - x^3 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{2\pi}{3} + x^2)(a-x).$$

$$a^4 - x^4 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{2\pi}{4} + x^2)(a^2 - x^2) = (a^2 + x^2)(a^2 - x^2).$$

$$a^5 - x^5 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{2\pi}{5} + x^2)(a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{4\pi}{5} + x^2)(a - x).$$

$$a^6 - x^6 = (a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{2\pi}{6} + x^2)(a^2 - 2ax \operatorname{Cof} \frac{4\pi}{6} + x^2)(a^2 - x^2).$$

Scholion.

Ratio autem, cur loco $2k$ illi tantum numeri pares, qui numero n minores sunt, in (4) substitui praecipuntur, est eadem, quam jam pro casu simili in (232. §. Schol.) adduximus. Omnis enim numerus par major numero n per $2rn \pm 2\alpha$ potest designari, ita ut, denotante 2α quemcunque numerum parem minorem numero n , coëfficiens r quemlibet terminum seriei 1, 2, 3, 4, etc. possit indicare: facile vero ostenditur, formulam in (4) eosdem pro $2k = 2rn \pm 2\alpha$, et $2k = 2\alpha$ factores dare.

$$\text{Nam est } \operatorname{Cof} \frac{(2rn \pm 2\alpha)\pi}{n} = \operatorname{Cof} (2r\pi \pm \frac{2\alpha\pi}{n}) = \operatorname{Cof} 2r\pi \operatorname{Cof} \frac{2\alpha\pi}{n} \\ \mp \operatorname{Sin} 2r\pi \operatorname{Sin} \frac{2\alpha\pi}{n} = \operatorname{Cof} \frac{2\alpha\pi}{n} \quad (5. \S. 1. \text{Schol.})$$

234. Problema.

Unus factor quadraticus functionis integrae et rationalis $a + bx^n$ est $p^2 - 2pqx \operatorname{Cof} \phi + q^2x^2$; determinare fractionem partialem ex ipso oriundam, data functione fracta rationali $\frac{x^m}{a + bx^n}$ in fractiones partiales resolvenda.

Solutio.

1. Factores simplices dati factoris quadratici sunt $qx - p(\operatorname{Cof} \phi + \operatorname{Sin} \phi \sqrt{-1})$, $qx - p(\operatorname{Cof} \phi - \operatorname{Sin} \phi \sqrt{-1})$ per (172 §.): quodsi ergo numeratores fractionum partialium his factoribus simplicibus debitarum vocentur A, B ; erit per (227. §.) fractio partialis oriunda ex dato factore quadratico

$$\frac{A}{qx - p(\operatorname{Cof} \phi + \operatorname{Sin} \phi \sqrt{-1})} + \frac{B}{qx - p(\operatorname{Cof} \phi - \operatorname{Sin} \phi \sqrt{-1})} = \\ = \frac{q(A + B)x + (A - B)p \operatorname{Sin} \phi \sqrt{-1} - (A + B)p \operatorname{Cof} \phi}{p^2 - 2pqx \operatorname{Cof} \phi + q^2x^2}.$$

2. Iam sit $M = x^m$, $N = a + bx^n$, hinc $\epsilon N = nbx^{n-1} \epsilon x$, et per (229. §.)

$$x^m = \frac{p^m}{q^m} (\operatorname{Cof} m\phi \pm \operatorname{Sin} m\phi \sqrt{-1});$$

$$x^{n-1} = \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} (\operatorname{Cof} (n-1)\phi \pm \operatorname{Sin} (n-1)\phi \sqrt{-1});$$

$$\text{pro } x = \frac{p}{q} (\operatorname{Cof} \phi \pm \operatorname{Sin} \phi \sqrt{-1});$$

Per

Per haec determinantur valores numeratorum A, B fractionum partialium in (1) secundum (225. §.), nimirum:

$$A = \frac{q^{n-m}}{nb p^{n-m-1}} \cdot \frac{\text{Cof } m \phi + \text{Sin } m \phi \sqrt{-1}}{\text{Cof } (n-1) \phi + \text{Sin } (n-1) \phi \sqrt{-1}};$$

$$B = \frac{q^{n-m}}{nb p^{n-m-1}} \cdot \frac{\text{Cof } m \phi - \text{Sin } m \phi \sqrt{-1}}{\text{Cof } (n-1) \phi - \text{Sin } (n-1) \phi \sqrt{-1}}.$$

Est autem per (5. §. 1. Schol. et 231. §.).

$$\text{Cof } (n-1) \phi = \text{Cof } n \phi \text{Cof } \phi + \text{Sin } n \phi \text{Sin } \phi = -\frac{aq^n}{bp^n} \text{Cof } \phi;$$

$$\text{Sin } (n-1) \phi = \text{Sin } n \phi \text{Cof } \phi - \text{Cof } n \phi \text{Sin } \phi = \frac{aq^n}{bp^n} \text{Sin } \phi;$$

adeoque est etiam

$$A = \frac{p^{m+1}}{na q^m} \cdot \frac{\text{Cof } m \phi + \text{Sin } m \phi \sqrt{-1}}{\text{Sin } \phi \sqrt{-1} - \text{Cof } \phi};$$

$$B = \frac{p^{m+1}}{na q^m} \cdot \frac{\text{Sin } m \phi \sqrt{-1} - \text{Cof } m \phi}{\text{Sin } \phi \sqrt{-1} + \text{Cof } \phi}.$$

Quare addendo, et subtrahendo erit

$$\text{ob } (\text{Sin } \phi \sqrt{-1} - \text{Cof } \phi)(\text{Sin } \phi \sqrt{-1} + \text{Cof } \phi) = -(\text{Sin } \phi^2 + \text{Cof } \phi^2) = -1.$$

$$A + B = -\frac{2 p^{m+1}}{na q^m} \text{Cof } (m+1) \phi;$$

$$A - B = -\frac{2 p^{m+1}}{na q^m} \text{Sin } (m+1) \phi \sqrt{-1}.$$

Et pro his valoribus in (1) substitutis obtinebitur sequens simplicissima expressio quaesitae fractionis partialis.

$$\frac{2 p^{m+1}}{na q^m} \cdot \frac{p \text{Cof } m \phi - qx \text{Cof } (m+1) \phi}{p^2 - 2 p q x \text{Cof } \phi + q^2 x^2}.$$

Scholion.

Notatu digna est methodus quasvis functiones fractas rationales, datis factoribus simplicibus et quadraticis denominatorum, resolvendi in fractiones partiales ope coefficientium indeterminatorum.

1. Si proponatur fractio $\frac{M}{N}$ resolvenda in fractiones partiales, datis factoribus simplicibus formae $p - qx$, et quadraticis formae $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ denominatoris N; sumatur pro quolibet factore simplici una fractio partialis $\frac{A}{p - qx}$, et pro quolibet factore quadratico accipiat una fractio formae $\frac{A + Bx}{\alpha + \beta x + \gamma x^2}$, literis A, B indeterminatas interea quantitates denotantibus.

Tum reducantur omnes hae fractiones partiales ad communem denominatorem aequalem producto N ex illarum denominatoribus; erit summa omnium numeratorum divisa per N aequalis datae functioni $\frac{M}{N}$. Quodsi igitur summa omnium numeratorum aequetur dato numeratori M ; obtinebitur aequatio, ex qua valores pro A , B , etc. secundum principia primi capitis poterunt determinari.

2. Eadem prorsus methodo resolvetur quaelibet fractio $\frac{M}{X^n}$ in fractiones partiales, dum denominator fractionis resolvendae aequatur alicui potentiae $ntae$ aut factoris simplicis $X = p - qx$, aut quadratici $X = \alpha + \beta x + \gamma x^2$: nimirum, sumtis interea quantitatibus indeterminatis A , B , C , D , E , F , G , etc., ponatur

$$\frac{M}{X^n} = \frac{A}{X^n} + \frac{B}{X^{n-1}} + \frac{C}{X^{n-2}} + \dots + \frac{K}{X^2} + \frac{L}{X},$$

$$\text{vel } \frac{M}{X^n} = \frac{A+Bx}{X^n} + \frac{C+Dx}{X^{n-1}} + \dots + \frac{U+Vx}{X},$$

prout X exhibet factorem simplicem, vel quadraticum, tum quaerantur valores pro A , B , C , etc., ut in (1).

3. Si denique denominator N fractionis resolvendae $\frac{M}{N}$ inaequales aliquos, et alios aequales factores simplices vel quadraticos, aut illos et hos habeat; habebitur casus ex praecedentibus casibus (1) (2) compositus, ad quem idcirco eadem methodus poterit applicari.

4. Licebit demum hanc methodum ad quosvis factores polynomios extendere: si nimirum denominator N fractionis resolvendae $\frac{M}{N}$ habeat factores polynomios formae generalis $a + bx + cx^2 + \dots + mx^r$; semper poterit determinari una fractio partialis debita tali factori polynomio, modo ejus numeratori tribuatur forma $\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \dots + \mu x^{r-1}$ functionis ordinis uno gradu inferioris.

E L E M E N T A

C A L C U L I I N T E G R A L I S .



CAPUT IV.

DE

PRAECEPTIS FUNDAMENTALIBUS CALCULI
INTEGRALIS, INTEGRATIONEQUE
FUNCTIONUM RATIONALIUM.

235. DEFINITIO.

Integrale dati exponentis differentialis est functio, cujus ratio differentialis habet exponentem dato aequalem; unde, quid sit datum exponentem differentialem *integrare*, per se intelligitur: praecepta in hunc finem docet *Calculus integralis*. Signum autem integrationis erit $\int$, praefigendum exponenti differentiali, cujus integrale fuerit desideratum: sic $\int X \varepsilon x$ indicabit integrale exponentis differentialis $X \varepsilon x$.

236. Corollarium 1.

Integrale dati exponentis differentialis $\varepsilon y = X \varepsilon x$ potest esse functio $y = Z + C$ composita ex aliqua functione Z variabilis x , et quantitate constante C , quarum posterior nullo pacto immediate ex ipso exponente differentiali potest colligi (91. §.).

237. Corollarium 2.

Quamobrem praecepta calculi integralis eo tendunt, ut per ea ex datis exponentibus differentialibus εy partes variables illorum integralium y utpote cum iis certa lege connexae (83. §.) possint derivari: plerumque tamen, inventa parte variabili, puta Z , alicujus integralis $\int \varepsilon y = y$, scribemus $y = Z + C$, litera C quantitatem constantem designaturi, quae fors addi debebit parti variabili Z , ut perfectum completumque integrale habeatur.

238. Corollarium 3.

Facile vero, inventa parte variabili Z , pars constans C certi integralis $y = Z + C$ in actuali calculi differentio-integralis adplicatione determinatur: plerumque enim ex natura quanti, pro quo expressio analytica $y = Z + C$

quaeritur, elucet, quemnam determinatum valorem V functio y pro certo valore v variabilis x debet induere, quo fit, ut, si pro $x=v$ pars variabilis Z valorem determinatum U obtineat, fit $U+C=V$, hinc quantitas constans $C=V-U$, et integrale ipsum $y=Z+V-U$.

239. Corollarium 4.

Methodus universalis explorandi, utrum pars variabilis Z alicujus integralis $\int X \varepsilon x = Z + C$ rite sit determinata, consistit in differentiatione inventi integralis $Z + C$: si enim exponens differentialis $\varepsilon(Z + C) = \varepsilon Z$ aequetur dato $X \varepsilon x$; certi erimus, integrale $\int X \varepsilon x = Z + C$ esse legitimum, ita ut nullum aliud exponenti differentiali $X \varepsilon x$ possit respondere, cujus pars variabilis, non tantum forma, sed etiam magnitudine a parte variabili Z differat (235. 96. §.).

240. Corollarium 5.

Hinc et ex (115. -- 123. §.) colligemus sequentia integralia, quae instar totidem formularum fundamentalium calculi integralis possunt spectari.

$$\begin{array}{ll}
 1. \int \varepsilon \varphi \operatorname{Cof} \varphi = \operatorname{Sin} \varphi + C. & 2. \int -\varepsilon \varphi \operatorname{Sin} \varphi = \operatorname{Cofin} \varphi + C. \\
 3. \int \varepsilon \varphi \operatorname{Sin} \varphi = \operatorname{Sin} v \varphi + C. & 4. \int -\varepsilon \varphi \operatorname{Cof} \varphi = \operatorname{Cof} v \varphi + C. \\
 5. \int \varepsilon \varphi \operatorname{Sec} \varphi^2 = \operatorname{Tang} \varphi + C. & 6. \int -\varepsilon \varphi \operatorname{Cofec} \varphi^2 = \operatorname{Cot} \varphi + C. \\
 7. \int \varepsilon \varphi \operatorname{Sec} \varphi \operatorname{Tang} \varphi = \operatorname{Sec} \varphi + C. & 8. \int -\varepsilon \varphi \operatorname{Cofec} \varphi \operatorname{Cot} \varphi = \operatorname{Cofec} \varphi + C. \\
 9. \int \frac{\varepsilon Z}{\sqrt{(1-Z^2)}} = \operatorname{Arc} \operatorname{Sin} z + C. & 10. \int \frac{-\varepsilon Z}{\sqrt{(1-Z^2)}} = \operatorname{Arc} \operatorname{Cof} z + C. \\
 11. \int \frac{\varepsilon Z}{\sqrt{(2Z-Z^2)}} = \operatorname{Arc} \operatorname{Sin} v z + C. & 12. \int \frac{-\varepsilon Z}{\sqrt{(2Z-Z^2)}} = \operatorname{Arc} \operatorname{Cof} v z + C. \\
 13. \int \frac{\varepsilon Z}{1+Z^2} = \operatorname{Arc} \operatorname{Tang} z + C. & 14. \int \frac{-\varepsilon Z}{1+Z^2} = \operatorname{Arc} \operatorname{Cot} z + C. \\
 15. \int \frac{\varepsilon Z}{Z\sqrt{(Z^2-1)}} = \operatorname{Arc} \operatorname{Sec} z + C. & 16. \int \frac{-\varepsilon Z}{Z\sqrt{(Z^2-1)}} = \operatorname{Arc} \operatorname{Cofec} z + C.
 \end{array}$$

241. Corollarium 6.

Sic quoque ex (239. 90. §.) sequitur, integrale cujusvis exponentis differentialis $A \varepsilon Z$, determinati per productum ex exponente differentiali εZ certae functionis Z in quantitatem constantem A , aequari producto ex integrali hujus exponentis in eandem quantitatem constantem, seu esse $\int A \varepsilon Z = A \int \varepsilon Z$.

242. Corollarium 7.

Ob (239. 92. §.) autem erit integrale exponentis differentialis $\varepsilon y = \varepsilon P + \varepsilon Q + \varepsilon R + \dots + \varepsilon Z$ compositi ex pluribus exponentibus differentialibus aequale summae integralium singulorum exponentium illum componentium, nimirum $y = f(\varepsilon P + \varepsilon Q + \varepsilon R + \dots + \varepsilon Z) = f\varepsilon P + f\varepsilon Q + f\varepsilon R + \dots + f\varepsilon Z$.

243. Corollarium 8.

Si in aliquod integrale $fX\varepsilon x$ quantitas quaevis constans, per additionem aut subtractionem, ingressa fuerit, poterit ea negligi, atque ad constantem indeterminatam C referri (237. §.); consequenter in specie loco $fX\varepsilon x = U + \log \frac{m}{n} Z + C$, cum sit $l \frac{m}{n} Z = lZ + l \frac{m}{n}$, poterit sumi $fX\varepsilon x = U + lZ + C$, quamdiu partis duntaxat variabilis ratio habetur.

244. Corollarium 9.

Dum integralia per arcus circuli determinantur, loco arcuum negativorum substitui possunt arcus positivi, modo illorum sinus, cosinus, sinus versi, cosinus versi, etc. cum signis contrariis sumantur, vel in cosinus, sinus, cosinus versos, sinus versos, etc. convertantur (239. 240. §.).

245. Problema.

Integrare exponentem differentialem $\varepsilon y = \frac{\varepsilon Z}{z}$ fractionem, cujus numerator aequatur exponenti differentiali denominatoris z , quidquid sit iste, aliqua variabilis absoluta, aut quaecunque functio certae variabilis absolutae (4. §.).

Solutio.

Sumatur pro integrali logarithmus naturalis denominatoris, seu fiat $y = \int \frac{\varepsilon Z}{z} = l z + C$ (239. 110. §.).

246. Corollarium.

Si $y = \frac{AZ^n}{n} + C$ dicatur esse integrale alicujus exponentis differentialis εy , quod pro $n=0$ abit in $\frac{AZ^0}{0} + C$; erit $A \log Z + C$ genuinus valor ejus integralis debitus valori $n=0$: cum enim debeat esse $\varepsilon y = \varepsilon \left(\frac{AZ^n}{n} + C \right) = AZ^{n-1} \varepsilon Z$ (239. §.); debet utique datum integrale pro $n=0$ poni $= fAZ^{0-1} \varepsilon Z = \int \frac{AZ^0}{Z} = A l Z$ (245. 241. §.).

247. Problema.

Integrare exponentes differentiales formula generali $Az^m \varepsilon z$ comprehensos, quidquid sit z , variabilis absoluta, aut aliqua functio certae variabilis absolutae.

Solutio.

Potentia variabilis z uno gradu altior divisa per suum exponentem $m+1$ ductaque in datum factorem constantem A dabit integrale quaesitum, seu erit (239. 104. §.)

$$\int Az^m \varepsilon z = \frac{Az^{m+1}}{m+1} + C.$$

248. Corollarium 1.

Per (247. §.) integrabitur quivis exponens differentialis formae $X \varepsilon x (a+Y)^p$, si functio $X \varepsilon x$ extra vinculum aequetur exponenti differentiali functionis $a+Y$ sub vinculo: posito enim $z=a+Y$, erit $\varepsilon z = \varepsilon(a+Y) = X \varepsilon x$; hinc $\int X \varepsilon x (a+Y)^p = \int \varepsilon z z^p = \frac{z^{p+1}}{p+1} = \frac{(a+Y)^{p+1}}{p+1} + C.$

249. Corollarium 2.

Si detur exponens differentialis formae $\varepsilon y = Az^a \varepsilon z + Bz^b \varepsilon z + Cz^c \varepsilon z + \text{etc.} = (Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}) \varepsilon z$; erit illius integrale, nulla quantitatis constantis ratione habita, $y = \frac{Az^{a+1}}{a+1} + \frac{Bz^{b+1}}{b+1} + \frac{Cz^{c+1}}{c+1} + \text{etc.}$ (247. 242. §.).

250. Corollarium 3.

Hinc elucet, quemlibet exponentem differentialem $\varepsilon y = P^p Q^q R^r - - - X^u \varepsilon z$ esse perfecte integrabilem, si $P, Q, R, - - - X$ quascunque functiones variabilis z formae generalis $Kz^k + Lz^l + Mz^m + \text{etc.}$, et $p, q, r, - - - u$ numeros integros positivos denotent: semper enim poterit exponens εy explicari per seriem formae $Az^a + Bz^b + Cz^c + \text{etc.}$ ductam in εz constantemque terminis numero finitis, utprimum numerus terminorum cujuslibet functionis $P, Q, R, - - - X$ seorsim finitus est.

251. Corollarium 4.

Quamobrem nulla poterit assignari functio integra et rationalis $X \varepsilon z$ variabilis z , cujus integrale perfectum per principia praecedentia determinari nequeat.

253. Problema.

Integrare exponentes differentiales fractos, formulis $\frac{A \varepsilon x}{p+qx}$, $\frac{A \varepsilon x}{g \pm ex^2}$ comprehensos.

Solutio.

Pro $z = p + qx$ fiet $\frac{A \varepsilon x}{p+qx} = \frac{A}{q} \cdot \frac{\varepsilon z}{z}$, unde per (241. 245. §.) obtinetur sequens integrale (I). Porro est $\frac{A \varepsilon x}{g - ex^2} = \frac{A \varepsilon x}{2g + 2x\sqrt{ge}} + \frac{A \varepsilon x}{2g - 2x\sqrt{ge}}$, unde, integrando ope inventae formulae (I), per (242. §.) invenietur sequens integrale (II). Denique pro $z = \frac{x\sqrt{e}}{\sqrt{g}}$ fiet $\frac{A \varepsilon x}{g + ex^2} = \frac{A}{\sqrt{ge}} \cdot \frac{\varepsilon z}{1+z^2}$; et hinc per (241. 240. §.), reperitur sequens integrale (III).

$$\text{I. } \int \frac{A \varepsilon x}{p+qx} = \frac{A}{q} \log(p+qx) + C.$$

$$\text{II. } \int \frac{A \varepsilon x}{g - ex^2} = \frac{A}{2\sqrt{ge}} \log \left(\frac{\sqrt{g} + x\sqrt{e}}{\sqrt{g} - x\sqrt{e}} \right) + C.$$

$$\text{III. } \int \frac{A \varepsilon x}{g + ex^2} = \frac{A}{\sqrt{ge}} \text{Arc Tang} \frac{x\sqrt{e}}{\sqrt{g}} + C.$$

253. Problema.

Integrare exponentes differentiales formula generali $\frac{\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2}$ comprehensos.

Solutio.

Pro $z = x \pm \frac{b}{2c}$, hinc $\varepsilon z = \varepsilon x$ transformabitur datus exponens in $\frac{\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2} = \frac{\varepsilon z}{\frac{4ac-b^2}{4c} \pm z^2}$: igitur integrando per (252. §.) obtinebimus sequentia integralia.

$$\int \frac{\varepsilon x}{a+bx+cx^2} = \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \text{Arc Tang} \frac{2cx+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C.$$

$$\int \frac{\varepsilon x}{a+bx-cx^2} = \frac{1}{\sqrt{4ac+b^2}} \log \left(\frac{\sqrt{4ac+b^2} + 2cx-b}{\sqrt{4ac+b^2} - 2cx-b} \right) + C.$$

In applicacione vero harum formularum ad casus speciales quantitates imaginarias, quas prima formula, existente $b^2 > 4ac$, dederit, vitabimus, si in dato exponente differentiali signa mutemus in contraria, cum dein ope secundae formulae integremus. Sic ope primae formulae reperietur

$$\int \frac{\varepsilon x}{1-3x+x^2} = \frac{2}{\sqrt{-5}} \text{Arc Tang} \frac{2x-3}{\sqrt{-5}} + C: \text{secunda autem formula dabit } \int \frac{-\varepsilon x}{-1+3x-x^2} = C - \frac{1}{\sqrt{5}} \log \left(\frac{\sqrt{5}+2x-3}{\sqrt{5}-2x+3} \right).$$

254. Corollarium 1.

Cum sit $\varepsilon(a+bx \pm cx^2) = b\varepsilon x \pm 2cx\varepsilon x$; erit $\frac{x\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2} = \pm \frac{1}{2c} \cdot \frac{\varepsilon(a+bx \pm cx^2)}{a+bx \pm cx^2} + \frac{b}{2c} \cdot \frac{\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2}$: integrando itaque per (242. 241. 245. 253. §.) inveniemus sequentes formulas.

$$\int \frac{x\varepsilon x}{a+bx+cx^2} = C + \frac{1}{2c} \log(a+bx+cx^2) - \frac{b}{c\sqrt{(4ac-b^2)}} \text{Arc Tang} \frac{2cx+b}{\sqrt{(4ac-b^2)}}.$$

$$\int \frac{x\varepsilon x}{a+bx-cx^2} = C - \frac{1}{2c} \log(a+bx-cx^2) + \frac{b}{2c\sqrt{(4ac+b^2)}} \log \left(\frac{\sqrt{(4ac+b^2)}+2cx-b}{\sqrt{(4ac+b^2)}-2cx+b} \right).$$

255. Corollarium 2.

Porro est $\frac{(A+Bx)\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2} = \frac{A\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2} + \frac{Bx\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2}$: per (242. 241. 253. 254. §.) obtinebimus ergo sequentia integralia.

$$\int \frac{(A+Bx)\varepsilon x}{a+bx+cx^2} = C + \frac{B}{2c} \log(a+bx+cx^2) + \frac{2Ac-Bb}{c\sqrt{(4ac-b^2)}} \text{Arc Tang} \frac{2cx+b}{\sqrt{(4ac-b^2)}}.$$

$$\int \frac{(A+Bx)\varepsilon x}{a+bx-cx^2} = C - \frac{B}{2c} \log(a+bx-cx^2) + \frac{2Ac+Bb}{2c\sqrt{(4ac+b^2)}} \log \left(\frac{\sqrt{(4ac+b^2)}+2cx-b}{\sqrt{(4ac+b^2)}-2cx+b} \right).$$

256. Corollarium 3.

Formula $\frac{A\varepsilon x}{x(a+bx \pm cx^2)} = \frac{A}{a} \cdot \frac{\varepsilon x}{x} - \frac{A}{a} \cdot \frac{(b \pm cx)\varepsilon x}{a+bx \pm cx^2}$ dabit per (242.

241. 245. 255. §.) sequentia integralia.

$$\int \frac{A\varepsilon x}{x(a+bx+cx^2)} = C + \frac{A}{a} \log \left(\frac{x}{\sqrt{(a+bx+cx^2)}} \right) - \frac{Ab}{a\sqrt{(4ac-b^2)}} \text{Arc Tang} \frac{2cx+b}{\sqrt{(4ac-b^2)}}.$$

$$\int \frac{A\varepsilon x}{x(a+bx-cx^2)} = C + \frac{A}{a} \log \left(\frac{x}{\sqrt{(a+bx-cx^2)}} \right) - \frac{Ab}{2a\sqrt{(4ac+b^2)}} \log \left(\frac{\sqrt{(4ac+b^2)}+2cx-b}{\sqrt{(4ac+b^2)}-2cx+b} \right).$$

Scho.

Scholion.

Quantitates imaginariae in adplicatione harum formularum (254. 255. 256. §.) ad casus particulares eodem prorsus modo, quo in (253. §.), poterunt vitari.

257. Problema.

Dato integrali $\int u \varepsilon x$ invenire integrale $\int u v \varepsilon x$ pro quibuscunque functionibus v, u variabilis x .

Solutio.

Multiplicetur datum integrale $\int u \varepsilon x$ per alteram functionem v , et seorsim per ejus exponentem differentialem εv ; quaeratur deinde integrale exponentis differentialis $\varepsilon v \int u \varepsilon x$: si enim istud subtrahatur a producto $v \int u \varepsilon x$; erit residuum aequale quaesito integrali $\int u v \varepsilon x$.

Demonstratio.

Sit $\int u \varepsilon x = z$; erit $v \int u \varepsilon x = v z$, et $\varepsilon v \int u \varepsilon x = z \varepsilon v$. Est autem $\varepsilon. v z = v \varepsilon z + z \varepsilon v$: igitur $v z = \int v \varepsilon z + \int z \varepsilon v$, nimirum $v \int u \varepsilon x = \int u v \varepsilon x + \int \varepsilon v \int u \varepsilon x$; adeoque $\int u v \varepsilon x = v \int u \varepsilon x - \int \varepsilon v \int u \varepsilon x$.

258. Corollarium 1.

Pro trinomio $X = \alpha + \beta x^r + \gamma x^q$ et quibuscunque exponentibus r, q, m, p , posito $v = X^{p+1}$, et $u = x^{m-1}$, fiet (257. §.) $\int x^{m-1} \varepsilon x X^{p+1} = X^{p+1} \int x^{m-1} \varepsilon x - \int \varepsilon. X^{p+1} \int x^{m-1} \varepsilon x = \frac{X^{p+1} \cdot x^m}{m} - \frac{(p+1)}{m} \int x^p x^m \varepsilon x$: quare, cum sit $X = \alpha + \beta x^r + \gamma x^q$, et $\varepsilon X = r \beta x^{r-1} \varepsilon x + q \gamma x^{q-1} \varepsilon x$, facta substitutione obtinebimus sequentem memorabilem formulam.

$$\int x^{m-1} \varepsilon x X^{p+1} = \frac{x^m X^{p+1}}{m} - \frac{r \beta (p+1)}{m} \int x^{m+r-1} \varepsilon x X^p - \frac{q \gamma (p+1)}{m} \int x^{m+q-1} \varepsilon x X^p.$$

259. Corollarium 2.

Ex hac aequatione pro $\int x^{m-1} \varepsilon x X^{p+1} = \int x^{m-1} \varepsilon x X^p (\alpha + \beta x^r + \gamma x^q)$ $= \alpha \int x^{m-1} \varepsilon x X^p + \beta \int x^{m+r-1} \varepsilon x X^p + \gamma \int x^{m+q-1} \varepsilon x X^p$ elicietur sequens formula.

$$\int x^{m+q-1} \varepsilon x X^p = \frac{x^m X^{p+1}}{\gamma (qp+q+m)} - \frac{m \alpha}{\gamma (qp+q+m)} \int x^{m-1} \varepsilon x X^p - \frac{\beta (rp+r+m)}{\gamma (qp+q+m)} \int x^{m+r-1} \varepsilon x X^p.$$

260. Corollarium 3.

Quodsi autem integrale (259. §.) substituatur in (258. §.), derivabitur inde sequens formula.

$$\int x^{m-r} \varepsilon x X^{p+r} = \frac{x^m X^{p+r}}{qp+q+m} + \frac{\beta(q-r)(p+1)}{qp+q+m} \int x^{m+r-1} \varepsilon x X^p \\ + \frac{q\alpha(p+1)}{qp+q+m} \int x^{m-r} \varepsilon x X^p.$$

261. Corollarium 4.

Hinc (259. 260. §.), posito $q=2$, $r=1$, hinc $X=\alpha+\beta x+\gamma x^2$, quod trinomium deinceps constanter litera X designabimus, fluunt sequentes formulae (I) (III): ex (I) porro nascitur (II), et ex (III) prodit (IV).

$$\begin{aligned} \text{I. } \int x^{m+1} \varepsilon x X^p &= \frac{x^m X^{p+1}}{\gamma(2p+2+m)} - \frac{m\alpha}{\gamma(2p+2+m)} \int x^{m-1} \varepsilon x X^p - \frac{\beta(p+1+m)}{\gamma(2p+2+m)} \int x^m \varepsilon x X^p. \\ \text{II. } \int x^{m-1} \varepsilon x X^p &= \frac{x^m X^{p+1}}{m\alpha} - \frac{\beta(p+1+m)}{m\alpha} \int x^m \varepsilon x X^p - \frac{\gamma(2p+2+m)}{m\alpha} \int x^{m+1} \varepsilon x X^p. \\ \text{III. } \int x^{m-1} \varepsilon x X^{p+1} &= \frac{x^m X^{p+1}}{2p+2+m} + \frac{\beta(p+1)}{2p+2+m} \int x^m \varepsilon x X^p + \frac{2\alpha(p+1)}{2p+2+m} \int x^{m-1} \varepsilon x X^p. \\ \text{IV. } \int x^m \varepsilon x X^p &= -\frac{x^m X^{p+1}}{\beta(p+1)} - \frac{2\alpha}{\beta} \int x^{m-1} \varepsilon x X^p + \frac{2(p+1)+m}{\beta(p+1)} \int x^{m+1} \varepsilon x X^{p+1}. \end{aligned}$$

262. Corollarium 5.

Si in (261. §. I. Form.) ponas $m=0$, et $p=-q$, obtinebis sequens integrale (I): quodsi autem in (261. §. III. Form.) ponas $p=-q$, et $m=1$, determinabis $\int \frac{\varepsilon x}{X^q}$ per $\int \frac{\varepsilon x}{X^{q-1}}$ et $\int \frac{x \varepsilon x}{X^q}$, unde, substituto jam invento valore pro $\int \frac{x \varepsilon x}{X^q}$, prodibit sequens formula (II)

$$\begin{aligned} \text{I. } \int \frac{x \varepsilon x}{X^q} &= \frac{-1}{2\gamma(q-1)X^{q-1}} - \frac{\beta}{2\gamma} \int \frac{\varepsilon x}{X^q}. \\ \text{II. } \int \frac{\varepsilon x}{X^q} &= \frac{\beta+2\gamma x}{(q-1)(4\alpha\gamma-\beta^2)X^{q-1}} + \frac{12\gamma(2q-3)}{(q-1)(4\alpha\gamma-\beta^2)} \int \frac{\varepsilon x}{X^{q-1}}. \end{aligned}$$

263. Problema.

Invento integrali $\int \frac{\varepsilon x}{X}$, per (253. §.), determinare integralia $\int \frac{\varepsilon x}{X^n}$; $\int \frac{x \varepsilon x}{X^n}$; $\int \frac{(A+Bx) \varepsilon x}{X^n}$ pro quocunque dato numero integro et positivo n .

Solutio.

Solutio.

In (262. §. II.) ponatur successive $q=2$, $q=3$, $q=4$, . . . $q=n$; determinabitur eo ipso integrale $\int \frac{\varepsilon x}{X^n}$, ut sequitur in (I); per istud autem dabitur integrale $\int \frac{x \varepsilon x}{X^n}$ ob (262. §. I.): per utrumque demum determinari poterit etiam $\int \frac{(A+Bx)\varepsilon x}{X^n} = A \int \frac{\varepsilon x}{X^n} + B \int \frac{x \varepsilon x}{X^n}$, ut sequitur in (II), nimirum pro valore integralis posterioris in (262. §.) invento.

$$\begin{aligned} \text{I. } \int \frac{\varepsilon x}{X^n} &= \frac{\beta + 2\gamma x}{(n-1)(4x\gamma - \beta^2)X^{n-1}} + \frac{(2n-3)2\gamma(\beta + 2\gamma x)}{(n-1)(n-2)(4x\gamma - \beta^2)X^{n-2}} \\ &+ \frac{(2n-3)(2n-5)2\gamma^2(\beta + 2\gamma x)}{(n-1)(n-2)(n-3)4x\gamma - \beta^2)^2 X^{n-3}} + \dots \\ &+ \dots + \dots + \dots \\ &+ \frac{(2n-3)(2n-5) \dots 5 \cdot 3 (2\gamma)^{n-2} (\beta + 2\gamma x)}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 (4x\gamma - \beta^2)^{n-1} X} \\ &+ \frac{(2n-3)(2n-5) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1 (2\gamma)^{n-1}}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 (4x\gamma - \beta^2)^{n-1}} \int \frac{\varepsilon x}{X} \\ \text{II. } \int \frac{A+Bx \varepsilon x}{X^n} &= \frac{-B}{2\gamma(n-1)X^{n-1}} + \frac{2\gamma A - \beta B}{2\gamma} \int \frac{\varepsilon x}{X^n} \end{aligned}$$

264. Corollarium.

Pro $\beta=0$ obtinebimus ex (263. §. I.) sequens integrale, quod pro quovis numero integro positivo n pro perfecte determinato debet haberi, cum integrale $\int \frac{\varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2}$ per (252. §.) fit assignabile.

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x}{(\alpha + \gamma x^2)^n} &= \frac{x}{(n-1)2\alpha(\alpha + \gamma x^2)^{n-1}} + \frac{(2n-3)x}{(n-1)(n-2)(2\alpha)^2(\alpha + \gamma x^2)^{n-2}} \\ &+ \frac{(2n-3)(2n-5)x}{(n-1)(n-2)(n-3)(2\alpha)^3(\alpha + \gamma x^2)^{n-3}} + \dots \\ &+ \dots + \dots + \dots \\ &+ \frac{(2n-3)(2n-5) \dots 5 \cdot 3 \cdot x}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 (2\alpha)^{n-1} (\alpha + \gamma x^2)} \\ &+ \frac{(2n-3)(2n-5) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 (2\alpha)^{n-1}} \int \frac{\varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2} \end{aligned}$$

265. Problema.

Integrare exponentes differentiales $\frac{x^r \varepsilon x}{X}$, $\frac{x^r \varepsilon x}{X^n}$ pro quibuscumque numeris integris et positivis $r > 1$, $n > 1$.

Solutio.

Pro $-p$ et -1 loco p in (261. §. I. Form.) invenies sequentes formulas (I) (II): si vero in (261. §. III. Form.) scribas $-p$ loco p , elicies inde sequentem formulam (III). Ope secundae formulae poteris determinare integrale $\int \frac{x^r \varepsilon x}{X}$, si quaeras integralia $\int \frac{\varepsilon x}{X}$, $\int \frac{x \varepsilon x}{X}$ per (253. 254. §.), deinde ponas in eadem formula successive $m=1$, $m=2$, $m=3$, --- $m=r-1$. Ope primae autem formulae determinabitur integrale $\int \frac{x^r \varepsilon x}{X^n}$, si quaeratur antea integrale $\int \frac{\varepsilon x}{X^n}$ per (263. §.), deinde in sequente prima formula pro $p=n$ fiat successive $m=0$, $m=1$, $m=2$, $m=3$, $m=4$, --- $m=r-1$. Haec tamen integratio ope primae formulae iis tantum casibus succedet, quibus fuerit $r < 2n-1$: quamobrem, si sit $r=2n-1$, vel $r > 2n-1$, conjungatur formula prima cum tertia, illaque integralia quaerantur ope formulae tertiae, quorum loco formula prima infiniti valoris quantitates exhibet, auxiliaria vero integralia, quibus in tertiae formulae adplicatione opus fuerit, determinentur ope primae.

$$\text{I. } \int \frac{x^{m+1} \varepsilon x}{X^p} = \frac{x^m}{\gamma(m+2-2p)X^{p-1}} - \frac{m\alpha}{\gamma(m+2-2p)} \int \frac{x^{m-1} \varepsilon x}{X^p} - \frac{\beta(m+1-p)}{\gamma(m+2-2p)} \int \frac{x^m \varepsilon x}{X^p}.$$

$$\text{II. } \int \frac{x^{m+1} \varepsilon x}{X} = \frac{x^m}{m\gamma} - \frac{\alpha}{\gamma} \int \frac{x^{m-1} \varepsilon x}{X} - \frac{\beta}{\gamma} \int \frac{x^m \varepsilon x}{X}.$$

$$\text{III. } \int \frac{x^m \varepsilon x}{X^p} = \frac{x^m}{\beta(p-1)X^{p-1}} - \frac{2\alpha}{\beta} \int \frac{x^{m-1} \varepsilon x}{X^p} - \frac{(m+2-2p)}{\beta(p-1)} \int \frac{x^{m-1} \varepsilon x}{X^{p-1}}.$$

266. Corollarium I.

Si in (265. §. II. Formul.) ponas $\beta=0$, deinde successive $m=2$, $m=4$, $m=6$, --- $m=2r$; obtinebis inde, ob $\int \frac{x \varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2} = \frac{1}{2\gamma} \log(\alpha + \gamma x^2)$ per (245. §.) sequens integrale, pro quovis numero positivo impari $2r+1$ perfecte determinatum.

$$\int \frac{x^{2r+1} \varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2}$$

$$\int \frac{x^{2r+1} \varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2} = \frac{x^{2r}}{2r \cdot \gamma} - \frac{\alpha x^{2r-2}}{(2r-2)\gamma^2} + \frac{\alpha^2 x^{2r-4}}{(2r-4)\gamma^3} - \frac{\alpha^3 x^{2r-6}}{(2r-6)\gamma^4} \\ + \dots + \frac{\alpha^{r-1} \cdot x^2}{2 \cdot \gamma^r} + \frac{\alpha^r}{2 \cdot \gamma^{r+1}} \log(\alpha + \gamma x^2).$$

267. Corollarium 2.

Si autem in (265. §. II. Form.) ponas $\beta=0$, tum successive $m=1$, $m=3$, $m=5$, --- $m=2r-1$; invenies sequens integrale pro quolibet numero positivo pari $2r$ ope integralis per (252. §.) assignabilis perfecte determinatum.

$$\int \frac{x^{2r} \varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2} = \frac{x^{2r-1}}{(2r-1)\gamma} - \frac{\alpha x^{2r-3}}{(2r-3)\gamma^2} + \frac{\alpha^2 x^{2r-5}}{(2r-5)\gamma^3} - \frac{\alpha^3 x^{2r-7}}{(2r-7)\gamma^4} \\ + \dots + \frac{\alpha^{r-1} \cdot x}{1 \cdot \gamma^r} + \frac{\alpha^r}{\gamma^r} \int \frac{\varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2}.$$

268. Corollarium 3.

Si aequationem (III) in (265. §.) multiplices per β , tum ponas $\beta=0$, et $m+1$ loco m ; elicies inde integrale $\int \frac{x^{m+1} \varepsilon x}{(\alpha + \gamma x^2)^p}$ determinatum per $\int \frac{x^m \varepsilon x}{(\alpha + \gamma x^2)^{p-1}}$; quodsi ergo in hac formula successive ponas $p=2$, $p=3$, $p=4$, --- $p=n$, obtinebis, ut sequitur, integrale $\int \frac{x^m \varepsilon x}{(\alpha + \gamma x^2)^n}$ pro quibuslibet numeris integris positivis m , n perfecte determinatum, ob (266. 267. §.).

$$\int \frac{x^m \varepsilon x}{(\alpha + \gamma x^2)^n} = \frac{x^{m+1}}{(n-1)2\alpha(\alpha + \gamma x^2)^{n-1}} - \frac{(m-(2n-3))x^{m+1}}{(n-1)(n-2)(2\alpha)^2(\alpha + \gamma x^2)^{n-2}} \\ + \frac{(m-(2n-3))(m-(2n-5))x^{m+1}}{(n-1)(n-2)(n-3)(2\alpha)^3(\alpha + \gamma x^2)^{n-3}} - \dots \\ + \frac{(m-(2n-3))(m-(2n-5)) \dots (m-3)x^{m+1}}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (2\alpha)^{n-1}(\alpha + \gamma x^2)} \\ + \frac{(n-(2n-3))(n-(2n-5)) \dots (n-1) \int \frac{x^m \varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2}}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (2\alpha)^{n-1}}.$$

269. Problema.

Integrare exponentes differentiales $\frac{\varepsilon x}{xX^n}$, $\frac{\varepsilon x}{x^r X^n}$ pro quibuslibet numeris integris positivis r , n .

Solutio.

Pro $-m$ loco m in (265. §. I.) invenietur sequens formula ('): si autem in (261. §. III.) ponatur $-p$ loco p , et $m=0$; reperietur sequens formula (II). Iam vero ope secundae formulae determinabitur integrale $\int \frac{\varepsilon x}{x X^n}$, si in illa ponatur successive $p=2, p=3, p=4, \dots, p=n$, integraliaque auxiliaria $\int \frac{\varepsilon x}{x X}, \int \frac{\varepsilon x}{X^2}, \int \frac{\varepsilon x}{X^3}, \dots$ etc. per (256. 263. §.) quaerantur. Et ope primae formulae determinabitur integrale $\int \frac{\varepsilon x}{x X^n}$, si ope secundae quaeratur $\int \frac{\varepsilon x}{x X^n}$, hacque ipsa operatione definiatur quoque $\int \frac{\varepsilon x}{\lambda^n}$, deinde in formula prima pro $p=n$ fiat successive $m=1, m=2, m=3, m=4, \dots, m=r-1$.

$$I. \int \frac{\varepsilon x}{x^{m+1} X^p} = \frac{-1}{m \alpha x^{m+1} X^{p-1}} - \frac{\beta(p+m-1)}{m \alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x^m \lambda^p} - \frac{\gamma(2p+m-2)}{m \alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x^{m+1} \lambda^p}.$$

$$II. \int \frac{\varepsilon x}{x \lambda^p} = \frac{1}{2 \alpha (p-1) X^{p-1}} - \frac{\beta}{2 \alpha} \int \frac{\varepsilon x}{\lambda^p} + \frac{1}{\alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x \lambda^{p-1}}.$$

270. Corollarium 1.

Posito in (269. §. I.) $\beta=0, p=1$, tum successive $m=1, m=3, m=5, \dots, m=2r-1$; obtinebitur sequens integrale pro quovis numero positivo pari $2r$ per integrale juxta (252. §.) assignabile perfecte determinatum.

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x}{x^{2r}(\alpha + \gamma x^2)} &= \frac{-1}{(2r-1)\alpha x^{2r-1}} + \frac{\gamma}{(2r-3)\alpha^2 x^{2r-3}} - \frac{\gamma^2}{(2r-5)\alpha^3 x^{2r-5}} \\ &+ \frac{\gamma^3}{(2r-7)\alpha^4 x^{2r-7}} - \dots + \dots \\ &\pm \frac{\gamma^{r-1}}{1 \cdot \alpha^r \cdot x} \pm \frac{\gamma^r}{\alpha^r} \int \frac{\varepsilon x}{\alpha + \gamma x^2} + C. \end{aligned}$$

271. Corollarium 2.

Cum pro $b=0, a=\alpha, \pm c=\gamma$ in (256. §.) prodeat $\int \frac{\varepsilon x}{x(\alpha + \gamma x^2)}$
 $= \frac{1}{\alpha} \log \left(\frac{x}{\sqrt{\alpha + \gamma x^2}} \right)$, si in (269 §. I.) ponatur $\beta=0, p=1$,
tum

tum successive $m=2, m=4, m=6, m=8, \dots m=2r$; determinabitur sequens integrale pro quovis numero positivo impari $2r+1$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x}{x^{2r+1}(\alpha + \gamma x^2)} &= \frac{-1}{2r \cdot \alpha x^{2r}} + \frac{\gamma}{(2r-2)\alpha^2 x^{2r-2}} - \frac{\gamma^2}{2r-4 \alpha^3 x^{2r-4}} \\ &+ \frac{\gamma^3}{(2r-6)\alpha^4 x^{2r-6}} - \dots + \dots \\ &\pm \frac{\gamma^{r-1}}{2\alpha^r \cdot x^2} \pm \frac{\gamma^r}{\alpha^{r+1}} \log \left(\frac{x}{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} \right) + C. \end{aligned}$$

272. Corollarium 3.

Cognito autem integrali $\int \frac{\varepsilon x}{x^m(\alpha + \gamma x^2)}$ pro quocunque numero integro positivo m , pari aut impari, (270. 271. §.); determinabitur integrale $\int \frac{\varepsilon x}{x^m(\alpha + \gamma x^2)^n}$ pro quovis alio numero integro positivo n , si $-m$ loco m ponatur in (268. §.): erit enim

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x}{x^m(\alpha + \gamma x^2)^n} &= \frac{1}{(n-1)2\alpha x^{m-1}(\alpha + \gamma x^2)^{n-1}} + \frac{m+(2n-3)}{(n-1)(n-2)(2\alpha)^2 x^{m-1}(\alpha + \gamma x^2)^{n-2}} \\ &+ \frac{(m+(2n-3))(m+(2n-5))}{(n-1)(n-2)(n-3)(2\alpha)^3 x^{m-1}(\alpha + \gamma x^2)^{n-3}} + \dots \\ &+ \dots + \dots + \dots \\ &+ \frac{(m+(2n-3))(m+(2n-5)) \dots (m+3)}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (2\alpha)^{n-1} x^{m-1}(\alpha + \gamma x^2)} \\ &+ \frac{(m+(2n-3))(m+(2n-5)) \dots (m+1)}{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (2\alpha)^{n-1}} \int \frac{\varepsilon x}{x^m(\alpha + \gamma x^2)}. \end{aligned}$$

273. Probléma.

Integrare exponentes differentiales formula generali $\varepsilon y = \frac{x^k \varepsilon x}{(\alpha + \beta x^e + \gamma x^{-e})^p}$ comprehensos, quidquid sint exponentes k, e , modo sit p numerus integer negativus, et $\frac{k+1}{e}$ numerus integer, positivus aut negativus.

Solutio.

Fiat $z = x^e$; erit $x = z^{\frac{1}{e}}$; $x^k = z^{\frac{k}{e}}$; $\varepsilon x = \frac{1}{e} z^{\frac{1}{e}-1} \varepsilon z$:

adeoque habebimus

$$\varepsilon y = \frac{x^k \varepsilon x}{(\alpha + \beta x^e + \gamma x^{2e})^p} = \frac{1}{e} \cdot \frac{z^{\frac{k+1}{e}} \cdot \varepsilon z}{(x + \beta z + \gamma z^2)^p}.$$

Cum igitur sit p numerus integer positivus, et $\frac{k+1}{e}$ numerus integer positivus vel negativus; poterit integratio per (265. 269. §.) omni casu perfici.

Scholion.

Secundum haec principia commodissime perficietur integratio omnium exponentium differentialium fractorum et rationalium formula generali

$$\varepsilon y = \frac{(A + Bx^a + Cx^b + Dx^c + \dots + Qx^p) \varepsilon x}{x^s X^r}$$

comprehenform, quidquid sint numeri integri $a, b, c, \dots, p, s, r$, modo X aut sit simplex, aut quadratica functio, puta $X = \alpha + \beta x$, aut $X = \alpha + \gamma x^2$, vel $X = \alpha + \beta x + \gamma x^2$. Cum enim debeat esse

$$\varepsilon y = \frac{A \varepsilon x}{x^s X^r} + \frac{B x^{a-s} \varepsilon x}{X^r} + \frac{C x^{b-s} \varepsilon x}{X^r} + \dots + \frac{Q x^{p-s} \varepsilon x}{X^r},$$

singulaeque partes hujus exponentis differentialis, pro numeris integris $s, a-s, b-s, \dots, p-s$, tam positivis quam negativis, ope praecedentium formularum facile possint integrari; poterit eo ipso etiam integrale y ope earundem formularum perfecte determinari (242. §.). Inter omnes alios exponentes rationales; fractos maxime memorabiles sunt, qui formula

generali $\frac{x^m \varepsilon x}{(a + bx^n)^p}$ pro $n > 2$ comprehenduntur: integralia ipsorum perfecte possunt determinari, eadem fere ratione, qua superius integralia ejusmodi exponentium differentialium pro $n=2$ determinavimus (264. 266. 267. 268. 270. 271. 272. §.) Prius tamen, quam haec exponantur, methodum generalem integrandi omnes exponentes differentiales fractos et rationales paucis attingemus.

274. Problema.

Datis factoribus simplicibus formae $p+qx$, et quadraticis formae $\alpha + \beta x + \gamma x^2$, in quos functio integra rationalis N sit resolubilis, invenire integrale exponentis differentialis fracti et rationalis $\frac{M \varepsilon x}{N}$.

Solutio.

Solutio.

Si $\frac{M \varepsilon x}{N}$ esset fractio impropria, posset ea resolvi in duas partes $F \varepsilon x$, $\frac{m \varepsilon x}{N}$, nimirum functionem integram $F \varepsilon x$ et aliquam fractionem propriam $\frac{m \varepsilon x}{N}$ (10. 11. §.), essetque $\int \frac{M \varepsilon x}{N} = \int F \varepsilon x + \int \frac{m \varepsilon x}{N}$ (242. §.): quare, cum integrale $\int F \varepsilon x$ pro quavis possibili functione integra et rationali F variabilis x per (250. 251.) facile determinetur, patet, totum negotium eo demum reduci, ut ostendatur, quo modo integratio cujuslibet fractionis genuinae $\frac{m \varepsilon x}{N}$, qualem idcirco $\frac{M \varepsilon x}{N}$ esse supponemus, possit perfici.

Cum, per hypothesein, noscantur omnes factores simplices, aut quadratici, vel simplices et quadratici, in quos denominator N est resolvibilis; resolvatur exponens differentialis $\frac{M \varepsilon x}{N}$ in fractiones partiales $\frac{A \varepsilon x}{p + qx}$, $\frac{(A + Bx) \varepsilon x}{\alpha + \beta x + \gamma x^2}$, $\frac{A \varepsilon x}{(p + qx)^n}$, $\frac{(A + Bx) \varepsilon x}{(\alpha + \beta x + \gamma x^2)^n}$, quarum summa aequalis sit eidem exponenti $\frac{M \varepsilon x}{N}$, quod per praecepta 3ⁱⁱ capitis omni casu poterit praestari: deinde integrentur singulae fractiones seorsim secundum principia superius stabilita; summa enim integralium omnium fractionum dabit integrale exponentis differentialis $\frac{M \varepsilon x}{N}$.

275. Problema.

Sit functio $a + b x^n$ integra rationalis composita ex factore simplici $e - fx$, quadratico $d^2 - c^2 x^2$, et pluribus aliis factoribus quadraticis, qui omnes formula generali $p^2 - 2pqx \cos \phi + q^2 x^2$ comprehendantur, ita ut singulos inde ordine derivare liceat, si loco arcus indeterminati ϕ certi arcus $k, l, \dots s$ successive substituantur: exhibere integrale perfectum exponentis rationalis $\frac{x^m \varepsilon x}{a + b x^n}$.

Solutio.

I. Una fractionum partialium, in quas exponens $\frac{x^m \varepsilon x}{a + b x^n}$ potest resolvi, sequitur in (1) ob (226. §.); altera in (II) ob (228. §.); omnes vero reliquae

reliquae, ob (234. §.), comprehenduntur in (III), ita ut omnes inde ordine sint proditurae, si loco arcus indeterminati ϕ certi arcus $k, l, \dots$ successive substituantur.

$$I. \frac{-f^{n-m-1} \cdot \varepsilon x}{n b e^{n-m-1} (e-fx)} = \frac{f^{n-m-1}}{n b e^{n-m-1}} \cdot \frac{-f \varepsilon x}{e-fx}.$$

$$II. \frac{-2 c^{n-m} \cdot \varepsilon x}{n b d^{n-m-2} (d^2 - c^2 x^2)}, \text{ aut } \frac{c^{n-m-1}}{n b d^{n-m-1}} \cdot \frac{-2 c^2 x \varepsilon x}{d^2 - c^2 x^2},$$

prout est $n-m$ par aut impar numerus.

$$III. \frac{2 p^{m+1}}{n a q^m} \cdot \frac{(p \operatorname{Cof} m \phi - q x \operatorname{Cof} (m+1) \phi) \varepsilon x}{p^2 - 2 p q x \operatorname{Cof} \phi + q^2 x^2}.$$

2. Iam vero integrale exponentis differentialis (I) sequitur in (IV) per (241. 245. §.): integrale autem exponentis (II) sequitur in (V) per (241. 245. 252. §.). Porro sit

$$a = p^2; b = -2 p q \operatorname{Cof} \phi; c = q^2;$$

$$A = p \operatorname{Cof} m \phi; B = -q \operatorname{Cof} (m+1) \phi;$$

$$\text{erit } 2 A c - B b = 2 p q^2 (\operatorname{Cof} m \phi - \operatorname{Cof} (m+1) \phi \cdot \operatorname{Cof} \phi) =$$

$$= 2 p q^2 (\operatorname{Cof} m \phi - (\operatorname{Cof} m \phi - \operatorname{Sin} (m+1) \phi \cdot \operatorname{Sin} \phi));$$

$$\text{hinc } 2 A c - B b = 2 p q^2 \operatorname{Sin} (m+1) \phi \cdot \operatorname{Sin} \phi.$$

$$\sqrt{4 a c - b^2} = 2 p q \sqrt{1 - \operatorname{Cof}^2 \phi} = 2 p q \operatorname{Sin} \phi.$$

Quare, si hos valores in (255. §.) substituas, tum totum in $\frac{2 p^{m+1}}{n a q^m}$ ducas, obtinebis integrale exponentis differentialis (II), ut sequitur in (VI).

$$IV. \frac{f^{n-m-1}}{n b e^{n-m-1}} \log (e-fx).$$

$$V. \frac{c^{n-m-1}}{n b d^{n-m-1}} \log \frac{d-cx}{d+cx}, \text{ aut } \frac{c^{n-m-1}}{n b d^{n-m-1}} \log (d^2 - c^2 x^2),$$

consequenter

$$\frac{c^{n-m-1}}{n b d^{n-m-1}} \left(\log (d-cx) \mp \log (d+cx) \right) \text{ prout est } n-m \text{ num. par vel impar,}$$

$$VI. \frac{p^{m+1}}{n a q^{m+1}} \left(2 \operatorname{Sin} (m+1) \phi \cdot \operatorname{Arc} \operatorname{Tang} \frac{q x - p \operatorname{Cof} \phi}{p \operatorname{Sin} \phi} \right. \\ \left. - \operatorname{Cof} (m+1) \phi \cdot \log (p^2 - 2 p q x \operatorname{Cof} \phi + q^2 x^2) \right).$$

3. Ob (1) constabit ergo integrale dati exponentis differentialis $\frac{x^m \varepsilon x}{a + b x^n}$ ex (IV), (V), et omnibus integralibus, quae ex (VI) possunt derivari, si loco ϕ ii determinati arcus $k, l, \dots s$ successive substituantur, pro quibus loco ϕ substitutis ex factore $p^2 - 2pqx \operatorname{Cof} \phi + q^2 x^2$ omnes factores quadratici functionis $a + b x^n$ vi propositi problematis eliciuntur.

276. Corollarium I.

Functio integra rationalis $g + x^n$ composita est ex factoribus quadraticis, qui ex $g^{\frac{2}{n}} - 2g^{\frac{1}{n}} x \operatorname{Cof} \frac{(2k+1)}{n} \pi + x^2$ ordine elicientur, si successive fiat $k=0, k=1, k=2, k=3$, et sic porro usque $k=\frac{1}{2}n-1$, vel $k=\frac{n-3}{2}$ inclusive, prout est n par vel impar numerus, ita tamen, ut hoc altero casu illa functio adhuc unum factorem simplicem $g^{\frac{1}{n}} + x$ habeat (232. §.): quodsi ergo in (275. §. IV. VI.) ponas $e=g^{\frac{1}{n}}$, $f=-1$, $b=1$, $a=g$, $p=g^{\frac{1}{n}}$, $q=1$, $\phi=\frac{(2k+1)}{n}\pi$, obtinebis sequentes formulas, per quas integrale exponentis differentialis $\frac{x^m \varepsilon x}{g + x^n}$ perfecte determinatum est: nimirum obtinebis illud pro numero pari n ex formula (II), si loco k terminos seriei $0, 1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}n-1$ successive substituas; pro numero autem impari n sumes integrale (I), et huic addes integralia, quae successiva substitutione terminorum seriei $0, 1, 2, 3, 4, \dots, \frac{n-3}{2}$ loco k ex (II) possunt elici.

Adhibito

$$\text{I. } \frac{+ \log(g^{\frac{1}{n}} + x)}{ng^{\frac{n-1}{n}}}$$

signo + pro pari $n-m-1$,
et — pro impari $n-m-1$.

$$\text{II. } \left(2 \operatorname{Sin} \frac{(m+1)(2k+1)}{n} \pi \operatorname{Arc Tang} \frac{x - g^{\frac{1}{n}} \operatorname{Cof} \frac{(2k+1)}{n} \pi}{g^{\frac{1}{n}} \operatorname{Sin} \frac{(2k+1)}{n} \pi} \right. \\ \left. - \operatorname{Cof} \frac{(m+1)(2k+1)}{n} \pi \cdot l \left(g^{\frac{2}{n}} - 2g^{\frac{1}{n}} x \operatorname{Cof} \frac{(2k+1)}{n} \pi + x^2 \right) \right) \cdot \frac{1}{ng^{\frac{n-m-1}{n}}}.$$

277. Corollarium 2.

Posito $m=0$ in (276. §.) obtinebis sequentes formulas, integrale exponentis differentialis $\frac{e^x}{g+x^n}$ pro quolibet numero integro positivo, pari, et impari n ea lege, quam in (276. §.) determinavimus, exhibentes.

Adhibito

$$\begin{aligned} \text{I. } & \frac{\pm \log(g^{\frac{1}{n}} + x)}{ng^{\frac{n-1}{n}}} \quad \text{signo } + \text{ pro pari } n-1, \\ & \quad \text{et } - \text{ pro impari } n-1. \\ \text{II. } & \left(2 \sin \frac{(2k+1)\pi}{n} \cdot \text{ArcTang} \frac{x - g^{\frac{2}{n}} \text{Cof} \frac{(2k+1)\pi}{n}}{g^{\frac{1}{n}} \sin \frac{(2k+1)\pi}{n}} \right. \\ & \quad \left. - \text{Cof} \frac{(2k+1)\pi}{n} \cdot l \left(g^{\frac{2}{n}} - 2g^{\frac{1}{n}} x \text{Cof} \frac{(2k+1)\pi}{n} + x^2 \right) \right) \cdot \frac{1}{ng^{\frac{n-1}{n}}}. \end{aligned}$$

278. Corollarium 3.

Quodsi autem ponas $-m$ loco m in (276. §.), prodibunt inde sequentes formulae, integrale perfectum exponentis differentialis $\frac{e^x}{x^m(g+x^n)}$ pro quibuscumque numeris integris et positivis m, n ea lege, quam in (276. §.) exposuimus, exhibentes.

Adhibito

$$\begin{aligned} \text{I. } & \frac{\pm \log(g^{\frac{1}{n}} + x)}{ng^{\frac{n+m-1}{n}}} \quad \text{signo } + \text{ pro pari } n+m-1, \\ & \quad \text{et } - \text{ pro impari } n+m-1. \\ \text{II. } & \left(-2 \sin \frac{(m-1)(2k+1)\pi}{n} \cdot \text{ArcTang} \frac{x - g^{\frac{1}{n}} \text{Cof} \frac{(2k+1)\pi}{n}}{g^{\frac{1}{n}} \sin \frac{(2k+1)\pi}{n}} \right. \\ & \quad \left. + \text{Cof} \frac{(m-1)(2k+1)\pi}{n} \cdot l \left(g^{\frac{2}{n}} - 2g^{\frac{1}{n}} x \text{Cof} \frac{(2k+1)\pi}{n} + x^2 \right) \right) \cdot \frac{1}{ng^{\frac{n+m-1}{n}}}. \end{aligned}$$

279. Corollarium 4.

Functio integra et rationalis $g-x^n$ sic est composita ex factoribus, ut expressio $g^{\frac{2}{n}} - 2g^{\frac{1}{n}} x \text{Cof} \frac{2k\pi}{n} + x^2$ singulos ejus factores quadraticos dare

dare debeat, si in illa successive fiat $k=1$, $k=2$, $k=3$, et sic porro usque $k=\frac{1}{2}n-1$, vel $k=\frac{n-1}{2}$, prout est n par vel impar numerus, ita tamen, ut ad illos praeterea factor $g^{\frac{2}{n}}-x^2$ casu numeri paris n , vel factor simplex $g^{\frac{1}{n}}-x$ casu numeri imparis n debeat accedere (233. §.): quare si in (275. §. IV. V. VI.) ponas $e=d=p=g^{\frac{1}{n}}$, $q=c=f, =1$, $a=g$, $b=-1$, $\Phi=\frac{2k}{n}\pi$, prodibunt inde sequentes formulae, quae integrale exponentis differentialis $\frac{x^m e^x}{g-x^n}$ pro quovis alio numero integro m hac lege complectuntur. Si n est numerus par; sumatur integrale (II), ei-que addantur omnia integralia, quae successiva substitutione terminorum seriei 1, 2, 3, 4, - - - $\frac{1}{2}n-1$ loco k ex (III) possunt derivari: si vero n est numerus impar; sumendum est integrale (I), cui addi debent omnia integralia, quae successiva substitutione terminorum seriei 1, 2, 3, 4, - - - $\frac{n-1}{2}$ loco k ex (III) possunt elici.

$$\text{I. } \frac{\log(g^{\frac{1}{n}}-x)}{ng^{\frac{n-m-1}{n}}}.$$

Adhibito

$$\text{II. } \frac{-1(g^{\frac{1}{n}}-x) + 1(g^{\frac{1}{n}}+x)}{ng^{\frac{n-m-1}{n}}}$$

signo + pro pari $n-m$,
et - pro impari $n-m$.

$$\text{III. } \left(2 \sin \frac{(m+1)2k}{n} \pi \cdot \text{Arc Tang} \frac{x - g^{\frac{1}{n}} \text{Cof} \frac{2k}{n} \pi}{g^{\frac{1}{n}} \sin \frac{2k}{n} \pi} \right. \\ \left. - \text{Cof} \frac{(m+1)2k}{n} \pi \cdot 1 \left(g^{\frac{2}{n}} - 2g^{\frac{1}{n}} x \text{Cof} \frac{2k}{n} \pi + x^2 \right) \right) \cdot \frac{1}{ng^{\frac{n-m-1}{n}}}.$$

280. Corollarium 5.

Pro $m=0$ prodibunt hinc sequentes formulae, integrale exponentis differentialis $\frac{e^x}{g-x^n}$ eadem prorsus lege (279. §.) complectentes.

$$I. \frac{-\log(g^{\frac{x}{n}} - x)}{ng^{\frac{x}{n}}}$$

Adhibito

$$II. \frac{-1(g^{\frac{x}{n}} - x) \pm (g^{\frac{x}{n}} + x)}{ng^{\frac{x}{n}}} \quad \begin{array}{l} \text{signo } + \text{ pro pari } n, \\ \text{et } - \text{ pro impari } n. \end{array}$$

$$III. \left(2 \sin \frac{2k}{n} \pi \cdot \text{Arc Tang} \frac{x - g^{\frac{x}{n}} \text{Cof} \frac{2k}{n} \pi}{g^{\frac{x}{n}} \sin \frac{2k}{n} \pi} \right. \\ \left. - \text{Cof} \frac{2k}{n} \pi \cdot l \left(g^{\frac{x}{n}} - 2g^{\frac{x}{n}} x \text{Cof} \frac{2k}{n} \pi + x^2 \right) \right) \cdot \frac{1}{ng^{\frac{x}{n}}}$$

281. Corollarium 6.

Et pro $-m$ loco m obtinebimus ex (279. §.) sequentes formulas, quae eadem lege (279. §.) exhibent perfectum integrale exponentis differentialis $\frac{dx}{x^m(g-x^n)}$ pro quibuscumque numeris integris et positivis m, n .

$$I. \frac{-\log(g^{\frac{x}{n}} - x)}{ng^{\frac{x}{n}}}$$

Adhibito

$$II. \frac{-1(g^{\frac{x}{n}} - x) \pm 1(g^{\frac{x}{n}} + x)}{ng^{\frac{x}{n}}} \quad \begin{array}{l} \text{signo } + \text{ pro pari } n+m, \\ \text{et } - \text{ pro impari } n+m. \end{array}$$

$$III. \left(-2 \sin \frac{(m-1)2k}{n} \pi \cdot \text{Arc Tang} \frac{x - g^{\frac{x}{n}} \text{Cof} \frac{2k}{n} \pi}{g^{\frac{x}{n}} \sin \frac{2k}{n} \pi} \right. \\ \left. + \text{Cof} \frac{(m-1)2k}{n} \pi \cdot l \left(g^{\frac{x}{n}} - 2g^{\frac{x}{n}} x \text{Cof} \frac{2k}{n} \pi + x^2 \right) \right) \frac{1}{ng^{\frac{x}{n}}}$$

282. Problema.

Integrare exponentem differentialem $x^m dx (a + bx^n)^p$ pro quibuscumque exponentibus m, n, p , integris et fractis, modo sit $\frac{m+1}{n}$ numerus integer positivus.

Solutio.

Solutio.

$$\text{Sit } z = a + bx^n; \text{ erit } x = \frac{(z-a)^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}}; \text{ et } x = \frac{\varepsilon z (z-a)^{\frac{1-n}{n}}}{nb^{\frac{1}{n}}};$$

pro his valoribus, posito $\frac{m+1}{n} = \varphi$, fiet

$$x^m \varepsilon x (a + bx^n)^p = \frac{z^p \varepsilon z (z-a)^{\frac{m+1}{n}-1}}{nb^{\frac{m+1}{n}}} = \frac{z^p \varepsilon z (z-a)^{\varphi-1}}{nb^{\varphi}}.$$

Explicetur jam $(z-a)^{\varphi-1}$ per seriem (52. §.), deinde, ductis omnibus terminis in $z^p \varepsilon z$, quaeratur integrale per (249. §.), ac demum multiplicetur id per $\frac{1}{nb^{\varphi}}$ (241. §.), restituaturque valor variabilis z ; obtinebitur pro quaesito integrali sequens expressio.

$$\varphi = \frac{m+1}{n}.$$

$$\begin{aligned} \int x^m \varepsilon x (a + bx^n)^p &= \frac{1}{nb^{\varphi}} \left(\frac{(a + bx^n)^{p+\varphi}}{p+\varphi} - \frac{(\varphi-1)a}{1} \cdot \frac{(a + bx^n)^{p+\varphi-1}}{p+\varphi-1} \right. \\ &\quad + \frac{(\varphi-1)(\varphi-2)a^2}{1 \cdot 2} \cdot \frac{(a + bx^n)^{p+\varphi-2}}{p+\varphi-2} \\ &\quad - \frac{(\varphi-1)(\varphi-2)(\varphi-3)a^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{(a + bx^n)^{p+\varphi-3}}{p+\varphi-3} \\ &\quad + \dots \\ &\quad \left. \pm \frac{(\varphi-1)(\varphi-2)(\varphi-3) \dots (\varphi-r)a^r}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots r} \cdot \frac{(a + bx^n)^{p+\varphi-r}}{p+\varphi-r} \right) + C. \end{aligned}$$

Ultimus terminus est indeterminatus indicis r , ex quo singuli termini, post primum ordine sequentes, elicientur, si successive fiat $r=1$, $r=2$, $r=3$, $r=4$, et sic porro. Unde perspicuum fit, quod, cum $\varphi = \frac{m+1}{n}$ per hypothesein sit numerus integer positivus, ubi ad $r=\varphi$ deventum fuerit, terminus ultimus, ob $\varphi-r=0$, futurus sit aequalis nihilo: integrale determinabitur ergo per terminos numero $\varphi = \frac{m+1}{n}$. Porro fieri potest, ut, priusquam abruptatur series, evadat $r=\varphi+p$: hoc casu erit

$p + \phi - r = 0$, et terminus generalis dabit $\frac{(a+bx^n)^0}{0}$, cujus loco sumi debeat $\log(a+bx^n)$ ob (246. §.).

283. Problema.

Integrare exponentem differentialem $x^m \varepsilon x (a+bx^n)^p$ pro quibuscunque numeris m, n, p , modo sit $\frac{m+1}{n} + p$ numerus integer negativus.

Solutio.

Cum sit $x^m \varepsilon x (a+bx^n)^p = x^{m+n} p. \varepsilon x (ax^{-n} + b)^p$; ponatur in (282. §.) $m+np$ loco m , $-n$ loco n , a loco b , b loco a , et $ax^{-n} + b = \frac{a+bx^n}{x^n}$ loco $a+bx^n$ obtinebitur sequens series.

$$\begin{aligned} \phi &= - \left(\frac{m+1}{n} + p \right). \\ \int x^m \varepsilon x (a+bx^n)^p &= \frac{1}{n a \phi} \left(- \frac{\left(\frac{a+bx^n}{x^n} \right)^{p+\phi}}{p+\phi} + \frac{(\phi-1)b}{1} \cdot \frac{\left(\frac{a+bx^n}{x^n} \right)^{p+\phi-1}}{p+\phi-1} \right. \\ &\quad - \frac{(\phi-1)(\phi-2)b^2}{1 \cdot 2} \cdot \frac{\left(\frac{a+bx^n}{x^n} \right)^{p+\phi-2}}{p+\phi-2} \\ &\quad + \frac{(\phi-1)(\phi-2)(\phi-3)b^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{\left(\frac{a+bx^n}{x^n} \right)^{p+\phi-3}}{p+\phi-3} \\ &\quad - \dots + \dots \\ &\quad \left. + \frac{(\phi-1)(\phi-2) \dots (\phi-r)b^r}{1 \cdot 2 \dots r} \cdot \frac{\left(\frac{a+bx^n}{x^n} \right)^{p+\phi-r}}{p+\phi-r} \right) + C. \end{aligned}$$

In hac quoque serie terminus ultimus indeterminatus est, qui singulos terminos, post primum sequentes, ordine dabit, si in illo fiat successive $r=1, r=2, r=3, r=4$, et ita porro. Cum vero, per hypothesin, $\frac{m+1}{n} + p$ sit numerus integer negativus, adeoque ϕ integer positivus; necesse est, ut, ubi fuerit $r=\phi$, ob $\phi-r=0$, terminus ultimus aequetur nihilo; constabit ergo integrale terminis numero $\phi = - \left(\frac{m+1}{n} + p \right)$.

Deinde

Deinde eveniet fors, ut, antequam fiat $r = \phi$, evadat $r = \phi + p$, pro quo

valore continebit terminus ultimus expressionem $\frac{\left(\frac{a+bx^n}{x^n}\right)^0}{x^n}$, quae denotabit $\log\left(\frac{a+bx^n}{x^n}\right)$ per (246. §.).

284. Problema.

Datis integralibus $\int \frac{x^m \varepsilon x}{a+bx^n}$, $\int \frac{\varepsilon x}{a+bx^n}$, $\int \frac{\varepsilon x}{x^m(a+bx^n)}$, pro quibuscunque numeris integris positivis m, n ; invenire integralia $\int \frac{x^m \varepsilon x}{(a+bx^n)^p}$, $\int \frac{\varepsilon x}{(a+bx^n)^p}$, $\int \frac{\varepsilon x}{x^m(a+bx^n)^p}$ pro quolibet numero integro et positivo $p > 1$.

Solutio.

Ponatur in (258. §.) $\alpha = a$, $\gamma = b$, $q = n$, $\beta = 0$, hinc $X = a+bx^n$, deinde $p = -k$, et $m+1$ loco m , obtinebitur ex (260. §.) pro his valoribus sequens formula (I). Quodsi jam in hac formula successive fiat $k=2$, $k=3$, $k=4$, --- $k=p$; prodibit inde integrale (II); et ex hoc sequuntur, pro $m=0$, et $-m$ loco m , integralia (III) (IV.).

$$I. \int \frac{x^m \varepsilon x}{(a+bx^n)^k} = \frac{x^{m+1}}{na(k-1)(a+bx^n)^{k-1}} + \frac{n(k-1)-(m+1)}{na(k-1)} \int \frac{x^m \varepsilon x}{(a+bx^n)^{k-1}}.$$

$$II. \int \frac{x^m \varepsilon x}{(a+bx^n)^p} = \left(\frac{1}{(p-1)na(a+bx^n)^{p-1}} + \frac{n(p-1)-(m+1)}{(p-1)(p-2)(na)^2(a+bx^n)^{p-2}} \right. \\ + \frac{(n(p-1)-(m+1))(n(p-2)-(m+1))}{(p-1)(p-2)(p-3)(na)^3(a+bx^n)^{p-3}} \\ + \frac{(n(p-1)-(m+1))(n(p-2)-(m+1))(n(p-3)-(m+1))}{(p-1)(p-2)(p-3)(p-4)(na)^4(a+bx^n)^{p-4}} \\ + \dots \\ + \frac{(n(p-1)-(m+1))(n(p-2)-(m+1)) \dots (n.2-(m+1))}{(p-1)(p-2) \dots 3.2.(na)^{p-1}(a+bx^n)} x^{m+1} \\ \left. + \frac{(n(p-1)-(m+1))(n(p-2)-(m+1)) \dots (n.1-(m+1))}{(p-1)(p-2) \dots 3.2.1.(na)^{p-1}} \int \frac{x^m \varepsilon x}{a+bx^n} \right)$$

$$III. \int \frac{\varepsilon x}{(a+bx^n)^p} = \frac{x}{(p-1)na(a+bx^n)^{p-1}} + \frac{(np-n-1)x}{(p-1)(p-2)(na)^2(a+bx^n)^{p-2}} \\ +$$

integralia per (282. §.), posito $p = -1$, pro primo, et $p = -q$ pro secundo exponente. Porro videatur, annon sit $\frac{m-1}{n}$ in $\frac{ex}{x^{1n}(a+bx^n)}$, $\frac{ex}{x^{1n}(a+bx^n)^q}$ numerus integer positivus: hoc enim casu integrabuntur isti exponentes commodissime per (283. §.).

2. Absentibus his conditionibus (1) quaerantur integralia hac ratione. Si est $b = \pm h$; invenies integralia

$$\int \frac{ex}{a+bx^n} = \frac{1}{h} \int \frac{ex}{\frac{a}{h} \pm x^n}; \quad \int \frac{x \pm m ex}{a+bx^n} = \frac{1}{h} \int \frac{x \pm m ex}{\frac{a}{h} \pm x^n}$$

per (276. - - - 281. §.): inventis autem istis, determinabis integralia

$$\int \frac{ex}{(a+bx^n)^q}, \quad \int \frac{x \pm m ex}{(a+bx^n)^q} \quad \text{per (284. §.).}$$

CAPUT V.
DE
INTEGRATIONE EXPONENTIUM IRRATIONA-
LIUM, FORMAE GENERALIS

$$x^m \varepsilon x(a+bx^n \pm cx^{2n})^p.$$

286. Problema.

Integrare exponentes differentiales formula generali $\frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a+bx \pm cx^2)}}$ *comprehensos.*

Solutio.

Pro $z = x\sqrt{c + \sqrt{(a+bx+cx^2)}}$ obtinebitur sequens transformatio dati exponentis, sumto c cum signo $+$, unde per (252. §.) elicietur ejus integrale (I).

$$\frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a+bx+cx^2)}} = 2A \cdot \frac{\varepsilon z}{b+2z\sqrt{c}}.$$

Si vero ponas $z = \frac{2cx-b}{\sqrt{(4ac+b^2)}}$, obtinebis sequentem transformationem dati exponentis differentialis pro c cum signo $-$, unde per (240. §.) reperietur ejus integrale (II).

$$\frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a+bx-cx^2)}} = \frac{A}{\sqrt{c}} \cdot \frac{\varepsilon z}{\sqrt{(1-z^2)}}.$$

$$\text{I. } \int \frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a+bx+cx^2)}} = \frac{A}{\sqrt{c}} \log \left(2cx+b+2\sqrt{c}\sqrt{(a+bx+cx^2)} \right) + C.$$

$$\begin{aligned} \text{II. } \int \frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a+bx-cx^2)}} &= \frac{A}{\sqrt{c}} \text{Arc Sin } \frac{2cx-b}{\sqrt{(4ac+b^2)}} + C. \\ &= \frac{A}{\sqrt{c}} \text{Arc Tang } \frac{2cx-b}{2\sqrt{c}\sqrt{(a+bx-cx^2)}} + C. \end{aligned}$$

287. Corollarium I.

Pro $b=0$, et $a=0$ seorsum prodibunt hinc (286. §.) sequentes formulae integrales,

$$\int \frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a+cx^2)}}$$

$$\int \frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a+cx^2)}} = \frac{A}{\sqrt{c}} \log \left(x\sqrt{c} + \sqrt{(a+cx^2)} \right) + C.$$

$$\int \frac{A \varepsilon x}{\sqrt{(a-cx^2)}} = \frac{A}{\sqrt{c}} \operatorname{Arc Sin} \frac{x\sqrt{c}}{\sqrt{a}} + C.$$

$$\int \frac{A \varepsilon x}{x^{\frac{1}{2}} \sqrt{(b+cx)}} = \frac{A}{\sqrt{c}} \log \left(2cx + b + 2\sqrt{c} \sqrt{(bx+cx^2)} \right) + C.$$

$$\int \frac{A \varepsilon x}{x^{\frac{1}{2}} \sqrt{(b-cx)}} = \frac{A}{\sqrt{c}} \operatorname{Arc Sin} \frac{2cx-b}{b} + C.$$

288. Corollarium 2.

In (262. §. II.) ponatur $q = \frac{1}{2}$, obtinebitur inde $\int \varepsilon x \sqrt{X}$
 $= \frac{(2\gamma x + \beta) \sqrt{X}}{4\gamma} + \frac{4\alpha\gamma - \beta^2}{8\gamma} \int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X}}$, pro $X = \alpha + \beta x + \gamma x^2$: quod si
 ergo fiat $\alpha = a$, $\beta = b$, $\gamma = \pm c$, reperientur per (286. §.) sequentia in-
 tegralia.

$$\begin{aligned} \int \varepsilon x \sqrt{(a+bx+cx^2)} &= \frac{(2cx+b)\sqrt{(a+bx+cx^2)}}{4c} \\ &+ \frac{4ac-b^2}{8c\sqrt{c}} \log(2cx+b+2\sqrt{c}\sqrt{(a+bx+cx^2)}) + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \varepsilon x \sqrt{(a+bx-cx^2)} &= \frac{(2cx-b)\sqrt{(a+bx-cx^2)}}{4c} \\ &+ \frac{4ac+b^2}{8c\sqrt{c}} \operatorname{Arc Sin} \frac{2cx-b}{\sqrt{(4ac+b^2)}} + C \\ &= \frac{(2cx-b)\sqrt{(a+bx-cx^2)}}{4c} \\ &+ \frac{4ac+b^2}{8c\sqrt{c}} \operatorname{Arc Tang} \frac{2cx-b}{2\sqrt{c}\sqrt{(a+bx-cx^2)}} + C. \end{aligned}$$

289. Corollarium 3.

Hinc autem pro $b=0$, et $a=0$ seorsim obtinebuntur sequentes for-
 mulae integrales.

$$\int \varepsilon x \sqrt{(a+cx^2)} = \frac{1}{2} x \sqrt{(a+cx^2)} + \frac{a}{2\sqrt{c}} \log(x\sqrt{c} + \sqrt{(a+cx^2)}) + C.$$

$$\int \varepsilon x \sqrt{(a-cx^2)} = \frac{1}{2} x \sqrt{(a-cx^2)} + \frac{a}{2\sqrt{c}} \operatorname{Arc Sin} \frac{x\sqrt{c}}{\sqrt{a}} + C.$$

$$\begin{aligned}\int x^{\frac{1}{2}} \epsilon x \sqrt{(b+cx)} &= \frac{(2cx+b)\sqrt{(bx+cx^2)}}{4c} \\ &\quad - \frac{b^2}{8c\sqrt{c}} \log(2cx+b+2\sqrt{c}\sqrt{(bx+cx^2)}) + C. \\ \int x^{\frac{1}{2}} \epsilon x \sqrt{(b-cx)} &= \frac{(2cx-b)\sqrt{(bx-cx^2)}}{4c} \\ &\quad + \frac{b^2}{8c\sqrt{c}} \text{Arc Sin } \frac{2cx-b}{b} + C.\end{aligned}$$

290. Corollarium 4.

Exponens $\frac{A \epsilon x}{x\sqrt{(cx^2+bx \pm a)}}$ pro $z = \frac{\pm 2a+bx}{\pm 2ax}$ abit in
 $\frac{-A \epsilon z}{\sqrt{\left(\frac{\pm 4ac-b^2}{\pm 4a} \pm a z^2\right)}}$: quoniam per (287. §.) reperientur frequen-
 tes formulae integrales.

$$\begin{aligned}\int \frac{A \epsilon x}{x\sqrt{(cx^2+bx+a)}} &= C - \frac{A}{\sqrt{a}} \log\left(\frac{2a+bx+2\sqrt{a}\sqrt{(cx^2+bx+a)}}{x}\right). \\ \int \frac{A \epsilon x}{x\sqrt{(cx^2+bx-a)}} &= \frac{A}{\sqrt{a}} \text{Arc Cosin } \frac{2a-bx}{x\sqrt{(4ac+b^2)}} + C. \\ &= \frac{A}{\sqrt{a}} \text{Arc Tang } \frac{2\sqrt{a}\sqrt{(cx^2+bx-a)}}{2a-bx} + C.\end{aligned}$$

291. Corollarium 5.

Et hinc, pro $b=0$, $c=0$ seorsim, fluunt sequentes formulae integrales.

$$\begin{aligned}\int \frac{A \epsilon x}{x\sqrt{(x^2+a)}} &= C - \frac{A}{\sqrt{a}} \log\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{(cx^2+a)}}{x}\right). \\ \int \frac{A \epsilon x}{x\sqrt{(cx^2-a)}} &= C + \frac{A}{\sqrt{a}} \text{Arc Cosin } \frac{\sqrt{a}}{x\sqrt{c}}. \\ \int \frac{A \epsilon x}{x\sqrt{(bx+a)}} &= C - \frac{A}{\sqrt{a}} \log\left(\frac{2a+bx+2\sqrt{a}\sqrt{(bx+a)}}{x}\right). \\ \int \frac{A \epsilon x}{x\sqrt{(bx-a)}} &= C + \frac{A}{\sqrt{a}} \text{Arc Cosin } \frac{2a-bx}{bx}.\end{aligned}$$

292. Corollarium 6.

Posito $z = bx \pm a$ fiet $\frac{x^{\frac{1}{2}} \varepsilon x}{bx \pm a} = \frac{\varepsilon z \sqrt{(z \mp a)}}{zb^{\frac{1}{2}}}$, adeoque $\frac{x^{\frac{1}{2}} \varepsilon x}{bx \pm a}$

$$= \frac{1}{b^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{\varepsilon z}{\sqrt{(z \mp a)}} \mp \frac{a}{b^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{\varepsilon z}{z \sqrt{(z \mp a)}}.$$

Eapropter, si integrale algebraicum primae partis capiatur per (241. 248. §.), et pars altera integretur per (291. §.), prodibunt sequentia integralia.

$$\int \frac{x^{\frac{1}{2}} \varepsilon x}{bx - a} = \frac{2x^{\frac{1}{2}}}{b} - \frac{\sqrt{a}}{b\sqrt{b}} \log \left(\frac{bx + a + 2\sqrt{abx}}{bx - a} \right) + C.$$

$$\int \frac{x^{\frac{1}{2}} \varepsilon x}{bx + a} = \frac{2x^{\frac{1}{2}}}{b} - \frac{\sqrt{a}}{b\sqrt{b}} \text{Arc Cofin} \frac{a - bx}{a + bx} + C.$$

293. Problema.

Integrare exponentes differentiales $\varepsilon x \sqrt{X^k}$, $\frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^k}}$, $\frac{\varepsilon x \sqrt{X^k}}{x}$, $\frac{\varepsilon x}{x \sqrt{X^k}}$ pro quovis numero integro impari et positivo k , et quolibet trinomio $\alpha + \beta x + \gamma x^2 = X$.

Solutio.

Ponatur in (262. §. II.) $q = \pm \frac{n}{2}$; inveniatur sequens formula (I) et (II). Porro fiat in (261. §. III.) $m = 0$ et $p = \pm \frac{n}{2}$; obtinebitur sequens formula (III) et (IV). Cum pro $n = 3$ pars secunda primae formulae fiat

aequalis nihilo; erit integrale exponentis differentialis $\frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^k}}$ pro quovis

numero impari positivo $k > 1$ perfecte algebraicum, licet id pro $k = 1$ sit logarithmicum, aut trigonometricum (286. §.): inveniatur vero illud ope formulae (I), si in hac fiat successive $n = 3$, $n = 5$, $n = 7$ --- $n = k$.

Secunda autem formula, si in ea ponatur successive $n = 1$, $n = 3$, $n = 5$, --- $n = k - 2$, dabit integrale $\int \varepsilon x \sqrt{X^k}$ pro quovis numero impari positivo k dependenter a noto integrali $\int \varepsilon \sqrt{X}$ (288. §.). Pari ratione, si fiat $n = -1$, $n = 1$, $n = 3$, $n = 5$, --- $n = k - 2$, inveniatur integrale

$\int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^k}}{x}$ ope tertiae formulae dependenter ab notis integralibus

$\int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X}}$, $\int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{X}}$ (286. 290. §.). Formula quarta demum dabit integrale

exponentis $\frac{\varepsilon x}{x\sqrt{X^k}}$ dependenter a notis integralibus $\frac{\varepsilon x}{x\sqrt{X}}$ (290. §),

$\frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^3}}$, $\frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^5}}$ etc., si successive fiat $n=3$, $n=5$, $n=7$, --- $n=k$.

$$I. \int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^n}} = \frac{2(2\gamma x + \beta)}{(n-2)(4\alpha\gamma - \beta^2)\sqrt{X^{n-2}}} + \frac{4\gamma(n-3)}{(n-2)(4\alpha\gamma - \beta^2)} \int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^{n-2}}}.$$

$$II. \int \varepsilon x \sqrt{X^{n+2}} = \frac{(2\gamma x + \beta)\sqrt{X^{n+2}}}{2\gamma(n+3)} + \frac{(n+2)(4\alpha\gamma - \beta^2)}{4\gamma(n+3)} \int \varepsilon x \sqrt{X^n}.$$

$$III. \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^{n+2}}}{x} = \frac{\sqrt{X^{n+2}}}{n+2} + \alpha \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^n}}{x} + \frac{1}{2} \beta \varepsilon x \sqrt{X^n}.$$

$$IV. \int \frac{\varepsilon x}{x\sqrt{X^n}} = \frac{1}{(n-2)\alpha\sqrt{X^{n-2}}} - \frac{\beta}{2\alpha} \int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^n}} + \frac{1}{\alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x\sqrt{X^{n-2}}}.$$

294. Problema.

Integrare exponentes differentiales $x^r \varepsilon x \sqrt{X}$, $\frac{x^r \varepsilon x}{\sqrt{X}}$, $\frac{\varepsilon x \sqrt{X}}{x^r}$, $\frac{\varepsilon x}{x^r \sqrt{X}}$,
pro quovis trinomio $X = \alpha + \beta x + \gamma x^2$, et quovis numero integro positivo r .

Solutio.

Pone $p = \frac{1}{2}$ in (261. §. I.), obtinebis sequentem formulam (I); hinc autem pro $-m$ loco m elicies formulam (II). Porro fiat in (261. §. I.) $p = -\frac{1}{2}$; prodibit inde sequens formula (III), et ex hac formula (IV) pro $-m$ loco m . Ope harum formularum facile jam reducentur quaesita integralia ad integralia $\int \varepsilon x \sqrt{X}$, $\int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X}}$, $\int \frac{\varepsilon x}{x\sqrt{X}}$, quae in (288. 286. 290. §.) perfecte determinavimus, et integrale $\int \frac{\varepsilon x \sqrt{X}}{x}$ per (293. §. III.) pro $n = -1$ determinabile.

$$I. \int x^{m+1} \varepsilon x \sqrt{X} = \frac{x^m \sqrt{X^3}}{\gamma(m+3)} - \frac{m\alpha}{\gamma(m+3)} \int x^{m-1} \varepsilon x \sqrt{X} - \frac{\beta(2m+3)}{2\gamma(m+3)} \int x^m \varepsilon x \sqrt{X}.$$

$$II. \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X}}{x^m} = -\frac{\sqrt{X^3}}{(m-1)\alpha x^{m-1}} - \frac{\gamma(m-4)}{(m-1)\alpha} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X}}{x^{m-2}} - \frac{\beta(2m-5)}{2(m-1)\alpha} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X}}{x^{m-1}}.$$

$$III. \int \frac{x^{m+1} \varepsilon x}{\sqrt{X}} = \frac{x^m \sqrt{X}}{\gamma(m+1)} - \frac{m\alpha}{\gamma(m+1)} \int \frac{x^{m-1} \varepsilon x}{\sqrt{X}} - \frac{\beta(2m+1)}{2\gamma(m+1)} \int \frac{x^m \varepsilon x}{\sqrt{X}}.$$

$$IV. \int \frac{\varepsilon x}{x^m \sqrt{X}} = \frac{-\sqrt{X}}{(m-1)\alpha x^{m-1}} - \frac{\beta(2m-3)}{2(m-1)\alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x^{m-1} \sqrt{X}} - \frac{\gamma(m-2)}{(m-1)\alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x^{m-2} \sqrt{X}}.$$

295. Pro-

295. Problema.

Integrare exponentes differentiales $x^r \varepsilon x \sqrt{X^k}$, $\frac{x^r \varepsilon x}{\sqrt{X^k}}$, $\frac{\varepsilon x}{x^r \sqrt{X^k}}$, $\frac{\varepsilon x \sqrt{X^k}}{x^r}$

pro quovis trinomio $\alpha + \beta x + \gamma x^2 = X$, et quibuscumque numeris integris positivis r , imparibusque k .

Solutio.

In (261. §. I.) fiat $p = \frac{n}{2}$, nascetur sequens formula (I), et (IV) pro $-m$ loco m . Porro pro $-n$ loco n in (I) obtinebitur formula (II), et (III) si sumatur etiam $-m$ loco m . Denique in (261. §. III.) fiat $p = -\frac{n}{2}$, et $m = n - 1$; elicitur inde sequens formula (V). Quamobrem, invento integrali $\int \varepsilon x \sqrt{X^k}$ per (293. §.), determinabis $\int x^r \varepsilon x \sqrt{X^k}$ ope primae formulae, si pro $n = k$ successive ponas $m = 0$, $m = 1$, $m = 2$, $m = 3$, --- $m = r - 1$: captis autem integralibus $\int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^k}}$, $\int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{X^k}}$ per (293. §.), invenies integrale $\int \frac{\varepsilon x}{x^r \sqrt{X^k}}$ ope tertiae formulae, si in illa pro $n = k$ successive ponas $m = 1$, $m = 2$, $m = 3$, --- $m = r - 1$. Porro determinatis integralibus $\int \varepsilon x \sqrt{X^k}$, $\int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^k}}{x}$ per (293. §.) invenies eadem ratione integrale $\int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^k}}{x^r}$ ope quartae formulae. Quod autem ad integrationem exponentis differentialis $\frac{x^r \varepsilon x}{\sqrt{X^k}}$ adinet; dispiciatur, an sit $r \leq k - 1$, quo casu invenietur ejus integrale ope solius secundae formulae, si in hac pro $n = k$ successive ponatur $m = 0$, $m = 1$, $m = 2$, $m = 3$, --- $m = r - 1$: unde simul constat, integrale hoc futurum perfecte algebraicum, dependens ab integrali algebraico $\int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{X^k}}$ per (293. §.) determinabili. Quod si autem fuerit $r = k - 1$, vel $r > k - 1$, debet formula (II) cum (V) conjungi, ita ut ope formulae (V) ea integralia definiantur, quae formula (II) existente $m = n - 2$ dare nequiverit, integralia autem, quibus in applicatione formulae (V) opus fuerit, ope formulae (II) determinentur.

$$\begin{aligned} \text{I. } \int x^{m+1} \varepsilon x \sqrt{X^n} &= \frac{x^m \sqrt{X^{n+2}}}{\gamma(n+2+m)} - \frac{m \alpha}{\gamma(n+2+m)} \int x^{m-1} \varepsilon x \sqrt{X^n} \\ &\quad - \frac{\beta(n+2-2m)}{2\gamma(n+2+m)} \int x^m \varepsilon x \sqrt{X^n}. \end{aligned}$$

$$\text{II. } \int \frac{x^{m+1} \varepsilon x}{\sqrt{X^n}} = \frac{x^m}{\gamma(m+2-n)\sqrt{X^{n-2}}} - \frac{m\alpha}{\gamma(m+2-n)} \int \frac{x^{m-1} \varepsilon x}{\sqrt{X^n}} \\ - \frac{\beta(2n+2-n)}{2\gamma(m+2-n)} \int \frac{x^m \varepsilon x}{\sqrt{X^n}}.$$

$$\text{III. } \int \frac{\varepsilon x}{x^{m+1} \sqrt{X^n}} = \frac{-1}{m\alpha x^m \sqrt{X^{n-2}}} - \frac{\beta(2m+n-2)}{2m\alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x^m \sqrt{X^n}} \\ - \frac{\gamma(m+n-2)}{m\alpha} \int \frac{\varepsilon x}{x^{m-1} \sqrt{X^n}}.$$

$$\text{IV. } \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^n}}{x^{m+1}} = -\frac{\sqrt{X^{n+2}}}{m\alpha x^m} + \frac{\gamma(n+2-m)}{m\alpha} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^n}}{x^{m-1}} \\ + \frac{\beta(n+2-2m)}{2m\alpha} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{X^n}}{x^{m+1}}.$$

$$\text{V. } \int \frac{x^{n-1} \varepsilon x}{\sqrt{X^n}} = \frac{2x^{n-1}}{\beta(n-2)\sqrt{X^{n-2}}} - \frac{2\alpha}{\beta} \int \frac{x^{n-2} \varepsilon x}{\sqrt{X^n}} - \frac{2}{\beta(n-2)} \int \frac{x^{n-2} \varepsilon x}{\sqrt{X^{n-2}}}.$$

296. Corollarium.

Pro $z = x^k$ transformabitur exponents differentialis $x^r \varepsilon x (\alpha + \beta x^k + \gamma x^{2k})^{\frac{q}{2}}$ in $\frac{1}{k} \cdot z^{\frac{r+1}{k}-1} \cdot \varepsilon z \sqrt{(\alpha + \beta z + \gamma z^2)^q}$: omnes igitur exponentes differentiales illa formula comprehenssi perfecte erunt integrabiles, modo fit $\frac{r+1}{k}$ numerus integer, positivus vel negativus.

297. Problema.

Dato integrali $\int x^{m-1} \varepsilon x (\alpha + \beta x)^p$ invenire $\int x^m \varepsilon x (\alpha + \beta x)^p$, et dato hoc invenire $\int x^m \varepsilon x (\alpha + \beta x)^{p+1}$.

Solutio.

Primum integrale, ut sequitur in (I), obtinebitur ex (261. §. II.), posito $\gamma = 0$. Quodsi porro idem ejus valor substituat in (261. §. III.), tum scribatur $m+1$ loco m ; prodibit inde integrale (II.).

$$\text{I. } \int x^m \varepsilon x (\alpha + \beta x)^p = \frac{x^{m+1} (\alpha + \beta x)^{p+1}}{\beta(m+p+1)} - \frac{m\alpha}{\beta(m+p+1)} \int x^{m-1} \varepsilon x (\alpha + \beta x)^p.$$

$$\text{II. } \int x^m \varepsilon x (\alpha + \beta x)^{p+1} = \frac{x^{m+1} (\alpha + \beta x)^{p+1}}{m+p+2} + \frac{\alpha(p+1)}{m+p+2} \int x^m \varepsilon x (\alpha + \beta x)^p.$$

298. Corollarium 1.

Prima formula pro $-m$ loco m dabit sequentem (I); secunda vero formula pro $-p$ loco p dabit sequentem (II).

$$I. \int \frac{\varepsilon x (\alpha + \beta x)^p}{x^{m+1}} = -\frac{(\alpha + \beta x)^{p+1}}{m \alpha x^m} + \frac{\beta(p+1-m)}{m \alpha} \int \frac{\varepsilon x (\alpha + \beta x)^p}{x^m}.$$

$$II. \int \frac{x^m \varepsilon x}{(\alpha + \beta x)^p} = \frac{x^{m+1}}{\alpha(p-1)(\alpha + \beta x)^{p-1}} - \frac{(m-p+2)}{\alpha(p-1)} \int \frac{x^m \varepsilon x}{(\alpha + \beta x)^{p-1}}.$$

299. Corollarium 2.

Dato integrali $\frac{x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x}{\alpha + \beta x}$ (292. §.) determinabuntur sequentia integralia pro quovis numero integro positivo q , et quovis impari n , si in (297. §. I.) pro $p = -1$ fiat successive $m = \frac{1}{2}$, $m = \frac{3}{2}$, $m = \frac{5}{2}$, - - - $m = \frac{n}{2}$, et in (298. §. II.) pro $m = \frac{n}{2}$ fiat successive $p = 2$, $p = 3$, $p = 4$, - - - $p = q$.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x}{\alpha + \beta x} &= \frac{2x^{\frac{n}{2}}}{n\beta} - \frac{2\alpha x^{\frac{n-2}{2}}}{(n-2)\beta^2} + \frac{2\alpha^2 x^{\frac{n-4}{2}}}{(n-4)\beta^3} \\ &\quad - \frac{2\alpha^3 x^{\frac{n-6}{2}}}{(n-6)\beta^4} + \frac{2\alpha^4 x^{\frac{n-8}{2}}}{(n-8)\beta^5} - \dots + \dots \\ &\quad \pm \frac{2\alpha^{\frac{n-3}{2}} x^{\frac{3}{2}}}{3\beta^{\frac{n-1}{2}}} \mp \frac{\alpha^{\frac{n-1}{2}}}{\beta^{\frac{n-1}{2}}} \int \frac{x^{\frac{1}{2}} \varepsilon x}{\alpha + \beta x}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x}{(\alpha + \beta x)^q} &= \left(\frac{1}{(q-1)\alpha(\alpha + \beta x)^{q-1}} - \frac{n-2q+4}{2(q-1)(q-2)\alpha^2(\alpha + \beta x)^{q-2}} \right. \\ &\quad + \frac{(n-2q+4)(n-2q+6)}{2^2(q-1)(q-2)(q-3)\alpha^3(\alpha + \beta x)^{q-3}} - \dots - \\ &\quad \left. + \frac{(n-2q+4)(n-2q+6) - \dots - (n-4)(n-2)}{2^{q-2} \cdot (q-1)(q-2) - \dots - 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \alpha^{q-1}(\alpha + \beta x)} \right) x^{\frac{n+2}{2}} \\ &\quad + \frac{(n-2q+4)(n-2q+6) - \dots - (n-2)n}{2^{q-1} \cdot (q-1)(q-2) - \dots - 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \alpha^{q-1}} \int \frac{x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x}{\alpha + \beta x}. \end{aligned}$$

300. Corollarium 3.

Per idem integrale (292. §.) determinabuntur quoque sequentia integralia pro numeris integris positivis n , q , si in (298. §.) sumatur prima

formula, et in ea pro $p = -1$ fiat successive $m = -\frac{1}{2}$, $m = \frac{1}{2}$, $m = \frac{3}{2}$,
 --- $m = \frac{n}{2} - 1$, in secunda autem formula ejusdem $\S$ phi pro $m = -\frac{n}{2}$
 successive ponatur $p = 2$, $p = 3$, $p = 4$, --- $p = q$.

$$\int \frac{\varepsilon x}{x^{\frac{n}{2}}(\alpha + \beta x)} = \frac{-2}{(n-2)\alpha x^{\frac{n-2}{2}}} + \frac{2\beta}{(n-4)\alpha^2 x^{\frac{n-4}{2}}} \\
- \frac{2\beta^2}{(n-6)\alpha^3 x^{\frac{n-6}{2}}} + \dots \\
+ \frac{2\beta^{\frac{n-3}{2}}}{\alpha^{\frac{n-1}{2}} x} \pm \frac{2\beta^{\frac{n-1}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{\alpha^{\frac{n+1}{2}}} + \frac{\beta^{\frac{n+1}{2}}}{\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \int \frac{x^{\frac{1}{2}} \varepsilon x}{\alpha + \beta x} \\
\int \frac{\varepsilon x}{x^{\frac{n}{2}}(\alpha + \beta x)^q} = \left(\frac{1}{(q-1)x(\alpha + \beta x)^{q-1}} + \frac{n+2q-4}{2(q-1)(q-2)\alpha^2(\alpha + \beta x)^{q-2}} \right. \\
+ \frac{(n+2q-4)(n+2q-6)}{2^2(q-1)(q-2)(q-3)\alpha^3(\alpha + \beta x)^{q-3}} + \dots \\
+ \left. \frac{(n+2q-4)(n+2q-6) \dots (n+4)(n+2)}{2^{q-2}(q-1)(q-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot \alpha^{q-1}(\alpha + \beta x)} \right) \frac{1}{x^{\frac{n-2}{2}}} \\
+ \frac{(n+2q-4)(n+2q-6) \dots (n+4)(n+2)n}{2^{q-1}(q-1)(q-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot \alpha^{q-1}} \int \frac{\varepsilon x}{x^{\frac{n}{2}}(\alpha + \beta x)}$$

301. Corollarium 4.

Duo sequentia integralia determinata per notum integrale
 $x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x \sqrt{\alpha + \beta x}$ (289. §) derivabuntur ex (297. §.), si in prima formula
 pro $p = \frac{1}{2}$ fiat $m = \frac{3}{2}$, $m = \frac{5}{2}$, --- $m = \frac{n}{2} - 1$, et in secunda formula
 $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{2}$, --- $p = \frac{q}{2} - 1$ pro $m = \frac{n}{2}$.

$$\int x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x \sqrt{\alpha + \beta x} = \left(\frac{x^{\frac{n-3}{2}}}{(n+3)\beta} - \frac{n-3}{(n+3)(n+1)\beta^2} \right. \\
+ \frac{n(n-2)\alpha^2 x^{\frac{n-4}{2}}}{(n+3)(n+1)(n-1)\beta^3} - \dots + \dots \\
\left. \pm \frac{n(n-2)(n-4) \dots 7 \cdot 5 \alpha^{\frac{n-3}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{(n+3)(n+1)(n-1) \dots 8 \cdot 6 \cdot \beta^{\frac{n-1}{2}}} \right) 2\sqrt{\alpha + \beta x} \\
+ \frac{n(n-2)(n-4) \dots 5 \cdot 3 \alpha^{\frac{n-1}{2}}}{(n+3)(n+1)(n-1) \dots 8 \cdot 6 \cdot \beta^{\frac{n-1}{2}}} \int x^{\frac{1}{2}} \varepsilon x \sqrt{\alpha + \beta x}.$$

$\int x^{\frac{n}{2}}$

$$\int x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q} = \left(\frac{\sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{n+q+2} + \frac{q \alpha \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-2}}}{(n+q+2)(n+q)} \right. \\
+ \frac{q(q-2) \alpha^2 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-4}}}{(n+q+2)(n+q)(n+q-2)} + \dots \\
+ \frac{q(q-2)(q-4) \dots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{\frac{q-7}{2}} \cdot \sqrt{(\alpha + \beta x)^3}}{(n+q+2)(n+q)(n+q-2) \dots (n+7)(n+5)} \Big) 2 x^{\frac{n+3}{2}} \\
+ \frac{q(q-2)(q-4) \dots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}}}{(n+q+2)(n+q)(n+q-2) \dots (n+7)(n+5)} \int x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)}.$$

302. Corollarium 5.

Ex (297. §. I.) pro $p = -\frac{1}{2}$ et $m = \frac{1}{2}$, $m = \frac{3}{2}$, --- $m = \frac{n}{2}$ derivabitur sequens primum integrale per notum integrale $\int \frac{\varepsilon x}{x^{\frac{1}{2}} \sqrt{(x + \beta x)}}$ (287. §.) perfecte determinatum, per id ipsum vero determinabitur sequens secundum integrale, si in (298. §. II.) pro $m = \frac{n}{2}$ fiat $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{2}$, --- $p = \frac{q}{2}$.

$$\int \frac{x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \beta x)}} = \left(\frac{x^{\frac{n}{2}}}{(n+1)\beta} - \frac{n \alpha x^{\frac{n-2}{2}}}{(n+1)(n-1)\beta^2} + \frac{n(n-2) \alpha^2 x^{\frac{n-4}{2}}}{(n+1)(n-1)(n-3)\beta^3} \right. \\
- \dots + \dots \\
+ \frac{n(n-2)(n-4) \dots 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{\frac{n-1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}}}{(n+1)(n-1)(n-3) \dots 4 \cdot 2 \cdot \beta^{\frac{n+1}{2}}} \Big) 2 \sqrt{(\alpha + \beta x)} \\
+ \frac{n(n-2)(n-4) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \alpha^{\frac{n+1}{2}}}{(n+1)(n-1)(n-3) \dots 4 \cdot 2 \cdot \beta^{\frac{n+1}{2}}} \int \frac{\varepsilon x}{x^{\frac{1}{2}} \sqrt{(\alpha + \beta x)}}. \\
\int \frac{x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \beta x)^q}} = \left(\frac{1}{(q-2) \alpha \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-2}}} - \frac{n-q+4}{(q-2)(q-4) \alpha^2 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-4}}} \right. \\
+ \frac{(n-q+4)(n-q+6)}{(q-2)(q-4)(q-6) \alpha^3 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-6}}} - \dots + \dots \\
+ \frac{(n-q+4)(n-q+6) \dots (n-1)}{(q-2)(q-4) \dots 3 \cdot 1 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}} \cdot \sqrt{(\alpha + \beta x)}} \Big) 2 x^{\frac{n+3}{2}} \\
+ \frac{(n-q+4)(n-q+6) \dots (n-1)(n+1)}{(q-2)(q-4) \dots 3 \cdot 1 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}}} \int \frac{x^{\frac{n}{2}} \varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \beta x)}}.$$

Erit autem hoc alterum integrale perfecte algebraicum, independens a primo integrali, quoties fuerit $q = n + 4$, vel $q > n + 4$.

303. Corollarium 6.

Per idem integrale $\int \frac{\epsilon x}{x^{\frac{1}{2}} \sqrt{(\alpha + \beta x)}}$ notum ex (287. §.) determinabuntur quoque duo sequentia integralia, si in (297. §. II.) pro $m = -\frac{1}{2}$ fiat $p = -\frac{1}{2}$, $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{2}$, - - - - $p = \frac{q}{2} - 1$; et in (298. §. I.) pro $p = \frac{q}{2}$ ponatur $m = \frac{1}{2}$, $m = \frac{3}{2}$, - - - $m = \frac{q}{2} - 1$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\epsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{x^{\frac{1}{2}}} &= \left(\frac{\sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{q+1} + \frac{q \alpha \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-2}}}{(q+1)(q-1)} \right. \\ &\quad + \frac{q(q-2) \alpha^2 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-4}}}{(q+1)(q-1)(q-3)} + \dots \\ &\quad \left. + \frac{q(q-2)(q-4) \dots 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}} \sqrt{(\alpha + \beta x)}}{(q+1)(q-1)(q-3) \dots 4 \cdot 2} \right) 2x^{\frac{1}{2}} \\ &\quad + \frac{q(q-2)(q-4) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1}{(q+1)(q-1)(q-3) \dots 4 \cdot 2} \alpha^{\frac{q+1}{2}} \int \frac{\epsilon x}{x^{\frac{1}{2}} \sqrt{(\alpha + \beta x)}} \\ \int \frac{\epsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{x^{\frac{n}{2}}} &= \left(\frac{1}{(n-2) \alpha x^{\frac{n-2}{2}}} + \frac{(q-n+4) \beta}{(n-2)(n-4) \alpha^2 x^{\frac{n-4}{2}}} \right. \\ &\quad + \frac{(q-n+4)(q-n+6) \beta^2}{(n-2)(n-4)(n-6) \alpha^3 x^{\frac{n-6}{2}}} + \dots \\ &\quad \left. + \frac{(q-n+4)(q-n+6) \dots (q-1) \beta^{\frac{n-3}{2}}}{(n-2)(n-4) \dots 3 \cdot 1 \cdot \alpha^{\frac{n-1}{2}} x^{\frac{1}{2}}} \right) 2 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q+2}} \\ &\quad + \frac{(q-n+4)(q-n+6) \dots (q-1)(q+1) \beta^{\frac{n-1}{2}}}{(n-2)(n-4) \dots 3 \cdot 1 \cdot \alpha^{\frac{n-1}{2}}} \int \frac{\epsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{x^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Ceterum per se patet, hoc alterum integrale futurum perfecte algebraicum, independens a primo integrali, si fuerit $n = q + 4$ vel $n > q + 4$.

304. Corollarium 7.

Ex iisdem formulis (297 §. II. et 298. §. I.) determinabuntur per integrale

$$\int \frac{\epsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \beta x)}} \text{ ex (291. §.) notum, sequentia integralia, si in priori formula}$$

mula pro $m = -1$ fiat $p = -\frac{1}{2}$, $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{2}$, - - - $p = \frac{q}{2} - 1$, et in posteriori formula pro $p = \frac{q}{2}$ fiat $m = 1$, $m = 2$, $m = 3$, - - - $m = n - 1$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{x} &= \frac{2\sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{q} + \frac{2\alpha \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-2}}}{q-2} \\ &+ \frac{2\alpha^2 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-4}}}{q-4} + \dots \\ &+ \frac{2\alpha^{\frac{q-1}{2}} \cdot \sqrt{(\alpha + \beta x)}}{1} + \alpha^{\frac{q+1}{2}} \int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \beta x)}}. \\ \int \frac{\varepsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{x^n} &= - \left(\frac{1}{(n-1)\alpha x^{n-1}} + \frac{(q-2n+4)\beta}{2(n-1)(n-2)\alpha^2 x^{n-2}} \right. \\ &+ \frac{(q-2n+4)(q-2n+6)\beta^2}{2^2(n-1)(n-2)(n-3)\alpha^3 x^{n-3}} + \dots \\ &+ \frac{(q-2n+4)(q-2n+6) \dots (q-2)\beta^{n-2}}{2^{n-2} \cdot (n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \alpha^{n-1} \cdot x} \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q+2}} \\ &\left. + \frac{(q-2n+4)(q-2n+6) \dots (q-2)q\beta^{n-1}}{2^{n-1} \cdot (n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \alpha^{n-1}} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}}{x} \right) \end{aligned}$$

305. Corollarium 8.

Denique per dem notum integrale (291. §.) determinabuntur etiam sequentia integralia, si in (298. § II.) pro $m = -1$ fiat $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{2}$, - - - $p = \frac{q}{2}$; et in (298. § I.) pro $p = -\frac{q}{2}$ ponatur $m = 1$, $m = 2$, $m = 3$, - - - $m = n - 1$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}} &= \frac{2}{(q-2)\alpha \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-2}}} + \frac{2}{(q-4)\alpha^2 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-4}}} \\ &+ \frac{2}{(q-6)\alpha^3 \sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-6}}} + \dots \\ &+ \frac{2}{1 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}} \cdot \sqrt{(\alpha + \beta x)}} + \frac{1}{\alpha^{\frac{q+1}{2}}} \int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \beta x)}}. \\ \int \frac{\varepsilon x}{x^n \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}} &= \left(\frac{-1}{(n-1)\alpha x^{n-1}} + \frac{q+2n-4}{2(n-1)(n-2)\alpha^2 x^{n-2}} \right. \\ &- \frac{(q+2n-4)(q+2n-6)\beta^2}{2^2(n-1)(n-2)(n-3)\alpha^3 x^{n-3}} + \dots \\ &+ \frac{(q+2n-4)(q+2n-6) \dots (q+2)\beta^{n-2}}{2^{n-2} \cdot (n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1 \cdot \alpha^{n-1} \cdot x} \frac{1}{\sqrt{(\alpha + \beta x)^{q-2}}} \\ &\left. + \frac{(q+2n-4)(q+2n-6) \dots (q+2)q\beta^{n-1}}{2^{n-1} \cdot (n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1 \cdot \alpha^{n-1}} \int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \beta x)^q}} \right) \end{aligned}$$

306. Problema.

Dato integrali $\int x^m \epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^p$ invenire integralia $\int x^{m+2} \epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^p$, $\int x^{m-2} \epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^{p+1}$.

Solutio.

Primum invenies, si in (261. §. I.) ponas $\beta = 0$, et $m+1$ loco m : alterum vero obtinebis ex (261. §. III.) polito $\beta = 0$, et $m+1$ loco m .

$$\text{I. } \int x^{m+2} \epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^p = \frac{x^{m+1} (\alpha + \gamma x^2)^{p+1}}{\gamma (m+2p+3)} - \frac{(m+1)\alpha}{\gamma (m+2p+3)} \int x^m (\alpha + \gamma x^2)^p.$$

$$\text{II. } \int x^m \epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^{p+1} = \frac{x^{m+1} (\alpha + \gamma x^2)^{p+1}}{2p+m+3} + \frac{2\alpha(p+1)}{2p+m+3} \int x^m \epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^p.$$

307. Corollarium 1.

Si in prima formula ponatur $-m$ loco m , et in secunda $-p$ loco p , prodibunt inde sequentes formulae.

$$\text{I. } \int \frac{\epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^p}{x^m} = - \frac{(\alpha + \gamma x^2)^{p+1}}{(m-1)\alpha x^{m-1}} + \frac{\gamma(2p+3-m)}{(m-1)\alpha} \int \frac{\epsilon x (\alpha + \gamma x^2)^p}{x^{m-2}}.$$

$$\text{II. } \int \frac{x^m \epsilon x}{(\alpha + \gamma x^2)^p} = \frac{x^{m+1}}{2\alpha(p-1)(\alpha + \gamma x^2)^{p-1}} - \frac{(m+3-2p)}{2\alpha(p-1)} \int \frac{x^m \epsilon x}{(\alpha + \gamma x^2)^{p-1}}.$$

308. Corollarium 2.

Ex (306. §.) obtinentur sequentia integralia, per integrale $\int \epsilon x \sqrt{\alpha + \gamma x^2}$ ex (289. §.) notum determinata.

$$\begin{aligned} \int x^{2n} \epsilon x \sqrt{\alpha + \gamma x^2} &= \left(\frac{x^{2n-1}}{(2n+2)\gamma} - \frac{(2n-1)\alpha x^{2n-3}}{(2n+2)2n\gamma^2} \right. \\ &+ \frac{(2n-1)(2n-3)\alpha^2 x^{2n-5}}{(2n+2)2n(2n-2)\gamma^3} - \dots + \dots \\ &+ \left. \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{n-1} x}{(2n+2)2n(2n-2) \dots 6 \cdot 4 \cdot \gamma^n} \right) \sqrt{\alpha + \gamma x^2} \\ &+ \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot \alpha^n}{(2n+2)2n(2n-2) \dots 6 \cdot 4 \cdot \gamma^n} \int \epsilon x \sqrt{\alpha + \gamma x^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int x^{2n} \epsilon x \sqrt{\alpha + \gamma x^2}^q &= \left(\frac{\sqrt{\alpha + \gamma x^2}^n}{(2n+q+1)} + \frac{q\alpha \sqrt{\alpha + \gamma x^2}^{q-2}}{(2n+q+1)(2n+q-1)} \right. \\ &+ \frac{q(q-2)\alpha^2 \sqrt{\alpha + \gamma x^2}^{q-4}}{(2n+q+1)(2n+q-1)(2n+q-3)} + \dots \\ &+ \left. \frac{q(q-2)(q-4) \dots 7 \cdot 5 \cdot \alpha^{\frac{q-3}{2}} \cdot \sqrt{\alpha + \gamma x^2}}{(2n+q+1)(2n+q-1) \dots (2n+6)(2n+4)} \right) x^{2n+1} \end{aligned}$$

+

$$+ \frac{q(q-2)(q-4) \dots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}}}{(2n+q+1)(2n+q-1) \dots (2n+6)(2n+4)} \int x^{2n} \varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}$$

309. Corollarium 3.

Ex (306. §. I.) et (307. §. II.) elicientur sequentia per integrale

$\int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}}$ ex (287 §.) notum determinata integralia.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{2n} \varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} &= \left(\frac{x^{2n-1}}{2n \cdot \gamma} - \frac{(2n-1)\alpha x^{2n-3}}{2n(2n-2)\gamma^2} \right. \\ &+ \frac{(2n-1)(2n-3)\alpha^2 x^{2n-5}}{2n(2n-2)(2n-4)\gamma^3} - \dots + \dots \\ &+ \left. \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{n-1} x}{2n(2n-2) \dots 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \gamma^n} \right) \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)} \\ &+ \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \alpha^n}{2n(2n-2) \dots 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \gamma^n} \int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{2n} \varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^q} &= \left(\frac{1}{(q-2)\alpha \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^{q-2}} - \frac{2n-q+3}{(q-2)(q-4)\alpha^2 \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^{q-4}} \right. \\ &+ \frac{(2n-q+3)(2n-q+5)}{(q-2)(q-4)(q-6)\alpha^3 \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^{q-6}} - \dots + \dots \\ &+ \left. \frac{(2n-q+3)(2n-q+5) \dots (2n-2)}{(q-2)(q-4) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}} \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} \right) x^{2n+1} \\ &+ \frac{(2n-q+3)(2n-q+5) \dots (2n-2)2n}{(q-2)(q-4) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}}} \int \frac{x^{2n} \varepsilon x}{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} \end{aligned}$$

Hinc patet, secundum integrale debere fieri perfecte algebraicum, independens a primo, si est $q = 2n+3$, aut $q > 2n+3$.

310. Corollarium 4.

Porro ex (306. 307. §.) derivari possunt sequentia integralia, per integralia ex (291. 289. §.) nota perfecte determinata.

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^q}{x} &= \frac{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^q}{q} + \frac{\alpha \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^{q-2}}{q-2} \\ &+ \frac{\alpha^2 \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}^{q-4}}{q-4} + \dots + \dots \\ &+ \frac{\alpha^{\frac{q-1}{2}} \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}}{1} + \alpha^{\frac{q+1}{2}} \int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} \end{aligned}$$

$\int \varepsilon x$

$$\int \frac{\varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}}{x^{2n+1}} = - \left(\frac{1}{2n \cdot \alpha x^{2n}} + \frac{(q-2n+2)\gamma}{2n(2n-2)\alpha^2 x^{2n-2}} \right. \\ \left. + \frac{(q-2n+2)(q-2n+4)\gamma^2}{2n(2n-2)(2n-4)\alpha^3 x^{2n-4}} + \dots \right. \\ \left. + \frac{(q-2n+2)(q-2n+4) \dots (q-2)\gamma^{n-1}}{2n(2n-2) \dots 4 \cdot 2 \cdot \alpha^n x^2} \right) \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q+2}} \\ + \frac{(q-2n+2)(q-2n+4) \dots (q-2)q\gamma^n}{2n(2n-2)(2n-4) \dots 4 \cdot 2 \cdot \alpha^n} \int \frac{\varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}}{x}.$$

$$\int \varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q} = \left(\frac{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}}{q+1} + \frac{q\alpha \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q-2}}}{(q+1)(q-1)} \right. \\ \left. + \frac{q(q-2)\alpha^2 \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q-4}}}{(q+1)(q-1)(q-3)} + \dots \right. \\ \left. + \frac{q(q-2) \dots 7 \cdot 5 \cdot \alpha^{\frac{q-3}{2}} \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^3}}{(q+1)(q-1)(q-3) \dots 6 \cdot 4} \right) x \\ + \frac{q(q-2)(q-4) \dots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}}}{(q+1)(q-1)(q-3) \dots 6 \cdot 4} \int \varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}.$$

$$\int \frac{\varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}}{x^{2n}} = - \left(\frac{1}{(2n-1)\alpha x^{2n-1}} + \frac{(q-2n+3)\gamma}{(2n-1)(2n-3)\alpha^2 x^{2n-3}} \right. \\ \left. + \frac{(q-2n+3)(q-2n+5)\gamma^2}{(2n-1)(2n-3)(2n-5)\alpha^3 x^{2n-5}} + \dots \right. \\ \left. + \frac{(q-2n+3)(q-2n+5) \dots (q-1)\gamma^{n-1}}{(2n-1)(2n-3) \dots 3 \cdot 1 \cdot \alpha^n x} \right) \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q+2}} \\ + \frac{q-2n+3)(q-2n+5) \dots (q-1)(q+1)\gamma^n}{(2n-1)(2n-3) \dots 3 \cdot 1 \cdot \alpha^n} \int \varepsilon x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}.$$

Erit autem ultimum integrale perfecte algebraicum, independens a tertio, si fuerit $2n = q+3$ vel $2n > q+3$.

311. Corollarium 5.

Denique ex (306. 307. §.) derivari possunt sequentia integralia, ad integrale $\int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} \varepsilon x$ (291. §.) notum relata.

$$\int \frac{\varepsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}} = \frac{1}{(q-2)\alpha \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q-2}}} + \frac{1}{(q-4)\alpha^2 \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q-4}}} \\ + \frac{1}{(q-6)\alpha^3 \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q-6}}} + \dots +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{1 \cdot \alpha^{\frac{q-1}{2}} \cdot \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} + \frac{1}{\alpha^{\frac{q-1}{2}}} \int \frac{\epsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)}} \\
\int \frac{\epsilon x}{x^{2n+1} \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}} &= \left(\frac{-1}{2n \cdot \alpha x^{2n}} + \frac{(q+2n-2) \gamma}{2n(2n-2) \alpha^2 \cdot x^{2n-2}} \right. \\
& \quad - \frac{(q+2n-2)(q+2n-4) \gamma^2}{2n(2n-2)(2n-4) \alpha^3 \cdot x^{2n-4}} + \dots \\
& \quad \left. + \frac{(q+2n-2)(q+2n-4) \dots (q+2) \gamma^{n-1}}{2n(2n-2)(2n-4) \dots 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \alpha^n \cdot x^2} \right) \frac{1}{\sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^{q-2}}} \\
& + \frac{(q+2n-2)(q+2n-4) \dots (q+2) q \gamma^n}{2n(2n-2)(2n-4) \dots 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \alpha^n} \int \frac{\epsilon x}{x \sqrt{(\alpha + \gamma x^2)^q}}.
\end{aligned}$$

312. Problema.

Integrare exponentem differentialem $x^m \epsilon x (a + bx^n)^p$, in quo p est numerus integer negativus, alteruter vero, vel uterque exponens m, n , fractus ita tamen, ut $\frac{m+1}{n}$ aequetur alicui fractioni $\frac{v}{2}$ denominatoris 2.

Solutio.

Denotante q numerum integrum positivum, ponatur $p = -q$; erit

$$\text{pro } z = a + bx^n$$

$$x^m \epsilon x (a + bx^n)^p = \frac{x^m \epsilon x}{(a + bx^n)^q} = \frac{1}{n b^{\frac{m+1}{n}}} \cdot \frac{\epsilon z (z - a)^{\frac{m+1}{n} - 1}}{z^q}.$$

Quare, cum per hypothefin fit $\frac{m+1}{n}$, adeoque etiam $\frac{m+1}{n} - 1$ certa fractio $\pm \frac{v}{2}$ denominatoris 2; poterit quivis hujuscemodi exponens differentialis per (304. 305. §.) perfecte integrari.

313. Problema.

Integrare exponentem irrationalem $x^m \epsilon x (a + bx^n)^{\frac{u}{2}}$, in quo est $\frac{m+1}{n}$ aut numerus integer negativus, aut aliqua fractio, positiva vel negativa, denominatoris 2, quin ideo $\frac{m+1}{n} + \frac{n}{2}$ aequetur numero integro negativo (283. §.).

Solutio.

Pro $z = \sqrt{(a + bx^n)}$ erit

$$x^m \varepsilon x (a + bx^n)^{\frac{u}{2}} = \frac{2}{nb^{\frac{m+1}{n}}} \cdot z^{u+1} \varepsilon z (z^2 - a)^{\frac{m+1}{n} - 1}$$

Cum jam u sit numerus integer, positivus vel negativus, et $\frac{m+1}{n}$, adeoque etiam $\frac{m+1}{n} - 1$ vel numerus integer negativus, vel aliqua fractio $\pm \frac{v}{2}$ denominatoris 2; poterit hic exponens omni casu per (308. --- 311. §.) perfecte integrari.

314. Problema.

Integrare exponentem differentialem $x^m \varepsilon x (a + bx^n)^{\frac{u}{\mu}}$ pro quacunque fractione $\frac{u}{\mu}$ denominatoris $\mu > 2$, modo sit $\frac{m+1}{n}$ numerus integer negativus, aut $\frac{m+1}{n} + \frac{u}{\mu}$ numerus integer positivus.

Solutio.

I. Pro $z = \sqrt[\mu]{(a + bx^n)}$ fiet

$$x^m \varepsilon x (a + bx^n)^{\frac{u}{\mu}} = \frac{\mu}{nb^{\frac{m+1}{n}}} \cdot z^{u+\mu-1} \varepsilon z (z^\mu - a)^{\frac{m+1}{n} - 1}$$

II. Pro $z = \sqrt[\mu]{\frac{a + bx^n}{x^n}}$ erit

$$x^m \varepsilon x (a + bx^n)^{\frac{u}{\mu}} = - \frac{\mu a^{\frac{m+1}{n}} + \frac{u}{\mu}}{n} \cdot \varepsilon z z^{u+\mu-1} \frac{(z^\mu - b)^{\frac{m+1}{n} + \frac{u}{\mu} + 1}}{(z^\mu - b)^{\frac{m+1}{n} + \frac{u}{\mu} + 1}}$$

Iam vero u, μ sunt numeri integri per hypothesin: si ergo sit $\frac{m+1}{n}$ numerus integer negativus; poterit integratio, adhibita prima transformatione, per (285. §.) perfici: si autem sit $\frac{m+1}{n} + \frac{u}{\mu}$ numerus integer positivus; poterit ea per (285. §.) perfici, adhibita secunda transformatione.

315. Pro-

315. Problema.

Definire conditiones, quae exponentem differentialem $\varepsilon y = x^m \varepsilon x (a + bx^n)^p$ reddant perfecte integrabilem.

Solutio.

1. Omni casu, seu sit εy functio rationalis, seu alia quaecunque functio, modo sit $\frac{m+1}{n}$ numerus integer positivus, vel $\frac{m+1}{n} + p$ numerus integer negativus, poterit datus exponens per praecepta 4ti capitis perfecte integrari.

2. Si nulla harum conditionum (1) adsit, attendatur ad exponentem p . Existente p numero integro positivo, poterit integrale completum per (250. §.) determinari: si autem sit p numerus integer negativus, unico casu poterit datus exponens integrari, nimirum per (312. §.), si fuerit $\frac{m+1}{n}$ aliqua fractio denominatoris 2.

3. Si vero, absentibus his omnibus conditionibus (1) (2), sit p numerus fractus $\frac{\mu}{\mu}$ denominatoris $\mu = 2$, vel $\mu > 2$: casu primo aut pertinebit datus exponens differentialis ad formulas, quarum integralia in (299 --- 311. §.) sunt exposita, aut tunc solum erit is perfecte integrabilis, si fuerit $\frac{m+1}{n}$ vel numerus integer negativus, vel aliqua fractio, positiva aut negativa, denominatoris 2. (313. §.): casu autem altero non poterit datus exponens integrari, nisi per (314. §.), si sit $\frac{m+1}{n}$ numerus integer negativus, vel $\frac{m+1}{n} + \frac{\mu}{\mu}$ numerus integer positivus.

316. Corollarium.

Si fuerit integrandus exponens differentialis formae $\varepsilon y = x^r \varepsilon x (ax^u + bx^v)^k$; fiat $\varepsilon y = x^{r+uk} \cdot \varepsilon x (a + bx^{v-u})^k$, vel $\varepsilon y = x^{r+vku} \cdot \varepsilon x (ax^{u-v} + b)^k$, tum investigetur per (315. §.), utrum, et qua methodo is sit perfecte integrabilis.

Scholion.

Omnes exponentes differentiales, quorum integrationem in praesenti capite exposui, ita sunt comparati, ut illorum integratio ad pauca
S 2 praecepta

praecepta generalia possit revocari: omnes sane, ut videbimus in sequenti capite, formam exponentium rationalium possunt induere, eoque ipso reddi integrabiles. Verum, cum haec integrandi methodus in applicatione calculi integralis sit saepenumero admodum molesta; cumque hi ipsi exponentes irrationales frequentissime ingrediantur in disquisitiones analyticas; et demum innumeri alii exponentes irrationales ad illos summo calculi compendio possint revocari: operae pretium erat, completa illorum integrabilia diligentius, quam solet fieri, evolvere, aliamque simpliciore methodum integrandi ei, quae pro trinomiis irrationalibus a doctoribus calculi integralis passim praecipitur, substituere. Artificia, quibus exponentes irrationales possunt reddi integrabiles, quin transformatione in rationales opus sit, usu et assidua exercitatione optime discuntur: praecipua tamen ad binia sequentia capita possunt revocari.

I. Multi exponentes irrationales, qui non videntur esse integrabiles, sola multiplicatione, divisione, aut radicis extractione redduntur integrabiles: quoniam harum operationum institui debeat, ex comparatione formae, sub qua exponens integrandus proponitur, cum formis illorum exponentium, quorum integratio nota est, oportebit determinare.

II. Palmare artificium, quo etiam in antecedentibus saepius jam usus sumus, consistit in introductione novae variabilis, quae, pro diversitate exponentium integrandorum, jam toti functioni signo radicali substanti, jam certae ejus parti, aut alteri cuipiam functioni solet aequari. Ceterum, denuo moneo tyrones, ut, dum formam exponentis integrandi attente expendunt, formas quoque exponentium differentialium, de quorum integratione superius est actum, praeceptaque calculi differentialis perpetuo prae oculis habeant. Sub his conditionibus eveniet sane saepenumero, ut certae functiones pro variabilibus sponte se offerant.

Scholion 2.

Quodsi autem nullum artificium in potestate habeatur, quo datus exponentis irrationalis ita possit transformari, ut secundum praecedentia principia fiat, retenta irrationalitate, integrabilis; tentetur transformatio per substitutionem irrationalitatis. Multi profecto occurrent exponentes, qui, licet ii nullo modo integrabiles esse videantur, si per substitutionem novae alicujus variabilis ab omni irrationalitate liberentur, fiant eo ipso perfecte

fecte integrabiles. Constat praeterea, quemvis possibilem exponentem differentialem formae rationalis per praecepta 4ti capitis perfecte posse integrari, modo concedatur resolutio cujuslibet functionis integrae et rationalis in suos factores simplices: eo circa optandum esset, ut extaret aliqua generalis methodus omnibus exponentibus irrationalibus formam rationalium tribuendi, quam tamen penitus ignoramus. Quamobrem expendemus in sequenti capite peculiares aliquot, latissime patentes, formas exponentium irrationalium, artificiaque docebimus, quibus ii ab irrationalitate liberari possunt: tum subjungemus methodum in desperatis casibus, quales in adplicatione calculi integralis fere perpetuo se offerunt, adproximandi ad integralia exponentium, quorum perfecta integratio nulla via potest impetrari.

CAPUT VI
DE
INTEGRATIONE EXPONENTIUM TRANSCENDEN-
TIUM; TRANSFORMATIONE EXPONENTIUM
IRRATIONALIUM IN RATIONALES; IN-
TEGRATIONEQUE PER SERIES.

317. Theorema.

Assumtis signis $\int Y_{\varepsilon x}$; ${}^2\int Y_{\varepsilon x} = \int \varepsilon x \int Y_{\varepsilon x}$; ${}^3\int Y_{\varepsilon x} = \int \varepsilon x^2 \int Y_{\varepsilon x}$; et generatim ${}^n\int Y_{\varepsilon x} = \int \varepsilon x^{n-1} \int Y_{\varepsilon x}$; erit pro duabus quibuscunque functionibus Z, Y variabilis absolutae x .

$$\begin{aligned} \int Z Y_{\varepsilon x} &= \\ &= Z \int Y_{\varepsilon x} - \frac{\varepsilon Z}{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x} + \frac{{}^2\varepsilon Z}{\varepsilon x^2} \int Y_{\varepsilon x} - \frac{{}^3\varepsilon Z}{\varepsilon x^3} \int Y_{\varepsilon x} + \frac{{}^4\varepsilon Z}{\varepsilon x^4} \int Y_{\varepsilon x} - \text{etc.} \end{aligned}$$

Demonstratio.

1. Pro quolibet indice n integralis ${}^n\int Y_{\varepsilon x}$ erit per (257. §.).

$$\begin{aligned} \pm \int \frac{{}^n\varepsilon Z}{\varepsilon x^{n-1}} \int Y_{\varepsilon x} &= \pm \frac{{}^n\varepsilon Z}{\varepsilon x^n} \int \varepsilon x \int Y_{\varepsilon x} \mp \int \frac{{}^n\varepsilon Z}{\varepsilon x^n} \int \varepsilon x^n \int Y_{\varepsilon x} = \\ &= \pm \frac{{}^n\varepsilon Z}{\varepsilon x^n} \int Y_{\varepsilon x} \mp \frac{{}^{n+1}\varepsilon Z}{\varepsilon x^{n+1}} \int Y_{\varepsilon x}. \end{aligned}$$

2. Cum igitur sit $\int Z Y_{\varepsilon x} = Z \int Y_{\varepsilon x} - \int \varepsilon Z \int Y_{\varepsilon x}$ (257. §.); erit per (1) pro signis in theoremate assumtis

$$\begin{aligned} \int Z Y_{\varepsilon x} &= Z \int Y_{\varepsilon x} - \frac{\varepsilon Z}{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x} + \frac{{}^2\varepsilon Z}{\varepsilon x^2} \int Y_{\varepsilon x} - \frac{{}^3\varepsilon Z}{\varepsilon x^3} \int Y_{\varepsilon x} = \\ &= Z \int Y_{\varepsilon x} - \frac{\varepsilon Z}{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x} + \frac{{}^2\varepsilon Z}{\varepsilon x^2} \int Y_{\varepsilon x} - \frac{{}^3\varepsilon Z}{\varepsilon x^3} \int Y_{\varepsilon x} = \\ &= Z \int Y_{\varepsilon x} - \frac{{}^2\varepsilon Z}{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x} + \frac{{}^2\varepsilon Z}{\varepsilon x^2} \int Y_{\varepsilon x} - \frac{{}^3\varepsilon Z}{\varepsilon x^3} \int Y_{\varepsilon x} + \frac{{}^4\varepsilon Z}{\varepsilon x^4} \int Y_{\varepsilon x}, \text{ et sic} \\ &\text{porro.} \end{aligned}$$

318. Corollarium 1.

Pro $Z=y$ et $Y=x^0$ obtinebitur per (317. §.) sequens notissima series *Bernoulliana*, cujus ope integrale cujusvis exponentis differentialis $y \varepsilon x$ per exponentes εy , $\varepsilon^2 y$, $\varepsilon^3 y$, etc. rationum differentialium functionis y commode posset determinari, nisi ea id vitii haberet, quod, si y non sit functio integra rationalis, in infinitum excurrat.

$$\int y \varepsilon x = xy - \frac{x^2 \varepsilon y}{2 \cdot \varepsilon x} + \frac{x^3 \varepsilon^2 y}{2 \cdot 3 \cdot \varepsilon x^2} - \frac{x^4 \varepsilon^3 y}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \varepsilon x^3} + \text{etc.}$$

319. Corollarium 2.

Pro $\Phi=k^x$ est $\varepsilon \Phi=k^x \varepsilon x \cdot l k$ (112. §.): igitur debet esse $\int k^x \varepsilon x = \frac{k^x}{l a}$ (239. 241. §.). Quamobrem, posito $Y=a^x$, erit in (317. §.) $\int Y \varepsilon x = \frac{a^x}{l a}$; $\int^2 Y \varepsilon x = \frac{a^x}{(l a)^2}$; $\int^3 Y \varepsilon x = \frac{a^x}{(l a)^3}$; et sic porro. Pro qualibet functione Z variabilis absolutae x erit ergo per (317. §.).

$$\int Z a^x \varepsilon x = \frac{Z a^x}{l a} - \frac{a^x \varepsilon Z}{(l a)^2 \varepsilon x} + \frac{a^x \varepsilon^2 Z}{(l a)^3 \varepsilon x^2} - \frac{a^x \varepsilon^3 Z}{(l a)^4 \varepsilon x^3} + \text{etc.}$$

320. Corollarium 3.

Series haec (319. §.) abruptetur, si aliquis exponentium differentialium εZ , $\varepsilon^2 Z$, $\varepsilon^3 Z$, $\varepsilon^4 Z$, etc. fuerit aequalis nihilo, quo casu dabit illa integrale completum exponentis differentialis $Z a^x \varepsilon x$: exponents hic erit ergo per (319. §.) perfecte integrabilis, quoties fuerit Z aliqua functio integra rationalis variabilis absolutae x .

321. Corollarium 4.

Pro $Z=x^n$ obtinebitur ex (320. §.) sequens series, quae, nisi sit n numerus integer positivus, in infinitum excurret, abruptetur autem, completumque dabit integrale exponentis differentialis $a^x x^n \varepsilon x$, quoties fuerit n numerus integer positivus.

$$\int a^x x^n \varepsilon x = a^x \left(\frac{x^n}{l a} - \frac{n x^{n-1}}{(l a)^2} + \frac{n(n-1) x^{n-2}}{(l a)^3} - \frac{n(n-1)(n-2) x^{n-3}}{(l a)^4} + \dots \right) + C.$$

322. Corollarium 5.

Exponens negativus $n = -1$ dabit in (321. §) sequens integrale, pro quo finita expressio ignoratur.

$$\int \frac{a^x \varepsilon x}{x} = a^x \left(\frac{1}{x \log a} + \frac{1}{x^2 (\log a)^2} + \frac{1 \cdot 2}{x^3 (\log a)^3} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{x^4 (\log a)^4} + \text{etc.} \right) + C.$$

323. Corollarium 6.

Cum ubique logarithmi naturales subintelligantur, abfunt praeecedentes series (319. 321. 322. §.), pro basi $a = e$ logarithmorum naturalium, in sequentes.

$$\int Z e^x \varepsilon x = Z e^x - \frac{e^x \varepsilon Z}{\varepsilon x} + \frac{e^x \varepsilon^2 Z}{\varepsilon x^2} - \frac{e^x \varepsilon^3 Z}{\varepsilon x^3} + \text{etc.}$$

$$\int x^n e^x \varepsilon x = e^x (x^n - n x^{n-1} + n(n-1) x^{n-2} - n(n-1)(n-2) x^{n-3} + \text{etc.}) + C.$$

$$\int \frac{e^x \varepsilon x}{x} = e^x \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1 \cdot 2}{x^3} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{x^4} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{x^5} + \text{etc.} \right) + C.$$

324. Theorema.

Assumptis signis $\int Y \varepsilon x$; $\int Y \varepsilon x = \int \frac{\varepsilon x}{x} \int Y \varepsilon x$; $\int Y \varepsilon x = \int \frac{\varepsilon x}{x} \int Y \varepsilon x$,
 $\text{III} \int Y \varepsilon x = \int \frac{\varepsilon x}{x} \int Y \varepsilon x$, et ita porro; item $\varepsilon Z = A \varepsilon x$; $\varepsilon \cdot A x = B \varepsilon x$;
 $\varepsilon \cdot B x = C \varepsilon x$, et sic porro: erit pro quibuscumque duabus functionibus Z, Y variabilis absolutae x .

$$\begin{aligned} \int Z Y \varepsilon x &= \\ &= Z \int Y \varepsilon x - A x \int Y \varepsilon x + B x \int Y \varepsilon x - C x \int Y \varepsilon x + \text{etc.} \end{aligned}$$

Demonstratio.

1. Per (257. §.) erit generatim pro quocumque indice N integralis $\int Y \varepsilon x$.

$$\begin{aligned} \pm \int M \varepsilon x \int Y \varepsilon x &= \pm \int \frac{M x \varepsilon x}{x} \int Y \varepsilon x = \\ &= \pm M x \int \frac{\varepsilon x}{x} \int Y \varepsilon x + \int \varepsilon \cdot M x \int \frac{\varepsilon x}{x} \int Y \varepsilon x = \\ &= \pm M x \cdot \int Y \varepsilon x + \int \varepsilon \cdot M x \cdot \int Y \varepsilon x = \\ &= \pm M x \cdot \int Y \varepsilon x + \int P \varepsilon x \int Y \varepsilon x \\ &\text{posito } \varepsilon \cdot M x = P \varepsilon x. \end{aligned}$$

2. Qua-

2. Quare, cum sit $\int ZY_{\varepsilon x} = Z \int Y_{\varepsilon x} - \int \varepsilon Z \int Y_{\varepsilon x}$ (257. §.) = $Z \int Y_{\varepsilon x} - \int A_{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x}$; erit quoque pro signis in theoremate assumtis per (1)

$$\begin{aligned} \int ZY_{\varepsilon x} &= Z \int Y_{\varepsilon x} - A_x \int Y_{\varepsilon x} + \int B_{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x} = \\ &= Z \int Y_{\varepsilon x} - A_x \int Y_{\varepsilon x} + B_x \int Y_{\varepsilon x} - \int C_{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x} = \\ &= Z \int Y_{\varepsilon x} - A_x \int Y_{\varepsilon x} + B_x \int Y_{\varepsilon x} - C_x \int Y_{\varepsilon x} + \int D_{\varepsilon x} \int Y_{\varepsilon x} = \\ &= Z \int Y_{\varepsilon x} - A_x \int Y_{\varepsilon x} + B_x \int Y_{\varepsilon x} - C_x \int Y_{\varepsilon x} + \text{etc.} \end{aligned}$$

325. Corollarium 1.

Pro $Z = (lx)^n$ erit in (324. §.) $\varepsilon Z = n(lx)^{n-1} \cdot \frac{\varepsilon x}{x}$; $A_x = n(lx)^{n-1}$;
 $\varepsilon. A_x = n(n-1)(lx)^{n-2} \cdot \frac{\varepsilon x}{x} = B_{\varepsilon x}$; $\varepsilon. B_x = n(n-1)(n-2)(lx)^{n-3} \cdot \frac{\varepsilon x}{x}$;
 et sic porro per (104. 110. §.): pro his valoribus in (324. §.) substitutis obtinebitur sequens formula

$$\begin{aligned} \int Y(lx)^n \varepsilon x &= (lx)^n \int Y_{\varepsilon x} - n(lx)^{n-1} \int Y_{\varepsilon x} \\ &+ n(n-1)(lx)^{n-2} \int Y_{\varepsilon x} - n(n-1)(n-2)(lx)^{n-3} \int Y_{\varepsilon x} \\ &+ n(n-1)(n-2)(n-3)(lx)^{n-4} \int Y_{\varepsilon x} - \text{etc.} \end{aligned}$$

Quodsi ergo fuerit n numerus integer positivus, abruptetur haec series: et ideo, si praeterea exponentes differentiales $\frac{\varepsilon x}{x} \int Y_{\varepsilon x}$, $\frac{\varepsilon x}{x} \int Y_{\varepsilon x}$, $\frac{\varepsilon x}{x} \int Y_{\varepsilon x}$, $\frac{\varepsilon x}{x} \int Y_{\varepsilon x}$, etc. (324. §.) fuerint perfecte integrabiles, dabit illa completum integrale exponentis differentialis $Y(lx)^n \varepsilon x$.

326. Corollarium 2.

Sit igitur $Y = x^m$; fiet $\int Y_{\varepsilon x} = \frac{x^{m+1}}{m+1}$; $\int Y_{\varepsilon x} = \frac{x^{m+1}}{(m+1)^2}$; $\int Y_{\varepsilon x} = \frac{x^{m+1}}{(m+1)^3}$; et ita porro: ob (325. §.) obtinebimus pro his valoribus sequens integrale, constans terminis numero finitis, si n est numerus integer positivus.

$$\begin{aligned} \int x^m (lx)^n \varepsilon x &= \left(\frac{(lx)^n}{m+1} - \frac{n(lx)^{n-1}}{(m+1)^2} + \frac{n(n-1)(lx)^{n-2}}{(m+1)^3} \right. \\ &\quad \left. - \frac{n(n-1)(n-2)(lx)^{n-3}}{(m+1)^4} + \text{etc.} \right) x^{m+1} + C. \end{aligned}$$

327. Corollarium 3.

Series haec (326. §.) valorem infinitum obtinebit, si fiat $m = -1$, deberet autem illa dare integrale $\int \frac{(lx)^n}{x} \varepsilon x$. Verum constat esse

$$\varepsilon \cdot \frac{(lx)^{n+1}}{n+1} = \frac{(lx)^n}{x} \varepsilon x \quad (104. 110. §.):$$

debet ergo esse per (239. §.).

$$\int \frac{(lx)^n}{x} \varepsilon x = \frac{(lx)^{n+1}}{n+1} + C.$$

328. Corollarium 4.

Exponens $n = -1$ in (326. §.) dabit sequens integrale.

$$\int \frac{x^m \varepsilon x}{lx} = \left(\frac{1}{(m+1)lx} + \frac{1}{(m+1)^2(lx)^2} + \frac{1 \cdot 2}{(m+1)^3(lx)^3} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(m+1)^4(lx)^4} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{(m+1)^5(lx)^5} + \text{etc.} \right) x^{m+1} + C.$$

Hinc pro $m = 0$ fiet.

$$\int \frac{\varepsilon x}{lx} = \left(\frac{1}{lx} + \frac{1}{(lx)^2} + \frac{1 \cdot 2}{(lx)^3} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(lx)^4} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{(lx)^5} + \text{etc.} \right) x + C.$$

329. Corollarium 5.

Pro $Z = x^{m+1}$ et $Y = \frac{1}{x(lx)^n}$ invenies per (324. §.) sequentem formulam integralem.

$$\int \frac{x^m \varepsilon x}{(lx)^n} = - \left(\frac{1}{(n-1)(lx)^{n-1}} + \frac{m+1}{(n-1)(n-2)(lx)^{n-2}} + \frac{(m+1)^2}{(-1)(n-2)(n-3)(lx)^{n-3}} + \frac{(m+1)^3}{(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(lx)^{n-4}} + \text{etc.} \right) x^{m+1} + \frac{(m+1)^{n-1}}{(n-1)(n-2)(n-3) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1} \int \frac{x^m \varepsilon x}{lx}.$$

Verum ignoramus artificium, quo exponens differentialis $\frac{x^m \varepsilon x}{lx}$ ad perfectam integrationem recipiendam disponi queat.

330. Problema.

Integrare exponentem differentialem $\frac{\varepsilon \Phi \sin \Phi^m}{(a+b \cos \Phi)^n}$.

Solu-

Solutio.

$$\text{Ob } \varepsilon \varphi = -\frac{\varepsilon \text{Cof } \varphi}{\text{Sin } \varphi} \quad (119. \S.) \text{ erit}$$

$$\frac{\varepsilon \varphi \text{Sin } \varphi^m}{(a+b\text{Cof } \varphi)^n} = -\frac{\text{Sin } \varphi^{m-1} \cdot \varepsilon \text{Cof } \varphi}{(a+b\text{Cof } \varphi)^n}.$$

Pro $a+b\text{Cof } \varphi = x$ fiet

$$\text{Cof } \varphi = \frac{x-a}{b}; \quad \text{Sin } \varphi = \frac{1}{b} \sqrt{(b^2-a^2+2ax-x^2)}; \quad \varepsilon \text{Cof } \varphi = \frac{\varepsilon x}{b};$$

pro his valoribus transformabitur datus exponens in

$$\frac{\varepsilon \varphi \text{Sin } \varphi^m}{(a+b\text{Cof } \varphi)^n} = -\frac{1}{b^m} \cdot \frac{\varepsilon x \sqrt{(b^2-a^2+2ax-x^2)}^{m-1}}{x^n}.$$

Hinc evidenter patet, omnem ejusmodi exponentem differentialem per praecepta 4ti, aut 5ti capitis perfecte esse integrabilem, modo sint m, n numeri integri.

331. Corollarium 1.

Pro $a=b$ in (330. §.) habebitur sequens formula differentialis

$$x = a + a\text{Cof } \varphi = a(1 + \text{Cof } \varphi)$$

$$\frac{\varepsilon \varphi \text{Sin } \varphi^m}{(a+a\text{Cof } \varphi)^n} = \frac{\varepsilon \varphi \text{Sin } \varphi^m}{a^n(1+\text{Cof } \varphi)^n} = -\frac{1}{a^m} \cdot x^{\frac{m-2n-1}{2}} \cdot \varepsilon x \sqrt{(2a-x)}^{m-1}$$

Quare erunt omnes exponentes differentiales hujus formae per praecepta 4ti aut 5ti capitis perfecte integrabiles, si pro numero integro m fuerit n numerus integer, aut fractus denominatoris 2.

332. Corollarium 2.

Pro $m=0$ et $n=1$ in (330. §.) determinabis per (230. §.) sequentia integralia (I) (II): et si praeterea sit $a=b$, obtinebis sequens integrale (III).

Si est $a > b$

$$\text{I. } \int \frac{\varepsilon \varphi}{a+b\text{Cof } \varphi} = \frac{1}{\sqrt{(a^2-b^2)}} \text{Arc Cof } \frac{b+a\text{Cof } \varphi}{b\text{Cof } \varphi+a} + C.$$

Si est $a < b$,

$$\text{II. } \int \frac{\varepsilon \varphi}{a+b\text{Cof } \varphi} = C + \frac{1}{\sqrt{(b^2-a^2)}} \left(\frac{b+a\text{Cof } \varphi + \text{Sin } \varphi \cdot \sqrt{(b^2-a^2)}}{a+b\text{Cof } \varphi} \right)$$

Si est $a=b$.

$$\text{III. } \int \frac{\varepsilon \varphi}{a+a\text{Cof } \varphi} = \frac{\sqrt{(1-\text{Cof } \varphi)}}{a\sqrt{(1+\text{Cof } \varphi)}} = \frac{1}{a} \text{Tang } \frac{1}{2} \varphi + C.$$

Eo autem determinato casu, quo fuerit $m=n=1$ in (330. §.), fiet

$$\text{IV. } \int \frac{\varepsilon \varphi \sin \varphi}{a+b \cos \varphi} = C - \frac{1}{b} \log(a+b \cos \varphi).$$

333. Corollarium 3.

Et pro $m=0, n=2$ in (330. §.) elicies inde per (290. 294. §. IV.) sequentia notatu digna integralia.

Si est $a > b$.

$$\text{I. } \int \frac{\varepsilon \varphi}{(a+b \cos \varphi)^2} = \\ = C - \frac{b \sin \varphi}{(a^2-b^2)(a+b \cos \varphi)} + \frac{a}{\sqrt{(a^2-b^2)^3}} \text{Arc Cos} \frac{b+a \cos \varphi}{a+b \cos \varphi}.$$

Si est $a < b$

$$\text{II. } \int \frac{\varepsilon \varphi}{(a+b \cos \varphi)^2} = \\ = C + \frac{b \sin \varphi}{(b^2-a^2)(a+b \cos \varphi)} - \frac{a}{\sqrt{(b^2-a^2)^3}} \log \left(\frac{b+a \cos \varphi + \sin \varphi \sqrt{(b^2-a^2)}}{a+b \cos \varphi} \right).$$

334. Corollarium 5.

Eadem prorsus operatione, qua in resolutione problematis praecedentis sumus usi, obtinebitur sequens transformatio.

$$x' = a + b \cos \varphi.$$

$$\frac{\varepsilon \varphi \cos \varphi^m}{(a+b \cos \varphi)^n} = -\frac{1}{b^m} \cdot \frac{(x-a)^m \varepsilon x}{x^n \sqrt{(b^2-a^2+2ax-x^2)}}.$$

Atque hinc fit perspicuum, exponentes differentiales hujus formae secundum principia quinti capitis perfecte integrabiles futuros, si m sit numerus integer positivus, et n numerus quiscunque integer, positivus aut negativus.

335. Corollarium. 6.

Abibit autem haec formula (334. §.) pro $a=b$ in sequentem.

$$x = a + a \cos \varphi = a(1 + \cos \varphi).$$

$$\frac{\varepsilon \varphi \cos \varphi^m}{(a+a \cos \varphi)^n} = -\frac{1}{a^{1n}} \cdot \frac{(x-a)^m \varepsilon x}{x^{\frac{2n+1}{2}} \sqrt{(2a-x)}}$$

Unde patet, pro quibus numeris m, n , quae determinata methodo exponens hic differentialis perfecte est integrabilis: nimirum per praecepta quarti vel quinti capitis, si m est numerus integer positivus, et n aut nu-

merus

merus integer, positivus vel negativus, aut aequalis alicui fractioni $\pm \frac{v}{2}$, quo $2n$ fiat numerus integer; quodsi autem fit $m = \pm \frac{1}{2}$, aut quaecunque alia ejusmodi, positiva tamen, fractio $m = \frac{2r-1}{2}$, cum hoc casu simus habituri

$$\begin{aligned} \frac{(x-a)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{(2a-x)}} &= \frac{x-a}{\sqrt{(-2a^2+3ax-x^2)}}; \\ \text{aut } \frac{(x-a)^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{(2a-x)}} &= \frac{1}{\sqrt{(-2a^2+3ax-x^2)}}; \\ \text{vel } \frac{(x-a)^{\frac{2r-1}{2}}}{\sqrt{(2a-x)}} &= \frac{(x-a)^r}{\sqrt{(-2a^2+3ax-x^2)}}; \end{aligned}$$

erit datus exponens per theoriam trinomialium quinti capitis perfecte integrabilis, modo fit n aliqua fractio $\pm \frac{v}{2}$, ut $\frac{2n+1}{2} = \frac{\pm v+1}{2}$ sit numerus integer.

336. Corollarium 7.

Similes expressiones algebraicae invenientur pro exponentibus differentialibus $\frac{\varepsilon \phi \operatorname{Cof} \phi^m}{(a+b \sin \phi)^n}$, $\frac{\varepsilon \phi \sin \phi^m}{(a+b \sin \phi)^n}$: si nimirum fiat $\varepsilon \phi = \frac{\varepsilon \sin \phi}{\operatorname{Cof} \phi}$, tum

$$\begin{aligned} a+b \sin \phi &= x; \\ \text{erit I. } \frac{\varepsilon \phi \operatorname{Cof} \phi^m}{(a+b \sin \phi)^n} &= \frac{1}{b^m} \cdot \frac{\varepsilon x \sqrt{(b^2-a^2+2ax-x^2)^{m-1}}}{x^n}; \\ \text{II. } \frac{\varepsilon \phi \sin \phi^m}{(a+b \sin \phi)^n} &= \frac{1}{b^m} \cdot \frac{(x-a)^m \varepsilon x}{x^n \sqrt{(b^2-a^2+2ax-x^2)}}. \end{aligned}$$

Adeoque etiam posito $a=b$.

$$\begin{aligned} a+a \sin \phi &= x. \\ \text{III. } \frac{\varepsilon \phi \operatorname{Cof} \phi^m}{(a+a \sin \phi)^n} &= \frac{1}{a^m} \cdot x^{\frac{m-2n-1}{2}} \cdot \varepsilon x \sqrt{(2a-x)^{m-1}}; \\ \text{IV. } \int \frac{\varepsilon \sin \phi^m}{(a+a \sin \phi)^n} &= \frac{1}{a^m} \cdot \frac{(x-a)^m \varepsilon x}{x^{\frac{2n+1}{2}} \sqrt{(2a-x)}}. \end{aligned}$$

Quapropter pendebit integratio horum exponentium differentialium a theoria duorum capitum praecedentium.

337. Corollarium 8.

Pro $a=0$, et $b=1$ derivabis ex (336. §. I.) sequentes exponentes differentiales, prout nimirum utrumque exponentem, m , n , aut alterutrum duntaxat, cum proprio, vel contrario (—) signo sumseris, vel etiam $m=0$, aut $n=0$ posueris. Patet autem, omnes hos exponentes, hac ratione transformatos, secundum praecedentia principia, ea praecipue, quae in capite quinto sunt exposita, commodissime posse integrari.

$$x = \sin \phi; \sqrt{(1-x^2)} = \cos \phi.$$

$$\text{I. } \int \frac{\epsilon \phi \cos \phi^m}{\sin \phi^n} = \frac{\epsilon x \sqrt{(1-x^2)}^{m-1}}{x^n}.$$

$$\text{II. } \int \frac{\epsilon \phi \sin \phi^n}{\cos \phi^m} = \frac{x^n \epsilon x}{\sqrt{(1-x^2)}^{m+1}}.$$

$$\text{III. } \int \frac{\epsilon \phi}{\sin \phi^n \cos \phi^m} = \frac{\epsilon x}{x^n \sqrt{(1-x^2)}^{m+1}}.$$

$$\text{IV. } \int \epsilon \phi \sin \phi^n \cos \phi^m = x^n \epsilon x \sqrt{(1-x^2)}^{m-1}$$

$$\text{V. } \int \frac{\epsilon \phi}{\sin \phi^n} = \frac{\epsilon x}{x^n \sqrt{(1-x^2)}}.$$

$$\text{VI. } \int \frac{\epsilon \phi}{\cos \phi^m} = \frac{\epsilon x}{\sqrt{(1-x^2)}^{m+1}}.$$

$$\text{VII. } \int \epsilon \phi \sin \phi^n = \frac{x^n \epsilon x}{\sqrt{(1-x^2)}}.$$

$$\text{VIII. } \int \epsilon \phi \cos \phi^m = \epsilon x \sqrt{(1-x^2)}^{m-1}$$

338. Problema.

Integrare exponentes differentiales formulis generalibus $\frac{\epsilon \phi \cot \phi^m}{(a+b \tan \phi)^n}$

$\frac{\epsilon \phi \tan \phi^m}{(a+b \tan \phi)^n}$ comprehensos.

Solutio.

Cum sit $\epsilon \phi = \frac{\epsilon \tan \phi}{\sec \phi^2}$ (119. §.); erit

$$\frac{\epsilon \phi \cot \phi^m}{(a+b \tan \phi)^n} = \frac{\cot \phi^m \cdot \epsilon \tan \phi}{\sec \phi^2 (a+b \tan \phi)^n}$$

$$\frac{\epsilon \phi \tan \phi^m}{(a+b \tan \phi)^n} = \frac{\tan \phi^m \cdot \epsilon \tan \phi}{\sec \phi^2 (a+b \tan \phi)^n}.$$

Pro

Pro $x = a + b \text{Tang } \phi$, hinc

$$\text{Tang } \phi = \frac{x-a}{b}; \text{Cot } \phi = \frac{b}{x-a}; \varepsilon \text{Tang } \phi = \frac{\varepsilon x}{b}; \text{et}$$

$$\text{Sec } \phi^2 = \frac{a^2 + b^2 - 2ax + x^2}{b^2} \text{ erit igitur}$$

$$\text{I. } \frac{\varepsilon \phi \text{Cot } \phi^m}{(a+b \text{Tang } \phi)^n} = b^{m+1} \cdot \frac{\varepsilon x}{x^n (x-a)^m (a^2 + b^2 - 2ax + x^2)}$$

$$\text{II. } \frac{\varepsilon \phi \text{Tang } \phi^m}{(a+b \text{Tang } \phi)^n} = \frac{1}{b^{m-1}} \cdot \frac{(x-a)^m \varepsilon x}{x^n (a^2 + b^2 - 2ax + x^2)}$$

Omnes hujuscemodi exponentes differentiales erunt igitur pro quibuslibet numeris integris m, n per praecepta quarti capitis perfecte integrabiles.

Scholion.

Methodus, quam pro integratione exponentium differentialium trigonometricorum praescripti, in eo consistit, ut per congruas substitutiones datis exponentibus forma exponentium differentialium algebraicorum tribuatur: quare cum haec transformatio semper succedat, cumque integrationem exponentium differentialium algebraicorum in praecedentibus capitibus ita pertractaverim, ut ea in quibuslibet casibus commodissime possit perfici, non est, cur alia methodus integrandi exponentes differentiales trigonometricos desideretur. Subjungam modo problema generale, ut ex ejus resolutione eluceat, quinam exponentes differentiales trigonometrici hac methodo possint reddi integrabiles.

339. Problema.

Integrare exponentem differentialem $X\varepsilon\phi$, in quo praeter exponentem differentialem $\varepsilon\phi$ arcus ϕ certae hujus arcus functiones trigonometricae, ut sunt $\text{Sin } \phi$, $\text{Cos } \phi$, $\text{Tang } \phi$, $\text{Cot } \phi$, $\text{Sinv } \phi$, $\text{Cosv } \phi$, $\text{Sec } \phi$, $\text{Cosec } \phi$, et fors variae harum functionum potentiae, quomodocunque inter se et cum quantitatibus constantibus connexae, contineantur.

Solutio.

1. Loco $\varepsilon\phi$ substituatur in dato exponente differentiali $X\varepsilon\phi$ aliquis valorum in (119. §.) determinatorum, qui videlicet ad transformationis simplicitatem plurimum conferre visus fuerit: introducetur eo ipso loco $\varepsilon\phi$ aliquis exponentium differentialium $\varepsilon \text{Sin } \phi$, $\varepsilon \text{Cos } \phi$, $\varepsilon \text{Tang } \phi$, etc.

2. Ea ipsa jam functio trigonometrica arcus φ , nimirum $\text{Sin } \varphi$, vel $\text{Cos } \varphi$, aut $\text{Tang } \varphi$, etc., cujus exponentis differentialis loco $\varepsilon \varphi$ introductus fuerit (1), consideretur instar quantitatis variabilis x , aut summa vel differentia ejusdem functionis et certae quantitatis constantis, e. gr. $a \pm b \text{Sin } \varphi$, si quam datus exponentis differentialis $X \varepsilon \varphi$ complectitur, ponatur variabili x aequalis, prout illud aut hoc aptius visum fuerit; deinde exprimantur per variabilem x omnes reliquae functiones trigonometricae arcus φ secundum principia in (5. §. 1. Schol.) adducta.

3. Hac ratione reducetur integratio dati exponentis differentialis trigonometrici $X \varepsilon \varphi$ ad integrationem certi exponentis $Z \varepsilon x$ formae algebraicae, quae secundum principia superius exposita perficiatur.

340. Corollarium.

Si datus exponentis differentialis $X \varepsilon \varphi$ praeter exponentem differentialem $\varepsilon \varphi$ arcus φ complectatur functiones arcus $m \varphi$, puta $\text{Sin } m \varphi$, $\text{Cos } m \varphi$, $\text{Tang } m \varphi$, etc., cum sit exponentis differentialis $\varepsilon . m \varphi = m \varepsilon \varphi$; substituatur $\frac{\varepsilon . m \varphi}{m}$ loco $\varepsilon \varphi$, deinde peragantur reliqua, ut supra.

Exempla.

$$\text{Sit } \varepsilon y = \varepsilon \varphi . \text{Sin } m \varphi . \text{Cos } m \varphi^n;$$

$$\text{erit } \varepsilon y = \frac{1}{m} \varepsilon m \varphi . \text{Sin } m \varphi . \text{Cos } m \varphi^n;$$

$$= -\frac{1}{m} \varepsilon \text{Cos } m \varphi . \text{Cos } m \varphi^n \text{ (115. §.)};$$

$$\text{igitur } y = C - \frac{\text{Cos } m \varphi^{n+1}}{m(n+1)}.$$

$$\text{Sit } \varepsilon y = \frac{\varepsilon \varphi}{\text{Cos } m \varphi^n};$$

$$\text{erit } \varepsilon y = \frac{1}{m} \cdot \frac{\varepsilon . m \varphi}{\text{Cos } m \varphi^n}; \text{ hinc per (119. §.)}$$

$$\varepsilon y = \frac{1}{m} \cdot \frac{\varepsilon \text{Sin } m \varphi}{\text{Cos } m \varphi^{n+1}} = \frac{\varepsilon x}{\sqrt{(1-x^2)^{n+1}}} \text{ pro } x = \text{Sin } m \varphi.$$

341. Problema.

Integrare exponentes differentiales $\varphi^n \varepsilon \varphi . \text{Sin } \varphi$, $\varphi^n \varepsilon \varphi . \text{Cos } \varphi$.

Solu-

Solutio.

1. Ponatur $Z = \Phi^n$; erit $\varepsilon Z = n\Phi^{n-1}\varepsilon\Phi$, $\varepsilon^2 Z = n(n-1)\Phi^{n-2}\varepsilon\Phi^2$; $\varepsilon^3 Z = n(n-1)(n-2)\Phi^{n-3}\varepsilon\Phi^3$, etc.

2. Porro est $\int \varepsilon \Phi \cdot \sin \Phi = -\int \varepsilon \cos \Phi$ (115. §.) $= -\cos \Phi$; et $\int \varepsilon \Phi \cdot \cos \Phi = \int \varepsilon \sin \Phi$ (115. §.) $= \sin \Phi$.

3. Quodsi ergo ponatur $Y = \sin \Phi$, aut $Y = \cos \Phi$; obtinebuntur ex (317. §.) sequentia integralia.

$$\int \Phi^n \varepsilon \Phi \cdot \sin \Phi = C - \Phi^n \cos \Phi + n\Phi^{n-1} \sin \Phi + n(n-1)\Phi^{n-2} \cos \Phi \\ - n(n-1)(n-2)\Phi^{n-3} \sin \Phi - n(n-1)(n-2)(n-3)\Phi^{n-4} \cos \Phi \\ + \dots$$

$$\int \Phi^n \varepsilon \Phi \cdot \cos \Phi = C + \Phi^n \sin \Phi + n\Phi^{n-1} \cos \Phi - n(n-1)\Phi^{n-2} \sin \Phi \\ - n(n-1)(n-2)\Phi^{n-3} \cos \Phi + \dots$$

Patet, ita alternare signa $+$ et $-$, ut post quosvis binos terminos contiguos positivos sequantur bini contigui negativi, et vicissim. Porro clarum est, series has eo solo casu posse abrumpi, si n est numerus integer positivus.

342. Problema.

Datis integralibus $\int e^r \Phi \varepsilon \Phi \cdot \sin \Phi^n \cos \Phi^{m-2}$, $\int e^r \Phi \varepsilon \Phi \cdot \cos \Phi^m \sin \Phi^{n-2}$, pro basi e logarithmorum naturalium, invenire integrale $\int e^r \Phi \varepsilon \Phi \cdot \sin \Phi^n \cos \Phi^m$.

Solutio.

1. Ob $\varepsilon \cdot \frac{1}{r} e^r \Phi = e^r \Phi \varepsilon \Phi$ (113. §.); debet esse integrale $\int e^r \Phi \varepsilon \Phi = \frac{1}{r} e^r \Phi$ (239. §.).

2. Hinc (1) per (257. §.) elicies sequentem expressionem quaesiti integralis.

$$\int e^r \Phi \varepsilon \Phi \cdot \sin \Phi^n \cos \Phi^m = \\ = \frac{1}{r} e^r \Phi \sin \Phi^n \cos \Phi^m - \frac{1}{r} \int e^r \Phi \varepsilon \Phi (n \cos \Phi^{m+1} \sin \Phi^{n-1} - m \sin \Phi^{n+1} \cos \Phi^{m-1}).$$

3. Si porro partem alteram hujus aequationis resolvas per (257. §.), assumpto integrali (1), tum posito $1 - \sin \Phi^2 = \cos \Phi^2$, et $1 - \cos \Phi^2 = \sin \Phi^2$, obtinebis

$$\begin{aligned}
\int e^r \varphi \varepsilon \varphi \cdot \sin \varphi^n \operatorname{Cof} \varphi^m &= \frac{1}{r} e^r \varphi \sin \varphi^n \operatorname{Cof} \varphi^m \\
&- \frac{1}{r^2} e^r \varphi \left(n \operatorname{Cof} \varphi^{m+1} \sin \varphi^{n-1} - m \sin \varphi^{n+1} \operatorname{Cof} \varphi^{m-1} \right) \\
&+ \frac{1}{r^2} \int e^r \varphi \varepsilon \varphi \left(m(m-1) \sin \varphi^n \operatorname{Cof} \varphi^{m-2} + n(n-1) \operatorname{Cof} \varphi^m \sin \varphi^{n-2} \right. \\
&\quad \left. - (n^2 + m^2 + 2mn) \sin \varphi^n \operatorname{Cof} \varphi^m \right).
\end{aligned}$$

Quapropter debet esse

$$\begin{aligned}
&\int e^r \varphi \varepsilon \varphi \cdot \sin \varphi^n \operatorname{Cof} \varphi^m = \\
&= \frac{e^r \varphi (r \sin \varphi^n \operatorname{Cof} \varphi^m + m \sin \varphi^{n+1} \operatorname{Cof} \varphi^{m-1} - n \operatorname{Cof} \varphi^{m+1} \sin \varphi^{n-1})}{r^2 + m^2 + n^2 + 2mn} \\
&+ \frac{m(m-1)}{r^2 + m^2 + n^2 + 2mn} \int e^r \varphi \varepsilon \varphi \cdot \sin \varphi^n \operatorname{Cof} \varphi^{m-2} \\
&+ \frac{n(n-1)}{r^2 + m^2 + n^2 + 2mn} \int e^r \varphi \varepsilon \varphi \operatorname{Cof} \varphi^m \sin \varphi^{n-2}
\end{aligned}$$

343. Corollarium 1.

Pro $n=0$, $m=0$, aut $n=0$, $m=1$, vel $m=0$, $n=1$, obtinebis ex (342. §.) sequentia integralia

$$\begin{aligned}
\text{I. } \int e^r \varphi \varepsilon \varphi &= \frac{1}{r} e^r \varphi + C. \\
\text{II. } \int e^r \varphi \varepsilon \varphi \cdot \operatorname{Cof} \varphi &= \frac{e^r \varphi (r \operatorname{Cof} \varphi + \sin \varphi)}{r^2 + 1} + C. \\
\text{III. } \int e^r \varphi \varepsilon \varphi \cdot \sin \varphi &= \frac{e^r \varphi (r \sin \varphi - \operatorname{Cof} \varphi)}{r^2 + 1} + C.
\end{aligned}$$

344. Corollarium 2.

Si ponas $m=0$, inuenies per (342. §.) sequentem formulam, cujus ope poterit integrari exponens differentialis $e^r \varphi \varepsilon \varphi \cdot \sin \varphi^k$ pro quolibet numero integro positivo k .

$$\begin{aligned}
\int e^r \varphi \varepsilon \varphi \sin \varphi^n &= \frac{e^r \varphi (r \sin \varphi^n - n \operatorname{Cof} \varphi \sin \varphi^{n-1})}{r^2 + n^2} \\
&= \frac{n(n-1)}{r^2 + n^2} \int e^r \varphi \varepsilon \varphi \sin \varphi^{n-2}.
\end{aligned}$$

345. Corollarium 3.

Si vero fiat $n=0$ in (342. §.), obtinebitur sequens formula, ex qua integrale exponentis differentialis $e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \cdot \text{Cof} \varphi^m$ pro quolibet numero integro et positivo k poterit derivari.

$$\int e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \text{Cof} \varphi^m = \frac{e^{r\varphi} (r \text{Cof} \varphi^m + m \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^{m-1})}{r^2 + u^2} \\ + \frac{m(m-1)}{r^2 + m^2} \int e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \text{Cof} \varphi^{m-2}$$

346. Corollarium 4.

Pro $m=1$, vel $n=1$ in (342. §.) reperientur sequentes formulae, ope quarum integrari poterunt exponentes differentiales $e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \text{Cof} \varphi \text{Sin} \varphi^k$, $e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^k$ pro quolibet numero integro et positivo k .

$$\text{I. } \int e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \cdot \text{Cof} \varphi \text{Sin} \varphi^n = \\ = \frac{e^{r\varphi} (r \text{Cof} \varphi \text{Sin} \varphi^n - n \text{Cof} \varphi^2 \text{Sin} \varphi^{n-1} + \text{Sin} \varphi^{n+1})}{r^2 + n^2 + 2n + 1} \\ + \frac{n(n-1)}{r^2 + n^2 + 2n + 1} \int e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \cdot \text{Cof} \varphi \text{Sin} \varphi^{n-2}.$$

$$\text{II. } \int e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \cdot \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^m = \\ = \frac{e^{r\varphi} (r \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^m + m \text{Sin} \varphi^2 \text{Cof} \varphi^{m-1} - \text{Cof} \varphi^{m+1})}{r^2 + m^2 + 2m + 1} \\ + \frac{m(m-1)}{r^2 + m^2 + 2m + 1} \int e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \cdot \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^{m-2}$$

347. Corollarium 5.

Cum sit $\text{Sin} \varphi^2 = 1 - \text{Cof} \varphi^2$, et $\text{Cof} \varphi^2 = 1 - \text{Sin} \varphi^2$; poterit quodlibet productum $\text{Sin} \varphi^u \text{Cof} \varphi^v$ explicari per seriem formae $\text{Cof} \varphi^v + A \text{Cof} \varphi^{v+2} + B \text{Cof} \varphi^{v+4} + \dots + P \text{Cof} \varphi^{v+u}$, vel per seriem aliquam formae $\text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^v + A \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^{v+2} + B \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^{v+4} + \dots + P \text{Sin} \varphi \text{Cof} \varphi^{v+u-1}$, prout fuerit u numerus par vel impar: aut per seriem formae $\text{Sin} \varphi^u + A \text{Sin} \varphi^{u+2} + B \text{Sin} \varphi^{u+4} + \dots + P \text{Sin} \varphi^{u+v}$, vel $\text{Cof} \varphi \text{Sin} \varphi^u + A \text{Cof} \varphi \text{Sin} \varphi^{u+2} + \dots + P \text{Cof} \varphi \text{Sin} \varphi^{u+v-1}$. Licebit ergo exponentem differentialem $e^{r\varphi} \varepsilon \varphi \text{Sin} \varphi^u \text{Cof} \varphi^v$ pro quibuslibet numeris integris et positivis u, v per (346. 345. 344. §.) perfecte integrare.

348. Problema.

Dato integrali $\int X \epsilon x$, invenire integralia $\int X \epsilon x \text{ Arc Sin } x$, $\int X \epsilon x \text{ Arc Cof } x$, $\int X \epsilon x \text{ Arc Tang } x$.

Solutio.

Per (257. 120. 122. §.) invenies sequentes expressiones pro integralibus, quae desiderantur.

$$\text{I. } \int X \epsilon x \text{ Arc Sin } x = \text{Arc Sin } x \int X \epsilon x - \int \frac{\epsilon x \int X \epsilon x}{\sqrt{(1-x^2)}}.$$

$$\text{II. } \int X \epsilon x \text{ Arc Cof } x = \text{Arc Cof } x \int X \epsilon x + \int \frac{\epsilon x \int X \epsilon x}{\sqrt{(1-x^2)}}.$$

$$\text{III. } \int X \epsilon x \text{ Arc Tang } x = \text{Arc Tang } x \int X \epsilon x - \int \frac{\epsilon x \int X \epsilon x}{1+x^2}.$$

Quare, si generatim integrale $\int X \epsilon x$ fuerit functio algebraica variabilis x , pendebunt haec integralia ab integratione exponentium differentialium algebraicorum, de qua superius tractavimus.

349. Problema.

Invente functionem rationalem variabilis z aequalem exponenti differentiali $X \epsilon x$, in quo functio irrationalis $\sqrt{(a+bx \pm cx^2)}$ cum variabili x ejusdemque functionibus rationalibus quoquo modo connexa contineatur.

Solutio.

Praestabitur id, si in dato exponente differentiali $X \epsilon x$ loco x , ϵx , $\sqrt{(a+bx \pm cx^2)}$ sequentes valores substituantur.

I. Pro positivo coefficiente quadrati x^2 .

$$\sqrt{(a+bx+cx^2)} = \frac{bz + (a+z^2)\sqrt{c}}{b+2z\sqrt{c}}; \quad x = \frac{z^2 - a}{b+2z\sqrt{c}};$$

$$\epsilon x = \frac{2(bz + (a+z^2)\sqrt{c})\epsilon z}{(b+2z\sqrt{c})^2}; \quad \text{pro } z = x\sqrt{c} + \sqrt{(a+bx+cx^2)}.$$

II. Pro negativo coefficiente quadrati x^2 .

$$\sqrt{(a+bx-cx^2)} = \frac{z\sqrt{(b^2+4ac)}}{(1+z^2)\sqrt{c}}; \quad x = \frac{b(1+z^2) + (1-z^2)\sqrt{(b^2+4ac)}}{2c(1+z^2)};$$

$$\epsilon x = \frac{-2z\epsilon z\sqrt{(b^2+4ac)}}{c(1+z^2)^2}; \quad \text{pro } z = \frac{2\sqrt{c}\sqrt{(a+bx-cx^2)}}{\sqrt{(b^2+4ac)} - b + 2cx}.$$

350. Corollarium 1.

Si datus exponens differentialis $X \varepsilon x$ solam functionem irrationalem $\sqrt{(a \pm cx^2)}$, quomodocunque cum variabili x et ejus functionibus rationalibus connexam, complectatur; valores, pro quibus, loco x , εx , $\sqrt{(a \pm cx^2)}$ substitutis, ille formam rationalem induet, erunt, ob (349. §.) pro $b=0$, sequentes.

I. Pro coefficiente positivo quadrati x^2 .

$$\sqrt{(a+cx^2)} = \frac{z^2+a}{2z}; \quad x = \frac{z^2-a}{2z\sqrt{c}};$$

$$\varepsilon x = \frac{(z^2+a)\varepsilon z}{2z^2\sqrt{c}}, \quad \text{pro } z = x\sqrt{c} + \sqrt{(a+cx^2)}.$$

II. Pro coefficiente negativo quadrati x^2 .

$$\sqrt{(a-cx^2)} = \frac{2z\sqrt{a}}{1+z^2}; \quad x = \frac{(1-z^2)\sqrt{a}}{(1+z^2)\sqrt{c}};$$

$$\varepsilon x = \frac{-4z\varepsilon z\sqrt{a}}{(1+z^2)^2\sqrt{c}}; \quad \text{pro } z = \frac{\sqrt{(a-cx^2)}}{\sqrt{a+x\sqrt{c}}}.$$

351. Corollarium 2.

Per (350. §.) determinari possunt sequentia memorabilia integralia.

Posito $z = x + \sqrt{(a+x^2)}$.

$$\begin{aligned} \int (x + \sqrt{(a+x^2)})^n \varepsilon x &= \\ &= \frac{1}{2} \int z^n \varepsilon z + \frac{\alpha}{2} \int z^{n-2} \varepsilon z = \frac{z^{n+1}}{2(n+1)} + \frac{\alpha z^{n-1}}{2(n-1)} = \\ &= \frac{(x + \sqrt{(a+x^2)})^{n+1}}{2(n+1)} + \frac{\alpha (x + \sqrt{(a+x^2)})^{n-1}}{2(n-1)} + C. \end{aligned}$$

Unde pro $n = -1$ obtinetur per (246. §.)

$$\int \frac{\varepsilon x}{x + \sqrt{(a+x^2)}} = \frac{1}{2} \log(x + \sqrt{(a+x^2)}) - \frac{\alpha}{4(x + \sqrt{(a+x^2)})^2} + C.$$

$$\begin{aligned} \int (ex + c\sqrt{(a+x^2)})(x + \sqrt{(a+x^2)})^n \varepsilon x &= \\ &= \frac{1}{4}(e+c) \int z^{n+1} \varepsilon z + \frac{\alpha c}{2} \int z^{n-1} \varepsilon z + \frac{\alpha^2}{4}(c-e) \int z^{n-3} \varepsilon z = \\ &= \frac{(e+c)(x + \sqrt{(a+x^2)})^{n+2}}{4(n+2)} + \frac{\alpha c(x + \sqrt{(a+x^2)})^n}{2n} + \frac{\alpha^2(c-e)(x\sqrt{(a+x^2)})^{n-2}}{4(n-2)} + C. \end{aligned}$$

Hinc autem pro $n=0$ fit per (246. §.)

$$\int (ex + c\sqrt{\alpha + x^2}) \varepsilon x = \\ = \frac{1}{3}(c+c)(x+\sqrt{\alpha+x^2})^2 + \frac{\alpha c}{2}l(x+\sqrt{\alpha+x^2}) - \frac{\alpha^2(c-e)}{8(x+\sqrt{\alpha+x^2})^2} + C.$$

352. Problema.

Exponentem differentialem $X \varepsilon x$, complectentem functionem irrationalem $\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2}$ quacunq[ue] ratione connexam cum variabili x , et ejus functionibus rationalibus, per resolutionem trinomiali $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ in suos factores simplices, convertere in rationalem.

Solutio.

Duo casus sunt hic distinguendi: factores enim trinomiali $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ debent esse ambo reales, aut ambo imaginarii (171. §.).

I. Pro factoribus realibus.

Factores reales trinomiali $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ sint generatim $a + bx$, et $f + gx$. Valores, qui loco x , εx , et $\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2} = \sqrt{(a+bx)(f+gx)}$, in dato exponente differentiali $X \varepsilon x$ debebunt substitui, ut is formam rationalem obtineat, sunt' sequentes.

$$\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2} = -\frac{(ag - bf)z}{bz^2 - g}; \\ x = \frac{f - az^2}{bz^2 - g}; \quad \varepsilon x = \frac{2(ag - bf)z \varepsilon z}{(bz^2 - g)^2}; \\ z = \sqrt{\frac{f + gx}{a + bx}}.$$

II. Pro factoribus imaginariis.

Quodsi autem ambo factores trinomiali $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ sint imaginarii, consideretur hoc trinomium sub forma $a^2 - 2abx \operatorname{Cof} \phi + b^2 x^2$, posito $a^2 = \alpha$, $b^2 = \gamma$, $-2ab \operatorname{Cof} \phi = \beta$ (172. §.): erunt valores loco x , εx , $\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2}$ in exponente differentiali $X \varepsilon x$ substituendi, ut is in rationalem convertatur, sequentes.

$$\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2} = \sqrt{a^2 - 2abx \operatorname{Cof} \phi + b^2 x^2} = \frac{a(1 - 2z \operatorname{Cof} \phi + z^2)}{2(\operatorname{Cof} \phi - z)}; \\ x = \frac{a(1 - z^2)}{2b(\operatorname{Cof} \phi - z)}; \quad \varepsilon x = \frac{a(1 - 2z \operatorname{Cof} \phi + z^2) \varepsilon z}{2b(\operatorname{Cof} \phi - z)^2}; \\ z = \frac{1}{b} (bx - \sqrt{a^2 - 2abx \operatorname{Cof} \phi + b^2 x^2}).$$

Scho.

Scholion.

His principiis nititur methodus, cujus mentionem in (316. §. 1. Schol.) fecimus. Si generatim pro quocunque numero integro m , tam positivo quam negativo, et alio impari p , positivo et negativo, integrari debeat $\epsilon y = x^m \epsilon x \sqrt{(\alpha + \beta x + \gamma x^2)^p}$; ponetur
pro factoribus realibus

$$\epsilon y = -2(ag - bf)^{p+1} \cdot \frac{z^{p+1} \epsilon z (f - az^2)^m}{(bz^2 - g)^{m+p+2}};$$

et pro factoribus imaginariis

$$\epsilon y = \frac{(\frac{1}{2}a)^{m+p+1}}{b^{m+1}} \cdot \frac{(1 - z^2)^m (1 - 2z \operatorname{Cof} \phi + z^2)^{p+1} \epsilon z}{(\operatorname{Cof} \phi - z)^{m+p+2}}.$$

353. Problema.

Invenire functionem rationalem variabilis z aequalem exponenti differentiali $X \frac{\epsilon x}{x}$, in quo diversae potentiae $\sqrt[m]{(a + bx^n)^p}$, $\sqrt[m]{(a + bx^n)^q}$, $\sqrt[m]{(a + bx^n)^r}$, etc. unius ejusdemque mesimae radices binomii rationalis $a + bx^n$, cum functionibus rationalibus potentiae x^n quomodocunque connexae, contineantur.

Solutio.

Valores loco $\sqrt[m]{(a + bx^n)}$, x^n , et $\frac{\epsilon x}{x}$ in $X \frac{\epsilon x}{x}$ eum in finem substituendi, erunt sequentes.

$$x^n = \frac{z^m - a}{b}; \quad \frac{\epsilon x}{x} = \frac{mz^{m-1} \epsilon z}{n(z^m - a)}; \quad \text{pro } z = \sqrt[m]{(a + bx^n)}.$$

354. Corollarium.

Si in dato exponente differentiali $X \frac{\epsilon x}{x}$ contineantur diversae radices $\sqrt[\alpha]{(a + bx^n)^e}$, $\sqrt[\beta]{(a + bx^n)^g}$, $\sqrt[\gamma]{(a + bx^n)^h}$, etc.; poterunt illae converti in radices ejusdem denominationis, ut

$$\begin{aligned} \sqrt[\alpha]{(a + bx^n)^e} &= \sqrt[\alpha\beta\gamma]{(a + bx^n)^{e\beta\gamma}}, \\ \sqrt[\beta]{(a + bx^n)^g} &= \sqrt[\alpha\beta\gamma]{(a + bx^n)^{g\alpha\gamma}}, \\ \sqrt[\gamma]{(a + bx^n)^h} &= \sqrt[\alpha\beta\gamma]{(a + bx^n)^{h\alpha\beta}}. \end{aligned}$$

facta vero hac reductione, reliqua per (353. §.) perficientur.

355. Pro-

355. Problema.

Invenire functionem rationalem variabilis z aequalem exponenti differentiali $X \frac{\varepsilon x}{x}$ complectenti functionem irrationalem $\sqrt[\mu]{\frac{a+bx^n}{f+gx^n}}$ cum rationalibus functionibus potentiae x^n quacunque ratione connexam.

Solutio.

Substituantur in dato exponente differentiali $X \frac{\varepsilon x}{x}$ loco, x^n , $\frac{\varepsilon x}{x}$, et $\sqrt[\mu]{\frac{a+bx^n}{f+gx^n}}$ sequentes valores.

$$x^n = \frac{fz^\mu - a}{b - g z^\mu}; \quad \frac{\varepsilon x}{x} = \frac{\mu(bf - ag)z^{\mu-1} \cdot \varepsilon z}{n(fz^\mu - a)(b - g z^\mu)};$$

$$\text{pro } z = \sqrt[\mu]{\frac{a+bx^n}{f+gx^n}}.$$

356. Corollarium 1.

Pro $n=1$ obtinebuntur ex (355. §.) sequentes valores, qui, loco x , εx , et $\sqrt[\mu]{\frac{a+bx}{f+gx}}$, assumti, quemlibet exponentem differentialem $X \varepsilon x$ reddent rationalem, si is solam functionem irrationalem $\sqrt[\mu]{\frac{a+bx}{f+gx}}$, quacunque ratione connexam cum rationalibus functionibus variabilis x , complectatur.

$$x = \frac{fz^\mu - a}{b - g z^\mu}; \quad \varepsilon x = \frac{\mu(bf - ag)z^{\mu-1} \cdot \varepsilon z}{(b - g z^\mu)^2};$$

$$\text{pro } z = \sqrt[\mu]{\frac{a+bx}{f+gx}}.$$

357. Corollarium 2.

Si autem fiat $\mu=2$, prodibunt ex (355. §.) sequentes expressiones, quae valores in exponente differentiali $X \frac{\varepsilon x}{x}$ substituendos exhibent, ut is eo casu, quo X binas functiones irrationales $\sqrt{(a+bx^n)}$, $\sqrt{(f+gx^n)}$, solis constantibus a, b, f, g a se invicem discrepantes, et cum functionibus rationalibus potentiae x^n quoquo modo connexas complectitur, in rationalem possit converti.

$$x^n = \frac{fz^2 - a}{b - gz^2}; \quad \varepsilon x = \frac{2(bf - ag)z \varepsilon z}{n(fz^2 - a)(b - gz^2)};$$

$$\sqrt{(a + bx^n)} = \frac{z\sqrt{(bf - ag)}}{\sqrt{(b - gz^2)}}; \quad \sqrt{(f + gx^n)} = \frac{\sqrt{(bf - ag)}}{\sqrt{(b - gz^2)}};$$

$$\text{pro } z = \frac{\sqrt{(a + bx^n)}}{\sqrt{(f + gx^n)}} = \frac{\sqrt{(a + bx^n)(f + gx^n)}}{f + gx^n}.$$

Hac enim substitutione fiet, ut novus exponens differentialis unicam functionem irrationalem $\sqrt{(b - gz^2)}$ complectatur, de cujus eliminatione superius est actum.

358. Corollarium 3.

Et pro $n=1$ in (357. §.) reperientur sequentes valores, qui in dato exponente irrationali $X \varepsilon x$ substituti ipsum reddent rationalem, quoties ille binas functiones irrationales $\sqrt{(a + bx)}$ et $\sqrt{(f + gx)}$, cum variabili x ejusdemque functionibus rationalibus quocunque modo connexas, continuerit.

$$x = \frac{fz^2 - a}{b - gz^2}; \quad \varepsilon x = \frac{2(bf - ag)z \varepsilon z}{(b - gz^2)^2};$$

$$\sqrt{(a + bx)} = \frac{z\sqrt{(bf - ag)}}{\sqrt{(b - gz^2)}}; \quad \sqrt{(f + gx)} = \frac{\sqrt{(bf - ag)}}{\sqrt{(b - gz^2)}};$$

$$\text{pro } z = \frac{\sqrt{(a + bx)}}{\sqrt{(f + gx)}} = \frac{\sqrt{(a + bx)(f + gx)}}{f + gx}.$$

Novus enim exponens differentialis continebit unicam functionem irrationalem $\sqrt{(b - gz^2)}$, de cujus eliminatione superius est actum.

359. Problema.

Datum exponentem differentialem $X \varepsilon x$, si is completam integrationem non admittit, integrare per seriem infinitam.

Solutio.

Explicetur functio X , secundum principia primi capitis, per seriem formae $Ax^a + Bx^b + Cx^c + \text{etc.}$, ut fiat $X \varepsilon x = (Ax^a + Bx^b + Cx^c + \text{etc.}) \varepsilon x$; deinde fiat integratio per (249. §.): obtinebitur pro quaesito integrali $\int X \varepsilon x$ series in infinitum excurrent, quae idcirco, quia tota haberi non potest, perfectum integrale haud dabit, quotquot ejus termini sumantur. Clarum tamen est, adproximari posse hac via ad verum integrale, quod in adplicatione calculi integralis aequè est utile, et necessarium, ac

adproximare ad radices numerorum, quorum perfectae radices nequeunt assignari.

360. Corollarium 1.

Si functio $X = \sqrt{(ax^m + bx^n)} = (ax^m + bx^n)^{\frac{1}{2}}$ juxta (54. §.) explicetur per seriem, obtinebitur per (249. §.) sequens notatu dignum integrale.

$$\begin{aligned} \int \varepsilon x \sqrt{(ax^m + bx^n)} = \\ = 2 \left(\frac{a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{m+2}{2}}}{m+2} + \frac{b x^{\frac{2n-m+2}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}(2n-m+2)} - \frac{1 \cdot b^2 x^{\frac{4n-3m+2}{2}}}{2 \cdot 4a^{\frac{3}{2}}(4n-3m+2)} \right. \\ + \frac{1 \cdot 3 b^3 x^{\frac{6n-5m+2}{2}}}{2 \cdot 4 \cdot 6a^{\frac{5}{2}}(6n-5m+2)} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 b^4 x^{\frac{8n-7m+2}{2}}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8a^{\frac{7}{2}}(8n-7m+2)} \\ + \dots \\ \left. + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2r-3) b^r x^{\frac{2rn-(2r-1)m+2}{2}}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \dots 2r \cdot a^{\frac{2r-1}{2}}(2rn-(2r-1)m+2)} \right) + C. \end{aligned}$$

Terminus ultimus, utpote *rtus*, dabit singulos, post primum ordine sequentes, terminos, si loco *r* termini seriei 1, 2, 3, 4, 5, etc. successive substituantur.

361. Corollarium 2.

Et si $X = (ax^m + bx^n)^{-\frac{1}{2}}$ explicetur per seriem (55. §.); obtinebitur per (249. §.) sequens integrale.

$$\begin{aligned} \int \frac{\varepsilon x}{\sqrt{(ax^m + bx^n)}} = \\ = 2 \left(\frac{-1}{(m-2)a^{\frac{1}{2}} x^{\frac{m-2}{2}}} + \frac{1 \cdot b}{2(3m-2n-2)a^{\frac{3}{2}} x^{\frac{3m-2n-2}{2}}} \right. \\ - \frac{1 \cdot 3 b^2}{2 \cdot 4(5m-4n-2)a^{\frac{5}{2}} x^{\frac{5m-4n-2}{2}}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 b^3}{2 \cdot 4 \cdot 6(7m-6n-2)a^{\frac{7}{2}} x^{\frac{7m-6n-2}{2}}} \\ - \dots \\ \left. + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2r-1) b^r}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2r(2r+1)m-2rn-2)a^{\frac{2r+1}{2}} x^{\frac{(2r+1)m-2rn-2}{2}}} \right) + C. \end{aligned}$$

Scho-

Scholion 1.

Nonnunquam commodius perficitur adproximatio, si, assumtis indeterminatis coefficientibus A, B, C, D , etc. ipsum integrale quaesitum $\int X \varepsilon x$ ponatur aequari seriei $Ax + Bx^2 + Cx^3 + Dx^4 + \text{etc.}$, aut alteri formae similis, deinde ex aequatione per differentiationem producta, $X \varepsilon x = \varepsilon x (A + 2Bx + 3Cx^2 + 4Dx^3 + \text{etc.})$ valores pro A, B, C, D , etc. secundum principia primi capitis determinentur. Saepenumero etiam, inventa aequatione $X = A + 2Bx + 3Cx^2 + 4Dx^3 + \text{etc.} = S$, logarithmi $\log X = \log S$ utilissime capiuntur, unde ulteriori differentiatione aequatio $\frac{\varepsilon x}{X} = \frac{\varepsilon S}{S}$ derivabitur, quae quaesitos valores A, B, C, D , etc. debet proderere.

Haec methodus quaerendi aequationem pro determinatione valorum, quos coefficientes indeterminati debent obtinere, tunc praecipue notabili compendio calculi potest adhiberi, si functio X in dato exponente differentiali $X \varepsilon x$ potentias polynomiorum complectatur.

E. gr. Si u, v sint certae functiones variabilis x , petaturque integrale exponentis differentialis $\frac{u^m}{v^n} \varepsilon x$, quod seriei $Ax + Bx^2 + Cx^3 + Dx^4 + \text{etc.}$ aequari debeat: cum eo ipso fiat $\frac{u^m}{v^n} = A + 2Bx + 3Cx^2 + 4Dx^3 + \text{etc.}$, posita hac serie $= S$, erit

$$\frac{u^m}{v^n} = S, \text{ hinc } \log \frac{u^m}{v^n} = \log S; \text{ seu}$$

$$m \log u - n \log v = \log S: \text{ igitur debet esse}$$

$$\frac{m \varepsilon u}{u} - \frac{n \varepsilon v}{v} = \frac{\varepsilon S}{S},$$

unde valores coefficientium A, B, C, D , etc. quaeri poterunt.

Scholion 2.

Haec vero per coefficientes indeterminatos integrandi methodus (I. Schol.) id habet incommodi, quod, nisi exponentes variabilis x certa lege crescant, aut decrescant, inaniter permulti coefficientes introducantur: sic e. gr. si ponas $\int \frac{x^x}{1-x^5+x^7} = Ax + Bx^2 + Cx^3 + Dx^4 + Ex^5 + Fx^6 + \text{etc.}$; invenies $A=1, B=0, C=0, D=0, E=0$. Quocirca,

ut id vitetur, consultum erit, dum non facile perspicitur, qua lege exponentes sese excipere debeant, eos interea indeterminatos relinquere, atque ex finali aequatione, unde jam valores ipsorum coefficientium elicendi fuerint, ita determinare, ut ad illos principia in (28. 29. §.) stabilita possint adplicari. Ceterum, prouti in (316. §. 2. Schol.) tacite monui, nunquam hac aut alia methodo integrandi per series in indefinitum excurrentes utemur, si alia via superest, qua completum integrale dati exponentis differentialis per quamcunque demum functionem, algebraicam, logarithmicam, trigonometricam, aut mixtam, invenire licet: ubi vero ad ejusmodi methodum refugiendum fuerit, curabimus, ut series, terminis sequentibus continuo decrefcentibus, convergant, divergentesque series, in quibus sequentes termini sunt majores praecedentibus, omni casu vitabimus. Quo enim magis convergit series, quaesito integrali aequata, eo pauciores termini primi sufficiunt ad integrale prope verum exhibendum. Ex hac potissimum ratione seriebus formae $Ax^a + Bx^b + Cx^c + \text{etc.}$ aliae series formae generalis $Ax^a(\alpha + \beta x^n)^p + Bx^b(\alpha + \beta x^n)^q + \text{etc.}$ in multis disquisitionibus possunt substitui, cujus integrandi methodi exempla in sequentibus occurrent.

CAPUT VII.

DE

INTEGRATIONE EXPONENTIUM AEQUATIONUM.
 QUE DIFFERENTIALIUM PRIMI ALTIORISQUE
 ORDINIS PLURES VARIABLES COM-
 PLECTENTIUM.

362. DEFINITIO.

Integratio exponentis differentialis εy involventis duas aut plures variables u, v, z , earumque exponentes differentiales $\varepsilon u, \varepsilon v, \varepsilon z$, absolvitur inventionem functionis $Z + C$ variabilium u, v, z , cujus ratio differentialis determinata per (142. §.) habet exponentem dato εy aequalem, atque haec functio $Z + C$, in qua C denotat constantem indeterminatam, vocatur *completum integrale* exponentis differentialis εy . Integrale ejusmodi licebit aut simpliciter signo $\int \varepsilon y$, vel signo $\int \varepsilon y$ exprimere: quocirca poterit signum $\int \varepsilon y$, et quodvis ei simile, indicare integrale exponentis differentialis εr spectati instar unius functionis solius variabilis r , licet fors V alias praeterea variables et earum exponentes differentiales complectatur.

Sic e. gr. pro $\varepsilon u = zx^2 \varepsilon x$, et $\varepsilon v = z^2 \varepsilon z \varepsilon x$ erit

$$\int \varepsilon u = \int zx^2 \varepsilon x = \frac{1}{3}zx^3, \text{ et } \int \varepsilon v = \int z^2 \varepsilon z \varepsilon x = \frac{1}{3}z^3 \varepsilon x.$$

363. Corollarium 1.

Nullus exponens differentialis εy involvens duas variables u, v erit per se integrabilis, nisi is aequetur certae functioni variabilium u, v formae $M \varepsilon u + N \varepsilon v$, in qua sit $v \varepsilon M \varepsilon u = u \varepsilon N \varepsilon v$ (145. 362. §.).

364. Corollarium. 2.

Dato autem exponente differentiali $\varepsilon y = M \varepsilon u + N \varepsilon v$, in quo sit $v \varepsilon M \varepsilon u = u \varepsilon N \varepsilon v$, captoque integrali $\int M \varepsilon u$ (362. §.), quod differentiatum pro utraque variabili u, v per (142. §.) det exponentem $\varepsilon \int M \varepsilon u = M \varepsilon u + n \varepsilon v$, ita ut sit $v \varepsilon M \varepsilon u = u \varepsilon n \varepsilon v$ (145. §.); erit $u \varepsilon (N - n) = 0$,

adeoque $N - n$ aut quantitas constans, aut aliqua functio solius variabilis v , carens variabili u : omnis ergo exponens differentialis $\varepsilon y = M\varepsilon u + N\varepsilon v$, in quo fuerit $v\varepsilon M\varepsilon u = {}^u\varepsilon N\varepsilon v$, habebit pro integrali completo (362. §.) sequentem functionem.

$$y = {}^u\int M\varepsilon u + {}^v\int(\varepsilon y - {}^{uv}\varepsilon. {}^u\int M\varepsilon u) + C = \\ = {}^u\int M\varepsilon u + {}^v\int\left(N - \frac{{}^{v\varepsilon}. {}^u\int M\varepsilon u}{\varepsilon v}\right)\varepsilon v + C.$$

365. Corollarium 3.

Si detur exponens differentialis ${}^{uvz}\varepsilon y$ involvens tres variables u, v, z , non erit is per se integrabilis, nisi sub forma $U\varepsilon u + V\varepsilon v + Z\varepsilon z$, in qua sit $v\varepsilon U\varepsilon u = {}^u\varepsilon V\varepsilon v$, $z\varepsilon U\varepsilon u = {}^u\varepsilon Z\varepsilon z$, $z\varepsilon V\varepsilon v = {}^v\varepsilon Z\varepsilon z$ (149. 362. §.).

366. Corollarium 4.

Quodsi vero in exponente differentiali trium variabilium formae $\varepsilon y = U\varepsilon u + V\varepsilon v + Z\varepsilon z$ sit $v\varepsilon U\varepsilon u = {}^u\varepsilon V\varepsilon v$, $z\varepsilon U\varepsilon u = {}^u\varepsilon Z\varepsilon z$, $z\varepsilon V\varepsilon v = {}^v\varepsilon Z\varepsilon z$, capto integrali ${}^u\int U\varepsilon u$ (362. §.) quod differentiatum pro omnibus variabilibus u, v, z , dabit certum exponentem differentialem ${}^{uvz}\varepsilon. {}^u\int U\varepsilon u = U\varepsilon u + P\varepsilon v + Q\varepsilon z$, ita ut sit $v\varepsilon U\varepsilon u = {}^u\varepsilon P\varepsilon v$, $z\varepsilon U\varepsilon u = {}^u\varepsilon Q\varepsilon z$, $z\varepsilon P\varepsilon v = {}^v\varepsilon Q\varepsilon z$ (149. §.); erit eo ipso $\varepsilon y - {}^{uvz}\varepsilon. {}^u\int U\varepsilon u = (V - P)\varepsilon v + (Z - Q)\varepsilon z$, et $z\varepsilon(V - P)\varepsilon v = {}^v\varepsilon(Z - Q)\varepsilon z$, existente ${}^u\varepsilon(V - P) = 0$, et ${}^u\varepsilon(Z - Q) = 0$, adeoque tam functione $V - P$ quam $Z - Q$ carente variabili u : integrale completum ejusmodi exponentis differentialis εy comprehendetur ergo sequenti formula (362. §.), cujus pars prima per praecepta praecedentium capitum, pars altera vero per (364. §.) est perfecte determinabilis.

$$y = {}^u\int U\varepsilon u + {}^{vz}\int(\varepsilon y - {}^{uvz}\varepsilon. {}^u\int U\varepsilon u) + C.$$

367. Corollarium 5.

Semper ergo, dum exponentes differentiales, involventes duas tresve variables earundemque exponentes differentiales, fuerint integrandi (362. §.), dispiciatur ante omnia, utrum ii sint per se integrabiles (363. 365. §.); tum, si sint per se integrabiles, quaerantur illorum integralia juxta (364. 366. §.): sic enim, ut per se patet, integratio illorum reducitur ad integrationem exponentium differentialium unicam variabilem involventium, de qua in praecedentibus capitibus est actum.

368. DEFINITIO.

Aequatio differentialis primi ordinis, vel simpliciter *Aequatio differentialis* vocabitur in sequentibus omnis aequatio inter duas aut plures variables u, v, z , earumque exponentes differentiales $\varepsilon u, \varepsilon v, \varepsilon z$; aequatio autem inter variables u, v, z , carens exponentibus differentialibus harum variabilium, vocatur *Integrale datae aequationis differentialis*, si illa per (141. §.) differentiatâ restituat datam aequationem differentialem. Omnis porro aequatio differentialis formae $M\varepsilon u + N\varepsilon v + O\varepsilon z = 0$ erit *homogenea*, vel *heterogenea*: primum, si M, N, O sint totidem homogeneae ejusdemque dimensionis functiones variabilium u, v, z (12. 8. §.); alterum, si alterutrum aut utrumque horum desit. Dicentur demum variables u, v, z in aequatione differentiali $M\varepsilon u + N\varepsilon v + O\varepsilon z = 0$ *separatae* esse aut *permixtae*: primum, si M complectatur solam variabilem u , adeoque careat variabilibus v, z , N solam variabilem v , et O solam z ; alterum vero, si aliquis factorum M, N, O involvat variabilem ab illa, in cujus exponentem differentialem is ductus est, distinctam.

369. Corollarium 1.

Omnis aequatio differentialis potest induere formam aequationis $\psi = 0$: completum vero ejus integrale, denotante C constantem indeterminatam, erit $Z = C$, si exponens differentialis functionis Z per (141. §.) pro omnibus variabilibus, quae in $\psi = 0$ continentur, determinatus exaequet functionem differentialem ψ (368. §.).

370. Corollarium 2.

Dato integrali $Z = \int \varepsilon y$ exponentis differentialis εy duas tresve variables involventis, sumtaque constante indeterminata C , erit $Z = C$ integrale completum aequationis differentialis $\varepsilon y = 0$ (369. 362. §.).

371. Corollarium 3.

Criterium generale integrabilitatis omnium aequationum differentialium $M\varepsilon u + N\varepsilon v = 0$ inter duas variables u, v in eo consistet, ut sit ${}_v\varepsilon M\varepsilon u = {}_u\varepsilon N\varepsilon v$: nulla enim aequatio differentialis hujus generis erit per se integrabilis, quae hac proprietate destituitur (368. 145. §.); quaecunque vero aequatio differentialis habuerit hanc proprietatem, erit illa eo ipso per se integrabilis, actuque integrabitur, si quaeratur integrale $Z = \int (M\varepsilon u + N\varepsilon v)$ per (364. §.), tum fiat $Z = C$ (370. §.).

372. Corollarium 4.

Et criterium integrabilitatis aequationum differentialium $U_{\varepsilon}u + V_{\varepsilon}v + Z_{\varepsilon}z = 0$ inter tres variables u, v, z consistet in relationibus ${}^v_{\varepsilon}U_{\varepsilon}u = {}^u_{\varepsilon}V_{\varepsilon}v$, ${}^z_{\varepsilon}U_{\varepsilon}u = {}^u_{\varepsilon}Z_{\varepsilon}z$, ${}^z_{\varepsilon}V_{\varepsilon}v = {}^v_{\varepsilon}Z_{\varepsilon}z$: aequatio nimirum differentialis non erit per se integrabilis, nisi singulae hae relationes in ea locum habeant (368. 149. §.): quoties vero proposita fuerit aequatio differentialis singulas has relationes offerens; toties erit ea per se integrabilis, eritque ejus integrale completum $Z = C$, si $Z = f(U_{\varepsilon}u + V_{\varepsilon}v + Z_{\varepsilon}z)$ per (366. §.) determinetur (370. §.).

373. Corollarium 5.

Omnis aequatio differentialis $M_{\varepsilon}u + N_{\varepsilon}v = 0$, vel $M_{\varepsilon}u + N_{\varepsilon}v + O_{\varepsilon}z = 0$, in qua variables sunt separatae (368. §.), debet esse per se integrabilis, ita ut integrale completum prioris sit $\int M_{\varepsilon}u + \int N_{\varepsilon}v = C$, et $\int M_{\varepsilon}u + \int N_{\varepsilon}v + \int O_{\varepsilon}z = C$ posterioris (371. 372. §.).

374. Corollarium 6.

Si aequatio $M_{\varepsilon}u + N_{\varepsilon}v = 0$, quae dat $\frac{\varepsilon u}{\varepsilon v} = -\frac{N}{M}$, non sit arbitraria, sed in resolutione cujuspiam problematis legitimo ratiocinio determinata; necesse est, ut ea certae functioni $y = C$ variabilium u, v respondeat, pro qua debet necessario extare aequatio aliqua differentialis $P_{\varepsilon}u + Q_{\varepsilon}v = {}^{uv}_{\varepsilon}y = 0$, ita ut sit ${}^v_{\varepsilon}P_{\varepsilon}u = {}^u_{\varepsilon}Q_{\varepsilon}v$ (145. §.): igitur erit etiam $\frac{\varepsilon u}{\varepsilon v} = -\frac{Q}{P}$, hinc $\frac{N}{M} = \frac{Q}{P}$; proinde vel est $N = Q$ et $M = P$, hinc quoque ${}^v_{\varepsilon}M_{\varepsilon}u = {}^u_{\varepsilon}N_{\varepsilon}v$, vel debet dari tertia quaequam functio F variabilium u, v , pro qua fieret $NF = Q$ et $MF = P$, hinc ${}^v_{\varepsilon}.MF_{\varepsilon}u = {}^u_{\varepsilon}.NF_{\varepsilon}v$.

375. Corollarium 7.

Quamobrem omnis aequatio differentialis $M_{\varepsilon}u + N_{\varepsilon}v = 0$, ad quam in resolutione alicujus problematis legitimo ratiocinio fuerit perventum, debebit esse per se integrabilis, aut, si non sit per se integrabilis, possibilis erit factor F , ex quo et data aequatione nasceretur aequatio identica $MF_{\varepsilon}u + NF_{\varepsilon}v = 0$ per se integrabilis (371. 374. §.).

376. Corollarium 8.

Quaevīs aequatio homogēnea (368. §.) $M\epsilon u + N\epsilon v = 0$ variables u, v permixtas involvens est talis indolis, ut illa simplici substitutione novae variabilis $z = \frac{v}{u}$ in aequationem identicam variables u, z separatas involventem, adeoque per (373. §.) integrabilem possit transformari. Cum enim in hac hypothēsi M, N sint functiones variabilium u, v et homogēnae et ejusdem puta m tae dimensionis (368. §.); necesse utique est, ut pro $v = uz$, hinc $\epsilon v = u\epsilon z + z\epsilon u$, M, N abeant in producta Pu^m, Qu^m ex certis functionibus P, Q solius variabilis z in potentiam u^m , dataque aequatio differentialis abeat in $Pu^m\epsilon u + Qu^m(u\epsilon z + z\epsilon u) = 0$, ex qua nascitur sequens aequatio differentialis variables u, z separatas complectens (368. §.), ejusque integralis per (373. §.).

$$\frac{\epsilon u}{u} + \frac{Q\epsilon z}{P+Q}z = 0; \quad 1u + \int \frac{Q\epsilon z}{P+Q}z = C.$$

377. Corollarium 9.

Hoc modo poterit quoque aequatio homogēnea $M\epsilon u + N\epsilon v + O\epsilon z = 0$ involvens tres variables permixtas u, v, z (368. §.) transformari in aliam, quae unam variabilem a reliquis duabus separatam complectatur, quo ipso ejus integratio ad integrationem exponentis differentialis involventis duas variables (362. §.) reducitur. Si enim M, N, O sint functiones homogēnae m ti ordinis (368. 12. 8. §.), et fiat $v = u\phi, z = u\mu$, hinc $\epsilon v = u\epsilon\phi + \phi\epsilon u, \epsilon z = u\epsilon\mu + \mu\epsilon u$; necesse est, ut pro his valoribus functiones M, N, O abeant in producta Pu^m, Qu^m, Ru^m pro certis functionibus P, Q, R , variabilium ϕ, μ carentibus tertia variabili u ; data autem aequatio convertetur in $Pu^m\epsilon u + Qu^m(u\epsilon\phi + \phi\epsilon u) + Ru^m(u\epsilon\mu + \mu\epsilon u) = 0$, ex qua sequens prodit aequatio differentialis;

$$\frac{\epsilon u}{u} + \frac{Q\epsilon\phi + R\epsilon\mu}{P+Q\epsilon\phi + R\epsilon\mu} = 0.$$

378. Corollarium 10.

Licet ergo aliqua aequatio differentialis non sit per se integrabilis (371. 372. §.), inde nondum sequitur, eam absolute non esse integrabilem; fieri enim potest, ut certo modo transformata reddatur per se integrabilis, sicut e. gr. omnis aequatio homogēnea in (376. §.).

379. Problema.

Integrare datam quamcunque aequationem differentialem $M\varepsilon u + N\varepsilon v = 0$.

Solutio.

1. Ante omnia dispiciatur, utrum ea sit per se integrabilis, et si est per se integrabilis, quaeratur ejus aequatio integralis per (371. §.).

2. Quodsi vero data aequatio differentialis non sit per se integrabilis (371. §.), videatur, an non certis artificiis ita possit transformari, ut eo ipso reddatur per se integrabilis (378. §.): generales regulae in eum finem nullae possunt praescribi; particulares autem methodi, quae in specialibus casibus succedunt, usu optime discuntur. Ceterum constat ex praecedentibus, omnem aequationem differentialem per se non integrabilem vel homogeneam esse vel heterogeneam; omnem porro aequationem homogeneam per (376. §.) posse reddi integrabilem, unde elucet, solas aequationes heterogeneas superesse, pro quibus desiderantur artificia, ope quorum eae reddi queant integrabiles.

3. Quare videatur, an non data aequatio heterogenea sic sit comparata, ut aut, retentis variabilibus u, v , vulgaribus operationibus algebraicis, aut substitutione novae cujuspiam variabilis sic possit transformari, ut transformata vel variables separatas complectatur, vel saltem sit homogenea: casu enim primo erit ea per (373. §.) integrabilis; et casu altero per (376. §.). Nonnunquam licebit factorem F quaerere, qui propositam aequationem haeterogeneam, si ea per illum multiplicetur, reddat per (371. §.) integrabilem (375. §.).

4. In desperatis casibus quaeratur series, quae variabilem u per alteram v ita exprimat, ut ea datae aequationi differentiali satisfaciat. Eapropter fingatur esse $u = A v^\alpha + B v^{\alpha+1} + C v^{\alpha+2} + \text{etc.}$, hinc $\varepsilon u = (\alpha A v^{\alpha-1} + (\alpha+1) B v^\alpha + (\alpha+2) C v^{\alpha+1} + \text{etc.}) \varepsilon v$, tum substituantur hi valores loco u et εu in data aequatione $M\varepsilon u + N\varepsilon v = 0$: hac enim ratione obtinebitur aequatio, ex qua, valore exponentis α rite determinato, valores coefficientium indeterminatorum A, B, C , etc. per (28. vel 29. §.) poterunt derivari.

380. Corollarium I.

Exemplum aequationum heterogenearum per se non integrabilium (371. §.), quae simplici substitutione novae variabilis in aequationes identicas imme-

immediate per (373. §.) integrabiles possunt transformari (379. §. 3. n.), offert aequatio $A\varepsilon u + m(Bu + Cv)\varepsilon u - D\varepsilon v + n(Bu + Cv)\varepsilon v = 0$: haec enim, pro $Bu + Cv = z$, hinc $\varepsilon v = \frac{\varepsilon z - B\varepsilon u}{C}$, abit in sequentem aequationem differentialem, cujus integrale completum, ut sequitur, per (373. §.) licuit determinare.

$$\varepsilon u + \frac{(nz - D)\varepsilon z}{AC + BD + (mC - nB)z} = 0.$$

$$\text{Const} = u + \frac{n(AC + BD + (mC - nB)z)}{(mC - nB)^2}$$

$$- \frac{D(mC - nB) + n(AC + BD)}{(mC - nB)^2} \log(AC + BD + (mC - nB)z).$$

381. Corollarium 2.

Unicus casus in (380. §.) debet excipi, nimirum quo fit $mC = nB$, adeoque $m = \frac{nB}{C}$: hoc autem casu determinato, ob $(mC - nB)z = 0$,

habebimus in (380. §.) $\varepsilon u + \frac{(nz - D)\varepsilon z}{AC + BD} = 0$, adeoque per (373. §.) erit

aequatio integralis

$$u + \frac{n(Bu + Cv)^2 - 2D(Bu + Cv)}{z(AC + BD)} = \text{Const.}$$

aequationis differentialis

$$A\varepsilon u + \frac{nB}{C}(Bu + Cv)\varepsilon u - D\varepsilon v + n(Bu + Cv)\varepsilon v = 0.$$

382. Corollarium 3.

Exemplum autem aequationum heterogenearum per se non integrabilium (371. §.), quae simili substitutione in aequationes homogeneas per (376. §.) integrabiles possunt transformari (379. §. 3. n.) habemus in aequatione $(A + Bu + Cv)\varepsilon u - (D + Eu + Fv)\varepsilon v = 0$: si enim ponatur $A + Bu + Cv = \varphi$ et $D + Eu + Fv = \mu$, hinc

$$\varepsilon u = \frac{F\varepsilon\varphi - C\varepsilon\mu}{BF - CE}; \quad \varepsilon v = \frac{B\varepsilon\mu - E\varepsilon\varphi}{BF - CE};$$

abibit data aequatio in homogeneam identicam $(F\varphi + E\mu)\varepsilon\varphi - (B\mu + C\varphi)\varepsilon\mu = 0$ (368. §.), ex qua pro $z = \frac{\varphi}{\mu} = \frac{A + Bu + Cv}{D + Eu + Fv}$ per

(376. §.) obtinetur sequens aequatio integralis, complectens integrale per (373. §.) determinabile.

$$\log \mu + \int \frac{(E + Fz) \varepsilon z}{Fz^2 + (E - C)z - B} = \text{Const.}$$

Notetur tamen casus, quo fit $BF = C^2$, adeoque $BF - CE = 0$ in expressionibus pro $\varepsilon u, \varepsilon v$: hoc enim casu abit data aequatio in $A\varepsilon u + (Bu + Cv)\varepsilon u - D\varepsilon v - \frac{F}{C}(Bu + Cv)\varepsilon v = 0$, quae per (380. 381. §.) est integrabilis.

383. Corollarium 4.

Exemplum porro aequationum heterogenearum per se non integrabilium (371. §.), quarum conditiones a priori licet determinare, sub quibus illae in homogeneas per (376. §.) integrabiles possint transformari (379. §. 3. n.), exhibet aequatio $(u^a v^b + u^c v^d)\varepsilon u + u^e v^f \varepsilon v = 0$. Si enim in hac ponatur $v = z^n$, obtinebitur aequatio $(u^a z^{ab} + u^c z^{nd})\varepsilon u + nu^e z^{n(f+1)-1} \varepsilon z = 0$, quae eo duntaxat casu erit homogenea, si fuerit $a + nb = c + nd = e + n(f+1) - 1$ (368. 12. 8. §.), adeoque $(d - f - 1)(a - c) = (e - c - 1)(d - b)$, et $n = \frac{a - c}{d - b}$, unde sequitur: omnem aequationem heterogeneam $(u^a v^b + u^c v^d)\varepsilon u + u^e v^f \varepsilon v = 0$, in qua est $(d - f - 1)(a - c) = (e - c - 1)(d - b)$, transformabilem esse in homogeneam per (376. §.) integrabilem, nimirum pro $v = z^{\frac{a - c}{d - b}}$, exceptis, ut per se patet, duobus casibus, quorum primo fit $\frac{a - c}{d - b} = \frac{0}{d - b}$ pro $a = c$, et altero $\frac{a - c}{d - b} = \frac{a - c}{0}$ pro $d = b$: his autem casibus abit data aequatio in sequentes aequationes per (373. §.) integrabiles.

$$u^{a-e} \varepsilon u + \frac{v^f \varepsilon v}{v^b + v^d} = 0; \quad (u^{a-e} + u^{c-e}) \varepsilon u + v^{f-b} \varepsilon v = 0.$$

384. Corollarium 5.

Integratio datae aequationis differentialis $M\varepsilon u + N\varepsilon v = 0$ per se non integrabilis (371. §.) ope factoris (379. §. 3. n.) exigit, ut determinetur functio F , pro qua aequatio identica $MF\varepsilon u + NF\varepsilon v = 0$ fit per se integrabilis (375. §.): quare, cum in hac hypothesi debeat fieri $(M^u \varepsilon F + F^v \varepsilon M)\varepsilon u = (N^u \varepsilon F + F^v \varepsilon N)\varepsilon v$ (371. §.); habebimus sequentem aequationem,

tionem, ex qua factor F deberet elici, si is *a priori* esset determinabilis: verum non facile difficultates superaveris, quibus haec disquisitio est obnoxia.

$$F\left(\frac{v_{\varepsilon} M}{\varepsilon v} - \frac{u_{\varepsilon} N}{\varepsilon u}\right) + M \frac{v_{\varepsilon} F}{\varepsilon v} - N \frac{u_{\varepsilon} F}{\varepsilon u} = 0.$$

385. Corollarium 6.

Interea notetur casus peculiaris, quo est $\left(\frac{v_{\varepsilon} M}{\varepsilon v} - \frac{u_{\varepsilon} N}{\varepsilon u}\right): N$ certa functio folius variabilis u , carens variabili v . Cum enim in proposita aequatione $M\varepsilon u + N\varepsilon v = 0$ debeat esse $M = -\frac{N\varepsilon v}{\varepsilon u}$, si hic valor substituitur in (384. §.), obtinebitur $\frac{u v_{\varepsilon} F}{F} = U\varepsilon u$, posito $U = \left(\frac{v_{\varepsilon} M}{\varepsilon v} - \frac{u_{\varepsilon} N}{\varepsilon u}\right): N$. Quamobrem, quoties caruerit U variabili v , quo casu integrale $\int U\varepsilon u$ per ea, quae in praecedentibus sunt capitibus tradita, poterit determinari; toties erit $\log F = \int U\varepsilon u$, adeoque, sumta basi e logarithmorum naturalium, $F = e^{\int U\varepsilon u}$ factor, pro quo data aequatio differentialis $M\varepsilon u + N\varepsilon v = 0$ per se non integrabilis transformabitur in aequationem identicam $Me^{\int U\varepsilon u} \cdot \varepsilon u + Ne^{\int U\varepsilon u} \cdot \varepsilon v = 0$ per se integrabilem; ipsum autem integrale erit idcirco ob (364. §.)

$$vNe^{\int U\varepsilon u} \cdot \varepsilon v + \int \left(Me^{\int U\varepsilon u} - \frac{u_{\varepsilon} vNe^{\int U\varepsilon u} \cdot \varepsilon v}{\varepsilon u} \right) \varepsilon u = C.$$

386. Corollarium 7.

Exemplo sit aequatio differentialis $Pv\varepsilon u + Q\varepsilon u + \varepsilon v = 0$, completens functiones quascunque P, Q variabilis u carentes variabili v . Posito $M = Pv + Q$, et $N = 1$, adeoque $vNe^{\int U\varepsilon u} \cdot \varepsilon v = v e^{\int P\varepsilon u} \cdot \varepsilon v = v e^{\int P\varepsilon u}$, hinc $u_{\varepsilon} \cdot vNe^{\int U\varepsilon u} \cdot \varepsilon v = vPe^{\int U\varepsilon u} \cdot \varepsilon u$, obtinebitur per (385. §.) $ve^{\int P\varepsilon u} + \int \varepsilon u Qe^{\int P\varepsilon u} = C$ pro completo integrali illius aequationis differentialis.

387. Corollarium 8.

Per (386. §.) possunt integrari omnes aequationes differentiales formula generali $Uv\varepsilon u + Vv^2\varepsilon u + T\varepsilon v = 0$ comprehensae, modo functiones

nes U, V, T careant variabili v . Cum enim sit $\frac{U}{T} v \varepsilon u + \frac{V}{T} v^n \varepsilon u + \varepsilon v = 0$, posito $z = \frac{1}{v^{n-1}}$, obtinebitur aequatio $\varepsilon z - (n-1) \frac{U}{T} z \varepsilon u - (n-1) \frac{V}{T} \varepsilon u = 0$ per (386. §.) integrabilis, nisi fors sit $n = 1$, quo casu data aequatio differentialis abit in aequationem $\frac{U+V}{T} \varepsilon u + \frac{\varepsilon v}{v} = 0$ per (373. §.) integrabilem.

388. DEFINITIO.

Aequatio differentialis secundi ordinis, seu *Aequatio differentio-differentialis* erit in sequentibus omnis aequatio inter variables quascunque u, v, z earumque exponentes differentiales $\varepsilon^2 u, \varepsilon^2 v, \varepsilon^2 z$ secundi ordinis.

389. Corollarium 1.

Sicut exponentes differentiales $\varepsilon^2 u, \varepsilon^2 v, \varepsilon^2 z$ secundi ordinis obtinentur differentiatione exponentium differentialium $\varepsilon u, \varepsilon v, \varepsilon z$ primi ordinis; sic pro omni aequatione differentiali secundi ordinis relata ad variables u, v, z poterit cogitari aequatio differentialis primi ordinis relata ad easdem variables, e cujus differentiatione resultet aequatio differentialis secundi ordinis datae identica (388. §.).

390. Corollarium 2.

Omnes aequationes differentio-differentiales inter variables u, v in duas classes possunt distribui: ad primam classem pertinent aequationes, in quibus alterutra variabilium u vel v pro absoluta sumitur (4. §.), quo exponens differentialis $\varepsilon u = 1$ vel $\varepsilon v = 1$ fiat constans (81. §.) et differentio-differentialis aequalis nihilo, nimirum $\varepsilon^2 u = 0$ vel $\varepsilon^2 v = 0$: ad alteram vero classem possunt referri aequationes, in quibus neutra variabilium u, v sumitur pro absoluta, quae idcirco utrumque exponentem differentio-differentialem $\varepsilon^2 u, \varepsilon^2 v$ involvunt.

391. Corollarium 3.

Dum petitur aequatio inter variables u, v carens exponentibus differentialibus harum variabilium, cujus secundum differentiale idem sit cum data

data aequatione differentio - differentiali, duplici integratione est opus: *primum integrale* datae aequationis differentio - differentialis est aequatio differentialis primi ordinis, cujus differentiatio restituit datam aequationem differentio - differentialem; *secundum, integrale* datae aequationis differentio - differentialis est integrale ejus primi integralis (389. 368. §.).

392. Corollarium 4.

Est autem integratio aequationum differentialium primi ordinis semper in potestate, ita ut illa omni casu saltem per series possit perfici (379. §.): secunda integratio cujuslibet aequationis differentio - differentialis poterit ergo pro absoluta haberi, si prima illius integratio fuerit in potestate (391. §.).

393. Corollarium 5.

Ceterum facile ex haecenus dictis colligitur, integrale primum aequationis differentio - differentialis pendentis a variabilibus u, v , in qua variabilis v pro absoluta sumitur, constantem indeterminatam C & v debere involvere, ut id completum sit (391. §.).

Scholion.

Desideratur itaque methodus inveniendi prima integralia aequationum differentio - differentialium (392. §.): generalem, quae omni casu succedat, nullam habemus: quare, ne extra fines egrediamur, quos in concinendis his institutionibus debemus constituere, indicia immediatae integrabilitatis aequationum differentio - differentialium, methodumque integrandi aequationes per se integrabiles, tum nonnulla artificia breviter explanabimus, quibus aequationes differentio - differentiales per se haud integrabiles sic possunt in certis casibus transformari, ut illae eo ipso reddantur integrabiles. Insigne ejusmodi transformationum exemplum offert aequatio $x^2(a + bx^n)^2y + x(c + ex^n)y + (f + gx^n)y + x^2 = 0$, cujus integratio complures celeberrimos Analystas haecenus occupavit, a nemine vero adeo simplici, generali, perfectaue methodo pertractata est, ut ejus meditationes illis possint aequiparari, quas *Cl. Pfaff* in suis *disquisitionibus analyticis* recentissime exposuit. Verum haec interea intacta cogimur relinquere, exposituri in sequentibus, si iis opus habuerimus.

394. Problema.

Explorare, utrum aequatio differentio-differentialis formae $\epsilon^2 Z = M^2 \epsilon u + N^2 \epsilon v + P \epsilon u \epsilon v + Q \epsilon u^2 + R \epsilon v^2 = 0$ sit per se integrabilis.

Solutio.

Dispicatur, an sit $Q \epsilon u = {}^u_\epsilon M$, $R \epsilon v = {}^v_\epsilon N$, et $P \epsilon u \epsilon v = {}^v_\epsilon M \epsilon u + {}^u_\epsilon N \epsilon v$: nisi enim hae relationes inter functiones M, N, P, Q, R locum habeant, aequatio proposita non erit per se integrabilis: pro iisdem vero relationibus erit $\epsilon Z = M \epsilon u + N \epsilon v = 0$ primum integrale ejusdem aequationis (391. 392. 148. §.), ex quo per praecedent praeccepta secundum integrale $Z = C$ debet derivari.

395. Corollarium 1.

Cum sit ${}^u_\epsilon R \epsilon v = {}^u_\epsilon \cdot {}^v_\epsilon N$ in (394. §.) $= {}^v_\epsilon \cdot {}^u_\epsilon N$ (146. §.); erit in (394. §.) $P \epsilon u \epsilon v = {}^v_\epsilon M \epsilon u + \epsilon v \int {}^u_\epsilon R \epsilon v$: si ergo fuerit v variabilis absoluta, proinde $\epsilon v = 1$ constans, et $\epsilon v = 0$; debet fieri ${}^v_\epsilon P \epsilon u \epsilon v = {}^v_\epsilon M \epsilon u + {}^u_\epsilon R \epsilon v^2$.

396. Corollarium 2.

Aequatio autem $\epsilon^2 Z = 0$ in (394. §.) erit per se primo- et secundo-integrabilis, id est, tam prima quam secunda integratio ejus aequationis (391. §.) poterit citra omnem praevidiam transformationem perfici, si fuerit $Q \epsilon u = {}^u_\epsilon M$, $R \epsilon v = {}^v_\epsilon N$, et $P \epsilon u \epsilon v = 2 {}^v_\epsilon M \epsilon u = {}^v_\epsilon N \epsilon v$: erit autem ejus secundum integrale per (394. 364. §.)

$$Z = {}^u_\epsilon M \epsilon u + \int \left(N - \frac{{}^v_\epsilon \int {}^u_\epsilon M \epsilon u}{\epsilon v} \right) \epsilon v + C.$$

397. Corollarium 3.

Quodsi vero v pro variabili absoluta sumatur, quo $\epsilon v = 1$ fiat constans, et $\epsilon v = 0$, habebimus aequationem differentio-differentialem generalissimae formae $\epsilon^2 Z = M^2 \epsilon u + P \epsilon u \epsilon v + Q \epsilon u^2 + R \epsilon v^2 = 0$: omnis aequatio hujus formae, si fuerit $Q \epsilon u = {}^u_\epsilon M$, et ${}^v_\epsilon P \epsilon u \epsilon v = {}^v_\epsilon M \epsilon u + {}^u_\epsilon R \epsilon v^2$, erit per se integrabilis, primumque ejus integrale exhibebit sequens formula (394. 395. 393. §.), quae, ut expendenti patet, ita intelligenda est, ut in illa pars tertia in certis casibus possit aequari nihilo.

$$\epsilon Z = M \epsilon u + \epsilon v \int R \epsilon v + \int \left(\epsilon Z - {}^u_\epsilon (M \epsilon u + \epsilon v \int R \epsilon v) \right) + C \epsilon v = 0.$$

398. Corollarium 4.

Haec tamen indicia nequaquam demonstrant, aequationem ${}^2\varepsilon Z = 0$ (397. §.) esse quoque secundo-integrabilem: potest enim ea ob illa indicia esse per se primo-integrabilis, quin ideo sit per se etiam secundo-integrabilis (394. 397. §.). Sic e. gr. aequatio $(u^3 - v){}^2\varepsilon u + (v - 1){}^2\varepsilon u \varepsilon v + 3u^2 \varepsilon u^2 + u \varepsilon v^2 = 0$ dat $M = u^3 - v$, $P = v - 1$, $Q = 3u^2$, $R = u$, adeoque $Q \varepsilon u = {}^u\varepsilon M$, et ${}^v\varepsilon P \varepsilon u \varepsilon v = {}^v\varepsilon M \varepsilon u + {}^u\varepsilon R \varepsilon v^2$; ob has relationes est illa per se primo-integrabilis, sed non ideo per se etiam secundo-integrabilis: primum enim ejus integrale est (397. §.) aequatio differentialis $(u^3 - v){}^2\varepsilon u + v \varepsilon u \varepsilon v + C \varepsilon v = 0$, per se haud integrabilis (363. §.).

399. Corollarium 5.

Indiciis quidem, quorum ope ex relationibus inter factores M, P, Q, R colligi queat, utrum proposita aequatio differentio-differentialis formae ${}^2\varepsilon Z = M \varepsilon u + P \varepsilon u \varepsilon v + Q \varepsilon u^2 + R \varepsilon v^2 = 0$ sit per se tam primo- quam secundo-integrabilis, carere possumus (392. §.): ea tamen ex (394. 397. §.) ultro se offerunt, nimirum $Q \varepsilon u = {}^u\varepsilon M$, ${}^v\varepsilon P \varepsilon u \varepsilon v = 2 \cdot {}^v\varepsilon M \varepsilon u = 2 \cdot {}^u\varepsilon R \varepsilon v^2$.

400. Corollarium 6.

Aequatio differentio-differentialis ${}^2\varepsilon Z = M \varepsilon u + P \varepsilon u \varepsilon v + R \varepsilon v^2 = 0$ carens exponente differentio-differentiali ${}^2\varepsilon v$ variabilis absolutae v , et quadrato εu^2 exponentis differentialis variabilis u , erit per se primo-integrabilis, si fuerit ${}^u\varepsilon M = 0$, et ${}^v\varepsilon P \varepsilon u \varepsilon v = {}^v\varepsilon M \varepsilon u + {}^u\varepsilon R \varepsilon v^2$ (397. §.): debet ergo M aut constans esse quantitas, quo casu fiet ${}^v\varepsilon P \varepsilon u \varepsilon v = {}^u\varepsilon R \varepsilon v^2$, vel certa functio variabilis v , carens variabili u : omni vero casu exprimet praecedens formula (397. §.) primum illius integrale completum.

401. Corollarium 7.

Exemplo sit aequatio ${}^2\varepsilon Z = v^2(a + bv^n){}^2\varepsilon u + v(c + ev^n){}^2\varepsilon u \varepsilon v + (f + gv^n){}^2\varepsilon v^2 = 0$, in qua est $M = v^2(a + bv^n)$, $P = v(c + ev^n)$, $R = (f + gv^n)u$; hinc ${}^v\varepsilon M = (2a + (n+2)(n+1)bv^n){}^2\varepsilon v^2$; ${}^v\varepsilon P = (c + (n+1)ev^n){}^2\varepsilon v$; ${}^u\varepsilon R = (f + gv^n){}^2\varepsilon u$: ut illa ergo sit per se primo-integrabilis, debet esse (400. §.) $c + (n+1)ev^n = 2a + (n+2)(n+1)bv^n + f + gv^n$, unde pro casu ejusmodi integrabilitatis obtinemus $c = 2a + f$, et $(n+1)e = (n+2)(n+1)b + g$.

Quapropter, nisi hae relationes inter quantitates a, b, c, e, f, g, n locum habeant, aequatio $\epsilon^2 Z = 0$ non erit per se integrabilis: pro his autem relationibus facile per (397. §.) definietur ejus primum integrale $\epsilon Z = 0$, et ex hoc per praecedentia praecepta secundum (91. §.), licet aequatio $\epsilon^2 Z = 0$ non sit eo ipso per se etiam secundo. integrabilis. Si enim relationes inter a, b, c, e, f, g, n petas, pro quibus data aequatio sit per se primo- et secundo- integrabilis, debebis sumere aequationem $c + (n+1)ev^n = 4a + 2(n+2)(n+1)bv^n = 2f + 2gv^n$ per (399. §.), ex qua obtinentur relationes $c = 4a = 2f$, et $e = 2(n+2)b = \frac{2g}{n+1}$.

Exemplum.

Pro $n=1$ erit aequatio $\epsilon^2 Z = v^2(a+bv)\epsilon^2 u + v(c+ev)\epsilon u \epsilon v + (f+gv)u \epsilon v^2 = 0$ per se primo integrabilis, si fuerit $c = 2a + f$, et $2e = 6b + g$: posito igitur $c = 2a + f$, et $e = 3b + \frac{1}{2}g$, invenietur per (397. §.) pro primo integrali aequatio differentialis $\epsilon Z = v^2(a+bv)\epsilon u + v(f + \frac{1}{2}gv)u \epsilon v + C \epsilon v = 0$, quae non est per se integrabilis: hinc itaque elucet, assumptam aequationem $\epsilon^2 Z = 0$ pro illis relationibus, quae ipsam reddunt per se primo- integrabilem, non esse per se etiam secundo- integrabilem.

Ut nimirum illa sit per se primo- et secundo- integrabilis, debet esse $c = 4a = 2f$, et $e = 6b = g$: pro his autem relationibus erit per (397. §.) ejus primum integrale completum aequatio differentialis $\epsilon Z = v^2(a+bv)\epsilon u + v(f + \frac{1}{2}gv)u \epsilon v + C \epsilon v = 0$, seu $\epsilon Z = v^2(a+bv)\epsilon u + v(2a + 3bv)u \epsilon v + C \epsilon v = 0$ per (371. §.) complete integrabilis.

402. Corollarium 8.

Dum ergo integranda fuerit aequatio differentio- differentialis $\epsilon^2 \Phi = 0$ destituta criteriis integrabilitatis, quae adhuc exposuimus, videntum erit, annon ea certis artificiis in aequationem identicam $\epsilon^2 Z = 0$ possit transformari, in qua ea criteria locum habeant.

403. Problema.

Integrare aequationem differentio- differentialem $\epsilon^2 u + P \epsilon u \epsilon v + Q \epsilon u^2 + R \epsilon v^2 = 0$ pro quibuscunque factoribus P, Q, R independentibus a variabili u .

Solu-

Solutio.

1. Consideretur u instar functionis variabilis absolutae v, quae per datam aequationem determinata sit, quo pro certa functione Z independente a variabili u fiat $\varepsilon u = Z\varepsilon v$, et $\varepsilon Z = z\varepsilon v$, hinc $\varepsilon^2 u = z\varepsilon v^2$; erit factis substitutionibus $z\varepsilon v^2 + PZ\varepsilon v^2 + QZ^2\varepsilon v^2 + R\varepsilon v^2 = 0$, hinc $z = -(PZ + QZ^2 + R)$.

2. Habebimus igitur aequationem differentialem primi ordinis $\varepsilon Z + (PZ + QZ^2 + R)\varepsilon v = 0$ inter binas variables v, Z: quamobrem poterit haec aequatio saltem ope seriei cuiuspiam per praecedentia praecepta integrari: invento vero hoc integrali, eruatur ex illo expressio variabilis Z per v, atque ea loco Z substituitur in $\varepsilon u = Z\varepsilon v$, tum hinc quaeratur u per praecepta praecedentium capitum.

404. Corollarium 1.

Hoc modo (403. §.) obtinentur sequentia integralia completa (I) (II) (III) aequationum differentio-differentialium (1) (2) (3) pro quibuslibet factoribus P, Q, R independentibus a variabili u, ubi e denotat basim logarithmorum naturalium.

$$1. \varepsilon^2 u + R\varepsilon v^2 = 0. \quad I. u = B + Cv - \int \varepsilon v / R \varepsilon v.$$

$$2. \varepsilon^2 u + Q\varepsilon u^2 = 0. \quad II. u = B + \int \frac{\varepsilon v}{C + \int Q \varepsilon v}.$$

$$3. \varepsilon^2 u + P\varepsilon u \varepsilon v = 0. \quad III. u = B + \int \frac{C \varepsilon v}{\int P \varepsilon v}.$$

405. Corollarium 2.

Eo casu determinato, quo factores P, Q, R etiam a variabili v independentes, ideoque totidem quantitates constantes fuerint; habebimus ob (403. §.) sequentes aequationes: integrale in (3) potest determinari per (253. §.); ex illo autem poterit elici expressio variabilis Z per v, qua loco Z in (2) substituta, quaeri poterit u per praecepta praecedentium capitum.

$$1. \varepsilon^2 u + P\varepsilon u \varepsilon v + Q\varepsilon u^2 + R\varepsilon v^2 = 0.$$

$$2. \varepsilon u = Z\varepsilon v. \quad 3. \int \frac{\varepsilon Z}{QZ^2 + PZ + R} = C - v.$$

406. Corollarium 3.

Quodsi in specie sit $R=0$ vel $Q=0$, obtinebimus per (405. §.) sequentia integralia (I) (II) aequationum differentio-differentialium (1) (2), quidquid sint quantitates constantes P, Q, R.

$$\begin{aligned} 1. \varepsilon u + P \varepsilon u \varepsilon v + Q \varepsilon u^2 &= 0. & I. u &= B + \int \frac{C P \varepsilon v}{e - C Q} \cdot \\ & & & \text{Pe}^{Pv} \\ 2. \varepsilon u + P \varepsilon u \varepsilon v + R \varepsilon v^2 &= 0. & II. u &= B + \int \frac{C - R e}{P v} \cdot \varepsilon v. \\ & & & \text{Pe} \end{aligned}$$

407. Problema.

Integrare aequationem differentio-differentialem $\varepsilon u + P \varepsilon u \varepsilon v + Q \varepsilon u^2 + R \varepsilon v^2 = 0$ pro quibuscumque factoribus P, Q, R independentibus a variabili absoluta v.

Solutio.

Ex (403. §.) obtinebimus sequentes aequationes. Cum jam factores P, Q, R careant variabili v; poterit aequatio differentialis primi ordinis in (3) per praecepta superius tradita integrari: ex integrali porro aequationis (3) poterit exprimi Z per u, et hac expressione loco Z in (2) substituta licebit demum etiam exponentem differentialem εv in (2) per regulas in praecedentibus capitibus traditas integrare, hacque ipsa integratione determinare integrale completum datae aequationis differentio-differentialis (1).

$$\begin{aligned} 1. \varepsilon u + P \varepsilon u \varepsilon v + Q \varepsilon u^2 + R \varepsilon v^2 &= 0. \\ 2. \varepsilon v &= \frac{\varepsilon u}{Z}. & 3. Z \varepsilon Z + (P Z + Q Z^2 + R) \varepsilon u &= 0. \end{aligned}$$

408. Corollarium 1.

Hinc (407. §.) elicientur sequentes aequationes integrales (I) (II) (III) aequationum differentio-differentialium (1) (2) (3) perfecte determinatae, quidquid sint factores P, Q, R carentes variabili v.

$$\begin{aligned} 1. \varepsilon u + P \varepsilon u \varepsilon v &= 0. & I. v &= B + \int \frac{\varepsilon u}{C - \int P \varepsilon u} \cdot \\ 2. \varepsilon u + R \varepsilon v^2 &= 0. & II. v &= B + \int \frac{\varepsilon u}{\sqrt{(C - 2 \int R \varepsilon u)}} \cdot \\ & & & \int Q \varepsilon u \\ 3. \varepsilon u + Q \varepsilon u^2 &= 0. & III. v &= B + \int \frac{\varepsilon u e}{C} \cdot \end{aligned}$$

409. Corollarium. 2.

Si factores P, Q, R utraque variabili u, v careant, totidem idcirco quantitativis constantibus aequantur; habebimus ob (407. §.) sequentes aequationes, quarum tertia per (254. §.) integrata dabit expressionem variabilis Z per u; hac vero expressione in (2) substituta reddetur exponens differentialis ϵv per regulas praecedentium capitum integrabilis.

$$1. \epsilon^2 u + P \epsilon u \epsilon v + Q \epsilon u^2 + R \epsilon v^2 = 0.$$

$$2. \epsilon v = \frac{\epsilon u}{Z}.$$

$$3. \epsilon u = \frac{-Z \epsilon Z}{Q Z^2 + P Z + R}.$$

410. Corollarium 3.

Bini simpliciores casus, quorum uno est $R=0$, et altero $P=0$, seorsim notari merentur: his enim casibus nascuntur ex (409. §.) sequentes aequationes integrales (I) (II) aequationum differentio-differentialium (1) (2) pro quibuscumque quantitativis constantibus P, Q, R.

$$1. \epsilon^2 u + P \epsilon u \epsilon v + Q \epsilon u^2 = 0. \quad I. v = B + Q \int \frac{\epsilon u e^{\frac{Qu}{C - Pe}}}{C - Pe}.$$

$$2. \epsilon^2 u + Q \epsilon u^2 + R \epsilon v^2 = 0. \quad II. v = B + \sqrt{Q} \int \frac{\epsilon u e^{\frac{\epsilon u}{\sqrt{(C - R e^{\frac{2Qu}{C - Pe}})}}}}{\sqrt{(C - R e^{\frac{2Qu}{C - Pe}})}}.$$

Scholion 1.

Nonnunquam poterit integratio aequationis differentio-differentialis reduci ad integrationem unius tantum aequationis differentialis primi ordinis, si aut primi exponentes differentiales ϵu , ϵv , variabilium u, v, a quibus data aequatio dependet, aut certae variabilium u, v, vel etiam exponentium differentialis ϵu , ϵv functiones instar quantitativum variabilium considerentur, atque hae novis characteribus expressae in data aequatione substituantur.

E. gr. Si in $\epsilon^2 y = \epsilon^2 u \epsilon v + \epsilon^2 u \epsilon v$ fiat $\epsilon v = z$, hinc $\epsilon v = \epsilon z$; erit $\epsilon^2 y = \epsilon z u + \epsilon z u$; igitur $\epsilon y = z u = \epsilon v u$. In $\epsilon^2 y = \epsilon^2 u \epsilon v + \epsilon^2 u \epsilon v$ ponatur $\epsilon v = x$, $\epsilon u = z$; erit $\epsilon^2 y = x \epsilon z + z \epsilon x$; igitur $\epsilon y = z x = \epsilon u \epsilon v$.

In $\epsilon v = \frac{2u^2 \epsilon v \epsilon v - 2u \epsilon u \epsilon v^2}{u^4}$ fiat $u^2 = z$ et $\epsilon v^2 = x$; erit $2u \epsilon u = \epsilon z$, $2 \epsilon v \epsilon v = \epsilon x$; igitur $\epsilon v = \frac{z \epsilon x - x \epsilon z}{z^2}$, et $v = \frac{x}{z} = \frac{\epsilon v^2}{u^2}$.

Scholion 2.

Notet autem sibi tyro, multum esse in eo positum, ut variabilis absoluta noscatur, ad quam aequatio integranda refertur, quod quidem in applicatione calculi differentio-integralis ad resolutionem problematum mathematicorum nullam patitur difficultatem.

E. gr. Si proponatur aequatio $Ay^m \epsilon y \epsilon z = y^{\epsilon x} + \epsilon x \epsilon y$, ea haud facile integrabitur, nisi praevis scias, variabilem z absolutam, adeoque exponentem differentialem $\epsilon z = 1$ constantem esse: in hac vero hypothese erit posito $\epsilon x = v$, integrale $\int Ay^m \epsilon y \epsilon z = \int (y^{\epsilon v} + v \epsilon y)$, adeoque $\frac{A y^{m+1} \epsilon z}{m+1} = y^v + C \epsilon z = y^{\epsilon x} + C \epsilon z$.

Si in resolutione cujuspiam problematis deveniatur ad aequationem $V \epsilon y = \frac{\epsilon v \epsilon x^2 - y \epsilon y \epsilon y}{y^{\epsilon x^2}}$, non adparebit, qua ratione illius integrale possit determinari, nisi constet, variabilem $u = y \epsilon x$ pro absoluta, adeoque exponentem differentialem $\epsilon u = y \epsilon x$ pro constanti fuisse sumtum; quo casu erit utique etiam $\epsilon u^2 = y^2 \epsilon x^2$ constans, et ideo, cum sit $V \epsilon y = \frac{\epsilon y}{y^3} - \frac{\epsilon y \epsilon y}{y^2 \epsilon x^2}$, habebitur $\int V \epsilon y = \frac{\epsilon y}{y^3} - \frac{1}{y^2 \epsilon x^2} \int \epsilon y \epsilon^2 y = C - \frac{1}{2y^2} - \frac{\epsilon y^2}{2y^2 \epsilon x^2}$.

Scholion 3.

Consideratio haec variabilis absolutae, cujus primus exponens differentialis $= 1$ constans sit, maximi est momenti in negotio integrationis aequationum differentio-differentialium. Frequenter sane fiet, ut proposita aequatio differentio-differentialis dependens a quapiam variabili absoluta, quae nullo modo videtur esse integrabilis, facile integretur, si alia aliqua variabilis pro absoluta sumatur. Verum, ut haec nova variabilis absoluta rite possit determinari, necesse est, ut ante omnia data aequatio differentio-differentialis in aliam transformetur, in qua nulla variabilis sumitur pro absoluta, quod hoc modo praestabitur.

1. Data aequatio complectatur ϵu , ϵu , ϵv , denotante v variabilem absolutam, et $\epsilon v = 1$ exponentem differentialem constantem. Cum in hac hypothese spectetur u instar certae functionis variabilis v ; debet esse $\epsilon u = p \epsilon v$, et $\epsilon p = q \epsilon v$ pro quibusdam functionibus p, q variabilis v : quare, dum

dum v pro variabili absoluta sumitur, est $\epsilon^2 u = q\epsilon v^2$; si autem v non sumeretur pro variabili absoluta, fieret $\epsilon^2 u = \epsilon p\epsilon v + p\epsilon v = q\epsilon v^2 + \frac{\epsilon^2 \eta \epsilon v}{\epsilon v}$.

2. Hinc (1) sequitur, transformationem aequationis differentio-differentialis, dependentis a variabili absoluta v et a certa functione u ejus variabilis, substitutione functionis $\frac{\epsilon v \epsilon u - \epsilon u \epsilon v}{\epsilon v} = \epsilon^2 u - \frac{\epsilon^2 \eta \epsilon v}{\epsilon v}$ loco $\epsilon^2 u$ absolvi.

Scholion 4.

Quod porro ad defectum variabilis pro absoluta sumendae attinet, quo integratio datae aequationis differentio-differentialis facilius reddatur, is ingenio ejus, qui integrationem debuerit perficere, relinquendus est, cum nullum generale criterium in eum finem liceat assignare. . Notet tamen sibi tyro, aequatione differentio-differentiali per (2. Schol.) transformata non facile alium exponentem differentialem pro constanti esse sumendum, quam cujus integratio est in potestate, cum hac ipsa integratione, quantitas variabilis pro absoluta sumenda debeat determinari.


E. gr. detur integranda aequatio $V_{\epsilon v} = \frac{\epsilon v \epsilon u^3 + \epsilon u \epsilon v^3 + v \epsilon v^2 \epsilon^2 u}{2v^3 \epsilon u^3}$, in qua est v variabilis absoluta, et $\epsilon v = 1$ constans: facta transformatione per (2. Schol.) obtinebitur aequatio $V_{\epsilon v} = \frac{\epsilon v \epsilon u^3 + \epsilon u \epsilon v^3 + v \epsilon v^2 \epsilon^2 u - v \epsilon u \epsilon v^2}{2v^3 \epsilon u^3}$, in qua nulla variabilis est absoluta. Quodsi jam pars $\epsilon u \epsilon v^3 + v \epsilon v^2 \epsilon^2 u = \epsilon v^2 (\epsilon u \epsilon v + v \epsilon^2 u)$ numeratoris seorsim consideretur, illico adparet, non modo $v \epsilon u$ esse perfectum integrale factoris $\epsilon u \epsilon v + v \epsilon^2 u$, sed etiam hunc ipsum factorem fieri aequalem nihilo, si ejus integrale $v \epsilon u$ pro constanti sumatur. Quamobrem, quo simplicior reddatur expressio aequationis integrandae, sumatur $v \epsilon u$ pro constanti, seu $\int v \epsilon u$ pro variabili absoluta: erit enim $s(v \epsilon u) = \epsilon v \epsilon u + v \epsilon^2 u = 0$, et $V_{\epsilon v} = \frac{\epsilon v \epsilon u^3 - v \epsilon u \epsilon v^2}{2v^3 \epsilon u^3}$. Hinc, quia $v \epsilon u$, adeoque etiam $2v^2 \epsilon u^2$ constans est, fiet integrale $\int V_{\epsilon v} = \frac{1}{2} \int \frac{\epsilon v}{v^3} - \frac{1}{2v^2 \epsilon u^2} \int \epsilon v \epsilon^2 v = C - \frac{1}{4v^2} - \frac{\epsilon v^2}{4v^2 \epsilon u^2}$.

Scholion

Scholion 4.

Similibus methodis solet peragi integratio aequationum differentialium altiorum ordinum: quaevis enim aequatio differentialis ordinis $n+1$ exprimit ejusmodi aequationem, quae per differentiationem certae aequationis differentialis ordinis n obtenta potest censerī, quae idcirco id est respectu hujus aequationis, quod aequatio differentio-differentialis, seu aequatio differentialis secundi ordinis respectu aequationis differentialis primi ordinis. Casum simplicissimum exhibet aequatio formae $\varepsilon u = V \varepsilon v^n$, in qua v est variabilis absoluta, hinc $\varepsilon v = 1$ constans integratio ejusmodi aequationis facile perficitur, quaerendo successive exponentes differentiales εu , εu , εu , - - - - εu functionis u , ex quorum ultima determinatur ipsa functio u . Si esset $\varepsilon u = p \varepsilon v^r$, cum sit εv constans, et $\varepsilon u = \varepsilon \cdot \varepsilon u$; deberet utique fieri $\int \varepsilon u = \varepsilon u$, et $\int p \varepsilon v^r = \varepsilon v^{r-1} / p \varepsilon v = (P+C) \varepsilon v^{r-1}$, posito $\int p \varepsilon v = P$: igitur esset $\varepsilon u = (P+C) \varepsilon v^{r-1}$, unde manifestum fit, qua ratione ex $\varepsilon u = V \varepsilon v^n$ exponentes differentiales εu , εu , - - - εu successive possint determinari: erit nimirum $\varepsilon u = (\alpha + A) \varepsilon v^{n-1}$ pro $\alpha = \int V \varepsilon v$ et constante indeterminata A : $\varepsilon u = \varepsilon v^{n-2} \int (\alpha \varepsilon v + A \varepsilon v) = (\beta + A v + B) \varepsilon v^{n-2}$ pro $\beta = \int \alpha \varepsilon v$, et constante indeterminata B : $\varepsilon u = \varepsilon v^{n-3} \int (\beta \varepsilon v + A v \varepsilon v + B \varepsilon v) = (\gamma + \frac{1}{2} A v^2 + B v + C) \varepsilon v^{n-3}$, pro $\gamma = \int \beta \varepsilon v$ et constante indeterminata C : et ita porro.

E L E M E N T A
GEOMETRIAE SUBLIMIORIS.



CAPUT VIII.

DE

GENERALIBUS QUIBUSDAM CURVARUM PROPRIETATIBUS.

411. DEFINITIO.

Generalis omnium curvarum divisio est in *curvas simplicis et duplicis curvaturae*: omnis curva, quae tota jacet in uno plano, vocatur *curva simplicis curvaturae*: omnes vero reliquae curvae sunt *curvae duplicis curvaturae*. Interea de curvis tantum simplicis curvaturae tractabimus.

412. DEFINITIO.

Si in eodem plano dentur curva ZMPX (2. Fig.) et binae rectae Fig. 2. VU, DE in puncto A sese interfecantes, atque ex A in recta VU abscindantur quaecunque partes AQ, AN, tum ex punctis Q, N ducantur rectae QP, NM parallelae alteri rectae DE; vocabuntur AQ, AN *Abscissae*, et QP, NM iis respondentes *Ordinatae* seu *Applicatae*; punctum A erit *Origo* seu *Initium abscissarum*; recta vero VU appellabitur *Linea* seu *Axis abscissarum*, et recta DE *Axis ordinarum*.

413. Corollarium.

Situs abscissae AN respectu originis A est situs abscissae AQ, et situs ordinatae QP respectu lineae abscissarum VU situs ordinatae NM e diametro oppositus: eapropter, dum in calculis abscissae AQ et ordinatae NM spectantur ut *positivae*, solent abscissae AN et ordinatae QP prioribus oppositae haberi pro *negativis*.

414. DEFINITIO.

Quaevis abscissa AQ et ordinata QP simul vocantur *Coordinatae*: hinc AQP est *Angulus coordinatarum* aequalis angulo DAV, sub quo axes coordinatarum VU, DE sese interfecant. Sunt autem coordinatae AQ, QP *orthogonae* seu *rectangulae*, vel *obliquangulae*, prout illarum angulus AQP est rectus, vel major aut minor recto.

415. DEFINITIO.

Fig. 3. Recta ab *tanget* datum alicujus curvae arcum MOX (3. Fig.) in puncto M, si ea arcui MOX ita occurrat in puncto M, ut inter ipsam et arcum nulla recta per idem punctum M possit transire; hinc vocabitur M *Punctum contactus*.

416. Corollarium 1.

Inter innumeras rectas, quae dato arcui MOX in puncto M possunt occurrere, unica tangit arcum in M: possibile quoque est, ut aliqua recta cd arcum MO curvae MOX tangat in puncto O, quin ideo etiam arcus OX ab eadem recta tangatur in O. Quamobrem dicetur curva MOX a recta cd tangi in puncto intermedio O, si recta cd utrumque arcum OM, OX adjacentem puncto O tangat in O, arcusque hi ad eandem partem illius

Fig. 4. rectae jaceant: secus enim recta cd (4. Fig.) secabit curvam MOX, licet fors uterque illius arcus MO, XO ab ea in O tangatur.

417. Corollarium 2.

Fig. 5.6.7.8. Si, sumta in puncto A rectae VU (5. 6. 7.8. Fig.) origine abscissarum, ductaque ad punctum M, in quo recta TS arcum MX tangat, ordinata orthogona MP, abscissa AP capiat incrementum PQ, novaeque abscissae AQ respondeat ordinata orthogona Qm; poterit per puncta M, m duci recta RL, quae cum tangente TS angulum $LMS = RMT$ ad punctum contactus M formet: decrescente PQ, decrescet angulus $SML = RMT$, poteritque is fieri minor dato quovis angulo (415. §.) Cum igitur angulus $SML = RMT$ aequetur differentiae angulorum RMP, TMP, quos secans RM, et tangens TM cum ordinata orthogona MP in puncto contactus M formant; evidens est, situm tangentis TM respectu ordinatae orthogonae MP ita esse determinatum, ut angulus TMP inter tangentem et ordinatam in puncto contactus aequetur limiti, ad quem, PQ continuo decrescente, angulus RMP inter secantem et ordinatam eo propius accedat, quo magis minuitur PQ (68. §.).

418. Corollarium 3.

Ex his manifestum fit, rectam, quae datum arcum in aliquo puncto M tangit, non posse cum linea abscissarum VU concurrere, quin punctum concursus T ad eandem partem ordinatae orthogonae MP, ad quam jacet origo abscissarum A, vel ad partem oppositam cadat, prout crescentibus abscissis

Fig. 5.6.7.8. AP ordinatae crescunt (5. 6. Fig.), vel decrescunt (7. 8. Fig.)

419. DEFINITIO.

Si recta TS arcum MX tangat in puncto M, lineae vero abscissarum VU occurrat in T, ducaturque ad punctum contactus M ordinata MP, et recta MN priori TS perpendicularis, atque lineae abscissarum occurrens in N; erit TM *Tangens* determinatae longitudinis; TP *Subtangens*; MN *Normalis*; et NP *Subnormalis*.

420. Corollarium 1.

Tangens cum subtangente, et normalis cum subnormali cadunt ad partes oppositas ordinatae orthogonae MP.

421. Corollarium 2.

Datis ordinata orthogona MP et angulo TMP inter tangentem TM et ordinatam MP in puncto contactus M, poterit determinari tangens

$$TM = \frac{MP}{\text{Cot TMP}}; \text{ subtangens } TP = MP \cdot \text{Tang TMP}; \text{ normalis } MN$$

$$= \frac{MP}{\text{Sin TMP}}; \text{ et subnormalis } NP = MP \cdot \text{Cot TMP}.$$

422. Corollarium 3.

Si rectae cd, ab (3. Fig.) arcum MO datae curvae tangant in punctis Fig. 3. M, O, ducanturque normales ML, ON, et chorda MO; erunt anguli cOM, aMO, LMO, NOM acuti: igitur fecabunt sese tangentes cd, ab alicubi in e, et normales alicubi in n.

423. DEFINITIO.

Angulus MnO, sub quo normales ML, ON punctis M, O dati arcus MO alicujus curvae respondentibus sese interfecant (422. §.), solet vocari *Amplitudo* arcus MO: angulus vero ceb, sub quo tangentes cd, ab ductae ad puncta O, M sese fecant (422. §.), est Angulus *inclinationis* unius tangents ad alteram.

424. Corollarium 1.

Amplitudo MnO cujusvis arcus MoO aequatur angulo inclinationis ceb tangents cO ad tangentem aM: quare, cum arcus MO post punctum contactus M versus O eo magis desleat a tangente Ma, isque idcirco eo magis curvetur in M (415. §.), quo major est angulus ceM; clarum est, curvedinem datae curvae in puncto M ita esse connexam cum amplitudine

arcus MoO , ut illa eo major debeat censerī, quae major est amplitudo MnO arcus MO determinatae longitudinis, et vicissim.

425. Corollarium 2.

Fig. 1. In circulo (1. Fig.) radii $r = AC$ erunt pro quolibet arcu PD normales punctis P, D respondentes, ipsi radii PC, DC (419. §.): quodsi ergo sit arcus $PD = A$; erit angulus $PCD = \frac{A}{r\pi}$ (5. §. 3. Schol.) amplitudo arcus $PD = A$ (423. §.).

426. Corollarium 3.

Ubicunque in dato circulo datisque circulis aequalibus sumantur arcus aequales utcunque parvi; erunt amplitudines omnium arcuum inter se aequales (425. §.): curveto igitur in quovis circulo circulisque aequalibus constans est, nimirum eadem in singulis punctis peripheriae unius circuli, peripheriarumque circulorum aequalium (424. §.).

427. Corollarium 4.

Si vero duo circuli inaequales describantur radiis r, R ; erit amplitudo cujuslibet quantumcunque parvi arcus A in circulo radii r ad amplitudinem arcus aequalis A in circulo radii R , sicut est R ad r (425. §.): quamobrem, si curvetines constantes duorum circulorum inaequalium (426. §.) inter se comparentur; debeat esse curveto in circulo radii minoris major quam in circulo radii majoris (424. §.).

428. DEFINITIO.

Fig. 3. *Circulus curvedinis* pro quocunque puncto O datae curvae $ZMOX$ (3. Fig.) vocabitur circulus, ad cujus constantem curvedinem (426. §.) curveto curvae $ZMOX$ in puncto O proxime accefferit, ita nimirum, ut differentia inter hanc et illam curvedinem minor sit, quam esset inter eandem curvae $ZMOX$ curvedinem et curvedinem constantem cujuscunque alterius majoris minorisque circuli (427. §.): radius centrumque circuli curvedinis pro puncto O datae curvae brevitatis causa appellabitur *Radius centrumque curvedinis* datae curvae in puncto O .

429. Corollarium 1.

Cognitis radiis curvedinum in duobus punctis unius curvae, aut duarum diversarum curvarum; patebit eo ipso, in quonam puncto major, in quoque minor curveto est; major erit, cujus radius minor fuerit (428. 427. §.)

430. Corollarium 2.

Quodsi ergo a puncto O versus Z sumantur quaecunque datae curvae puncta, noscanturque radii curvedinum in singulis punctis; constabit eo ipso, an curvatura a puncto O versus Z crescat continuo vel decrescat, aut alterne crescat et decrescat; et an eadem sit in punctis a dato puncto aequidistantibus (429. §.).

431. Corollarium 3.

Si in normali ON ducta ad punctum contactus O sumatur punctum t , et radio tO describi cogitetur circulus $O\alpha$ cadens intra arcum OX datae curvae, ducaturque ms tangenti cd parallela, adeoque normali ON perpendicularis; erit cd communis tangens arcus OX et circuli $O\alpha$: differentia vero inter curvaturam curvae ZOX in puncto O versus X et curvedinem constantem circuli $O\alpha$ erit eo minor, quo minor fuerit differentia inter deflexus arcus OX circuliue $O\alpha$ a communi tangente Od in regione puncti contactus O , quo minor idcirco fuerit differentia mr inter ordinatas orthogonas ms , rs arcus OX et circuli $O\alpha$ eidem quantumcunque parvae abscissae Os a puncto contactus computatae respondentes. Quapropter, si constiterit differentiam mr ejusmodi ordinarum minorem esse, quam esset differentia inter ordinatam ms arcus OX , et ordinatam ks vel us cujuscunque alterius circuli $O\beta$ vel $O\gamma$, qui majori radio gO , vel minori fO descriptus concipiatur; constabit eo ipso, circulum $O\alpha$ esse circulum curvedinis in puncto O datae curvae (428. §.); et vicissim.

432. Corollarium 4.

Sic quoque, si radio tO descriptus circulus $O\beta$ extra arcum OX cadat; erit is, ob pares rationes, circulus curvedinis in puncto O datae curvae, si differentia inter ordinatam ms arcus OX et ordinatam ks circuli $O\beta$ eidem quantumcunque parvae abscissae Os respondentem minor fuerit, quam esset differentia inter ordinatam ms arcus OX , et ordinatam rs vel vs circuli $O\alpha$ vel $O\delta$ quocunque alio radio minori fO , vel majori gO descripti; et vicissim.

433. Corollarium 5.

Quiscunque idcirco circulus radio tO descriptus fuerit circulus curvedinis in puncto O ; debet is habere arcum in regione puncti contactus O adeo vicinum arcui OX datae curvae, ut inter illum et hunc
arcum

arcum nullus circulus possit transire, seu is minori radio fO , seu majori gO describi cogitetur (431. 432. §.): ob hanc causam dicetur circulus curvæ datae curvæ in puncto O versus X osculari arcum OX ; hinc appellabitur is *circulus osculator*; ejusque radius tO *radius osculi*, vel *radius circuli osculatoris*.

434. Corollarium 6.

Circulus radio tO descriptus arcumque OX datae curvæ in O osculans tangit eundem arcum in puncto O interne vel externe (433. §.).

435. Theorema.

Si in data curva MOX fuerit summa quadratorum ordinatae ms et abscissæ Os divisa per duplam abscissam Os æqualis summæ $Z + \psi$ vel differentiae $Z - \psi$ duarum quantitatum Z, ψ , quarum prior independens sit ab abscissâ Os , posterior vero ita ab ea pendeat, ut decrescente abscissâ Os possit ψ fieri minor data quavis quantitate; erit $Z = tO$ radius circuli curvæ in puncto O , qui arcum OX tanget in puncto O interne casu primo, et externe casu secundo.

Demonstratio.

1. Per hypothesein erit $\frac{ms^2 + u^2}{2u} = Z + \psi$, hinc $ms^2 = 2Zu - u^2 + 2\psi u$ pro abscissâ $Os = u$.

2. Vel $\frac{ms^2 + u^2}{2u} = Z - \psi$, hinc $ms^2 = 2uZ - u^2 - 2\psi u$.

3. Quodsi jam radio $tO = Z$ cogitetur circulus esse descriptus, in quo abscissæ $u = Os$ respondeat ordinata $y = rs$, vel $y = ks$; erit $y^2 = 2Zu - u^2$.

4. Hinc jam patet evidenter, semper esse $ms > y$ in prima hypothesei (1), et $ms < y$ in secunda hypothesei (2): in prima hypothesei jacebit ergo arcus circularis radio $tO = Z$ descriptus alicubi in $O\alpha$ intra arcum OX datae curvæ; in secunda vero hypothesei jacebit is alicubi in $O\beta$ extra arcum OX .

5. Ponamus jam in prima hypothesei (1) præter circulum $O\alpha$ radio $tO = Z$ descriptum describi circulum $O\beta$ radio $gO = Z + \omega$, pro differentia $\omega = gt$ quantumcunque parva; respondebit in hoc circulo abscissæ $Os = u$ quadratum ordinatae $ks^2 = 2Zu + 2\omega u - u^2$.

6. Cum

6. Cum per hypothesim possit fieri $\psi < \omega$ decrefcente absciffa $u = Os$; extabunt absciffae $Os = u$ pro quibus erit $ms < ks$ in (1) (5), unde necessario fequitur, arcum circularem $O\beta$ radio $Og > Z$ descriptum in regione puncti contactus O cadere extra arcum OX datae curvae; arcum proinde $O\alpha$ radio $tO = Z$ descriptum in regione puncti contactus O adeo esse vicinum arcui OX , ut inter hunc et illum nullus alter circulus locum habeat. Verum, ut certo constet, hunc ipsum circulum $O\alpha$ esse circulum curvedinis in puncto O , demonstrari adhuc debet, extare absciffam $u = Os$, pro qua quantumcunque decrefcente fit $ms - rs < ks - ms$ (431. §.), quod hoc modo potest ostendi.

Per hypothesim extabit absciffa $u = Os$, pro qua, quantumcunque ea decrefcat, erit $\psi < \frac{\pi}{2}$; igitur, sumtis pro ms, rs, ks valoribus juxta (1) (3) (5) erit etiam $rs^2 + 2ks.rs + ks^2 > 4ms^2$, hinc $rs + ks > 2ms$, et ideo etiam $ks - ms > ms - rs$.

7. In secunda hypothesi (2), descripto circulo $O\beta$ radio $tO = Z$ ob (4), describatur circulus $O\gamma$ radio minori $Of = Ot - ft = Z - \omega$, sumta quantumcunque exigua differentia $\omega = tf$; respondebit in hoc circulo absciffae $Os = u$ quadratum ordinatae $us^2 = 2Zu - 2\omega u - u^2$.

8. Hinc, quia per hypothesim potest, decrefcente absciffa $u = Os$, fieri $\psi < \omega$, manifestum fit, extare debere absciffas u , pro quibus quantumcunque decrefcentibus fieret $us^2 < ms^2$ et $us < ms$ in (7) (2); confequenter omnem circulum radio $fO < Z$ descriptum jacere in regione puncti contactus O intra arcum OX datae curvae; et ideo circulum $O\beta$ radio $tO = Z$ extra arcum OX descriptum (4) adeo esse vicinum arcui OX in regione puncti contactus O , ut inter illum et hunc arcum nullus circulus possit cadere. Quamobrem, quo certo constet, circulum $O\beta$ fore circulum curvedinis in puncto O , ostendi adhuc debet, dari absciffas $u = Os$ in secunda hypothesi (2), pro quibus, quantumcunque eae decrefcant, semper fit $ks - ms < ms - us$.

Cum enim per hypothesim possit fieri $\psi < \frac{\pi}{2}$; erit, sumtis pro ks, ms, us valoribus ex (3) (2) (7), etiam $ks^2 + 2ks.us + us^2 < 4ms^2$, hinc $ks + us < 2ms$, et ideo $ks - ms < ms - us$.

436. Corollarium.

Cum in regione puncti contactus O extent abscissae $u=Os$, pro quibus quantumcunque decrefcentibus semper sit $ms > rs$, vel $ms < ks$ pro circulo curvedinis $O\alpha$ vel $O\beta$ radio $tO=Z$ descripto, ob (n.4.); patet evidenter, circulum curvedinis $O\alpha$, vel $O\beta$ radio $tO=Z$ descriptum nullum absolute arcum habere, quantumcunque parvus is concipiatur, qui in regione puncti contactus O cum certa parte arcus OX datae curvae coincidat, licet is huic arci adeo sit vicinus, ut inter illum et hunc nullus arcus circuli possit jacere: circulus idcirco curvedinis in puncto O eam habet naturam, ut curvedo datae curvae in puncto O versus X non sit eadem cum constanti curvedine ejus circuli, sed ad eam tantum proxime accedat, ita nimirum ut illa ad nullius alterius circuli curvedinem propius possit accedere (428. §.).

437. DEFINITIO.

Discrimen generale inter *Ramos* curvarum in eo consistit, quod aliqui sint *definitae*, alii autem *indefinitae longitudinis*, nimirum respectu datarum linearum, rectorum vel curvarum, juxta quas excurrunt. Sic ramus PX Fig. 2. (2. Fig.) dicetur *in indefinitum excurrere juxta datam rectam* VU , si is, quantumcunque producat versus U , nusquam concurrat cum recta VU : vocabitur porro recta VU *Asymptotus* rami PX , si hic juxta rectam VU in indefinitum excurrens eo propius ad illam accedat, quo magis versus U producit. Hoc modo solent concipi rami curvarum juxta ramos aliarum curvarum in indefinitum excurrentes, asymptotique curvilineae: verum de his nullibi erit sermo in sequentibus.

438. DEFINITIO.

Possibile est, ut uni eidemque abscissae in data curva una tantum ordinata, positiva vel negativa, aut plures ordinatae, omnes positivae, vel omnes negativae, aut aliquae positivae et aliae negativae, illis numero Fig. 9. aequales, vel inaequales (413. §.) respondeant. Sic e. gr. in (9. Fig.) abscissae At una respondet ordinata, positiva ts ; abscissae Ar respondent duae ordinatae, positivae rp, rq ; abscissae An respondent pariter binae ordinatae, una positiva nm , et altera negativa no ; abscissae vero Ak respondent duae ordinatae positivae kh, ki , et una negativa kl ; et abscissae Ae respondent quatuor ordinatae positivae, ea, eb, ec, ed , et duae negativae ef, eg .

Omnis

Omnis linea abscissarum vocatur generatim *Diameter* curvae, si summa ordinatarum positivarum cuius abscissae respondentium aequetur summae ordinatarum negativarum respondentium eidem abscissae. Eo autem determinato casu, quo ad extremitatem cuiusvis abscissae cuilibet ordinatae positivae respondet una ordinata negativa priori aequalis; appellatur ea *Diameter absoluta*. Diameter porro absoluta, ad quam ordinatae sunt perpendiculares, vocari solet etiam *Axis curvae*; et punctum, in quo curva ab ejus axe secatur, est *Vertex* curvae. Si denique aliqua curva binas diametros habeat, quarum quaevis sit parallela ordinatis ad aliam diametrum; erunt eae *Diametri conjugatae*.

439. DEFINITIO.

Centrum curvae est punctum, in quo omnis curvae chorda per ipsum transiens bissecatur.

440. DEFINITIO.

Dum plures alicujus curvae rami in uno puncto concurrunt, sese tangunt, aut intersecant, dicitur id, improprio quidem sensu, ex pluribus ejusdem curvae punctis *coalescere*, quae nimirum totidem ejus ramis debentur. Punctum curvae, quod ex pluribus ejusdem curvae punctis non coaluit, vocatur *simplex*; omne vero, quod ex pluribus punctis coaluit, dicitur *multiplex*, atque in specie *duplex*, *triplex*, et sic porro.

441. DEFINITIO.

Ad puncta multiplicia pertinent puncta *flexus contrarii*; puncta *re-* Fig. 4.
gressus, seu *cuspidēs* aut puncta *reflexionis*; et *nodi*. Si duo arcus MO, OX alicujus curvae ita concurrant in puncto O, ut recta cd, quae curvam in O secat, utrumque arcum MO, XO in O tangat, et, dum unus arcus MO parti cO communis tangentis cd obvertit convexitatem, eam alter arcus OX obvertat parti oppositae Od tangentis; vocabitur O punctum *flexus contrarii*. Quodsi autem uterque arcus eidem parti cO communis tangentis cd convexitatem obvertat (10. 11. Fig.); erit punctum duplex O Fig. 10. 11.
Cuspis curvae, seu *Punctum regressus*. Puncta denique, in quibus arcus curvae sese, ut in α , β (9. Fig.) intersecant, appellantur *Nodi*.

442. DEFINITIO.

Aequatio ad curvam est aequatio eam relationem inter curvae coordinatas, vel quaspiam rectas lineas angulosque variables, et constantes

quantitates (lineas vel angulos) exprimens, per quam natura curvae perfecte determinatur. Hinc desumitur divisio curvarum in *algebraicas* et *transcendentes*, prout aequationes ad illas sunt algebraicae vel transcendentes (160. §.). Curvae porro algebraicae dividuntur in diversos *Ordines*, ita ut omnis curva sit generatim *nti Ordinis*, si aequatio ad illam est *nti ordinis* (164. §.). Omnis demum curva *continua* est, seu *regularis*, vel *discontinua* seu *irregularis*: curva *continua* vocatur, cujus natura per unicam aequationem exprimitur: *discontinuae* vero curvae, quales in sequentibus haud considerabimus, appellantur, quarum variae partes per varias aequationes debent exprimi.

443. Corollarium 1.

Formula generalis omnium aequationum ad curvas inter binas quaecunque variables quantitates x, y potest esse $\alpha + \overset{x}{\phi} + \overset{y}{\mu} + \overset{xy}{\psi} = 0$, si α denotet quantitatem constantem, ϕ vero et μ sint summae omnium terminorum, in quibus sola variabilis x , vel sola y continetur, et ψ exprimat summam reliquorum terminorum, utramque variabilem x, y complectentium (442. §.).

444. Corollarium 2.

Quaevis variabilium y, x contentarum in data aequatione ad curvam, puta y , potest spectari instar certae functionis alterius variabilis x , cujus exponentes differentiales $\varepsilon y, \varepsilon^2 y, \varepsilon^3 y$, etc., ex data aequatione possint elici: primus vero exponens differentialis εy , prouti is positivus vel negativus valoris fuerit pro certa abscissa x , denotabit, ordinatas y , crescentibus abscissis, crescere vel decrescere (85. §.).

445. Problema.

Fig. 12. Data aequatione ad curvam ZMX (12. Fig.) inter ejus coordinatas orthogonas $x = AP, y = MP$, invenire aequationem ad eandem curvam inter ipsius coordinatas obliquangulas $u = AQ, z = MQ$, cognito angulo $\phi = MQA$ harum coordinatarum.

Solutio.

Cum debeat esse $y = z \sin \phi$ et $x = u - z \cos \phi$, si hos valores loco y, x substituas in data aequatione inter x, y , obtinebis aliam aequationem aequi-

aequivalentem inter u et z : semper vero erit $\text{Cof } \phi = \text{Cof } MQA$ sumendus cum signo $-$, ubi angulus $\phi = MQA$ versus originem abscissarum A fuerit obtusus.

446. Corollarium 1.

Eadem prorsus ratione, si determinata sit distantia $QA = a$ puncti Q ab origine abscissarum A , ponaturque $y = MP$, $x = AP$, $MQ = z$, $MQA = \gamma$, obtinebuntur valores $y = z \sin \gamma$, $x = a - z \text{Cof } \gamma$, pro quibus loco y , x in data ad curvam ZX aequatione inter ejus ordinatas orthogonas x , y , producet aequationem ad eandem curvam inter ordinatas $z = MQ$ sub angulis variabilibus $\gamma = MQA$ ad datum in linea abscissarum VU punctum Q convergentes, et ipsos angulos γ .

447. Corollarium. 2.

Commodissime exploratur natura curvae ope coordinatarum orthogonarum; deinceps idcirco omnes disquisitiones ad orthogonas coordinatas restringemus, eas ubique, nisi contrarium notetur, nomine ordinarum intellegendi: facile enim, ubi opus fuerit, quasvis expressiones analyticas, complectentes coordinatas orthogonas certae curvae, in alias aequivalentes, quae coordinatas obliquangulas ejusdem curvae complectantur, licet convertere (445. §.).

448. Problema.

Data aequatione ad curvam $RTMS$ (13. Fig.) inter ordinatas $x = AP$, Fig. 13. $y = MP$ pro axe abscissarum VX , invenire aequationem ad eandem curvam inter ordinatas $u = NQ$, $z = MQ$ pro alio axe Uu , cujus situs respectu axeos VX ita sit determinatus, ut noscantur, praeter angulum $XHu = \alpha$, distantiae perpendiculares $NL = b$, $Nn' = a$ novae originis abscissarum N ab axibus VX , DE .

Solutio.

1. Ductis perpendicularibus Pq , Pr ad MQ , Uu , inveniatur $Pq = y \sin \alpha$; $Mq = y \text{Cof } \alpha$; $HL = \frac{b \text{Cof } \alpha}{\sin \alpha}$; $HN = \frac{b}{\sin \alpha}$.

2. Est vero $Pr = HP \cdot \sin \phi$, $PHr = (HL + LA + AP) \sin \alpha$, et $Hr = HP \cdot \text{Cof } \phi$; per (1) fiet ergo $Pr = b \text{Cof } \alpha + a \sin \alpha + x \sin \alpha$; $Hr = \frac{b \text{Cof } \alpha^2}{\sin \alpha} + a \text{Cof } \alpha + x \text{Cof } \alpha$.

3. Debet porro esse $u = NQ = Hr - Pq - HN$, et $z = MQ = Mq + Pr$: igitur fiet per (2) $u = (a+x) \operatorname{Cof} \alpha - (y+b) \operatorname{Sin} \alpha$; $z = (y+b) \operatorname{Cof} \alpha + (a+x) \operatorname{Sin} \alpha$.

4. Ex his demum aequationibus prodibunt sequentes valores pro y , x , quos in data aequatione oportebit substituere, ut ea det aequationem inter coordinatas u , z .

$$y = z \operatorname{Cof} \alpha - u \operatorname{Sin} \alpha - b. \quad x = z \operatorname{Sin} \alpha + u \operatorname{Cof} \alpha - a.$$

449. Corollarium 1.

Quaecunque recta sumatur pro axe abscissarum datae curvae, ejusdem semper ordinis erit aequatio inter coordinatas orthogonas ejusdem curvae (448. 442. §.).

450. Corollarium 2.

Solutio praecedentis problematis ita est comparata, ut ea etiam ad casum lineae rectae RTMS possit extendi, quae, si illa lineam abscissarum VX secet sub angulo $\phi = STX$ in T, et axem ordinatarum DE in n, sitque $An = e$, $mn = AP = x$, dabit aequationem $y = e + x \operatorname{Tang} \phi$ primi ordinis: aequatio igitur ad lineam rectam RTnS erit primi ordinis pro quovis possibili axe abscissarum (449. §.).

451. Corollarium 3.

Quidquid sint coefficientes α, β, γ in aequatione generali $\alpha + \beta x + \gamma y = 0$ primi ordinis, poterit, ductis axibus coordinatarum VX, DE, sumi $An = -\frac{\alpha}{\gamma}$, et $AT = \frac{\alpha}{\beta}$: quodsi ergo ducatur per puncta n, T recta RTnS; debebit pro qualibet abscissa $x = AP$ esse ordinata $y = MP = An + Mm = -\frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\beta x}{\gamma}$, hinc $\alpha + \beta x + \gamma y = 0$. Quare, sicut aequatio ad lineam rectam semper est primi ordinis (450. §.), ita quoque omnis aequatio primi ordinis debetur alicui lineae rectae.

452. Corollarium 4.

Impossibilis est linea curva primi ordinis; quocirca curvae infimi ordinis sunt curvae secundi ordinis (451. 442. §.).

453. Problema.

Data aequatione ad curvam ZMX (5. 6. 7. 8. Fig.) inter coordinatas Fig. 5. 6. 7. 8. $x=AP$, $y=MP$, determinare angulum TMP inter tangentem TM et ordinatam MP in puncto contactus M.

Solutio.

1. Si abscissa $x=AP$ augeatur incremento $\Delta x=PQ$, adeoque ordinata $MP=y$ abeat in mQ , ducaturque per puncta m , M secans LR ; debeat cotangens anguli TMP aequari limiti, ad quem cotangens anguli RMP eo propius accedat, quo minus sit incrementum $\Delta x=PQ$ abscissae $x=AP$ (417. §.).

2. Ducta autem Mp parallela axi abscissarum VU ; erit mp incrementum (5. 6. Fig.) vel decrementum (7. 8. Fig.) ordinatae $y=MP$ debitum incremento $\Delta x=PQ$ abscissae $x=AP$: quare debeat esse per (444. 457. §.).

$$mp = \pm \left(\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} \Delta x + \frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x^2 + \alpha \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^3 + \alpha \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon x^4} \Delta x^4 + \text{etc.} \right).$$

Semper vero est (5. 6. 7. 8. Fig.) $\text{Cot. RMP} = \text{Cot Mmp} = \frac{mp}{M_p}$: igitur

$$\text{semper } \text{Cot RMP} = \pm \left(\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} + \frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x + \alpha \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^2 + \alpha \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon x^4} \Delta x^3 + \text{etc.} \right);$$

eoque ipso debeat esse ob (1) per (78. §.) $\text{Cot TMP} = \pm \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}$, adhibito signo + vel —, prout crescente abscissa $x=AP$ ordinata $y=MP$ crescit (5. 6. Fig.) vel decrescit (7. 8. Fig.).

454. Corollarium 1.

Angulus TMP in puncto contactus M inter tangentem TM et ordinatam MP ita debet determinari, ut sit $\text{Cot TMP} = \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}$: sumetur autem εy cum signis contrariis, si crescente abscissa decrescat ordinata (453. §.).

455. Corollarium 2.

Pro situ tangentis TM et normalis MN respectu ordinatae MP et lineae abscissarum VU habebimus sequentes expressiones (454. 419. §.)

Tang

$$\text{Tang NMP} = \text{Tang MTP} = \text{Cot TMP} = \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}.$$

$$\text{Tang MNP} = \text{Tang TMP} = \text{Cot MTP} = \frac{\varepsilon x}{\varepsilon y}.$$

$$\text{Sin MTP} = \text{Cof TMP} = \frac{\varepsilon y}{\sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}}.$$

$$\text{Sin TMP} = \text{Cof MTP} = \frac{\varepsilon x}{\sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}}.$$

456. Corollarium 3.

Per (455. §.) vero ex (421. §.) obtinebimus pro tangente TM, subtangente TP, normali MN, et subnormali NP sequentes expressiones.

$$\text{TM} = \frac{y}{\varepsilon y} \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}, \quad \text{TP} = \frac{y \varepsilon x}{\varepsilon y}.$$

$$\text{MN} = \frac{y}{\varepsilon x} \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}, \quad \text{NP} = \frac{y \varepsilon y}{\varepsilon x}.$$

457. Corollarium 4.

Proposita ergo aequatione ad datam curvam inter ejus coordinatas y, x , poterit tam situs tangentis, subtangentis, normalis, et subnormalis respectu ordinatae et axeos abscissarum, quam magnitudo absoluta per (85. 418. 420. 455. 456. §.) perfecte determinari: id tamen in sequenti capite uberius exponetur.

458. Corollarium 5.

Indeterminatum reliquimus in praecedentibus formulis (455. 456. §.), utrum ordinata y , an abscissa x instar variabilis absolutae sit spectanda (4. §.): ubi vero illa ad hanc, vel haec ad illam velut certa functio ad variabilem absolutam relata fuerit; poterit ubique poni $\varepsilon x = 1$ casu primo, vel $\varepsilon y = 1$ casu secundo. In (453. §.) tamen pro determinatione altiorum exponentium differentialium $\varepsilon^2 y$, $\varepsilon^3 y$, $\varepsilon^4 y$, etc. semper debet esse $\varepsilon x = 1$ (156. 157. §.).

459. Corollarium 6.

Fig. 5. 7. Ordinata mQ (5. 7. Fig.) occurrit tangenti TM productae in pun-

cto q, estque $pq = Mp. \text{Cot} Mqp = Mp. \text{Cot} TMP = \pm \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} \Delta x$, adhibito signo + vel -, prout crescentibus abscissis ordinatae pariter crescent

crescunt (5. Fig.), vel decrescunt (7. Fig.): cum igitur sub iisdem conditionibus sit $mp = \pm \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} \Delta x \pm \frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x^2 \pm \alpha \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^3 \pm \text{etc.}$ (453. §.), sitque $qm = pq - mp$ (5. Fig.), vel $qm = mp - pq$ (7. Fig.) valoris positivi pro quovis valore differentiae $\Delta x = PQ$; erit utroque casu $qm = -\frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x^2 - \alpha \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^3 - \alpha \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon x^4} \Delta x^4 - \text{etc.}$ semper valoris positivi, et ideo habebit exponentes $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x^2}$ valorem negativum (77. §.).

460. Corollarium 7.

Pari ratione reperies $pq = \pm \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} \Delta x$, et $mp = \pm \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} \Delta x \pm \frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x^2$ Fig. 6. §. $\pm \alpha \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^3 \pm \alpha \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon x^4} \Delta x^4 \pm \text{etc.}$, sumto signo + vel —, prout crescentibus abscissis AP ordinatae crescunt (6. Fig.) vel decrescunt (8. Fig.): quare, cum sit $mq = mp - pq$ in (6. Fig.), et $mq = pq - mp$ in (8. Fig.) valoris positivi pro quovis valore differentiae $\Delta x = PQ$; erit utroque casu $mq = \frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x^2 + \alpha \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^3 + \alpha \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon x^4} \Delta x^4 + \text{etc.}$ semper valoris positivi, quod est impossibile quin etiam $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x^2}$ valorem positivum habeat (77. §.).

461. Corollarium 8.

Dum curva, ad quam datur aequatio inter ejus coordinatas x, y concavitatem vel convexitatem obvertit axi abscissarum, debet esse $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x^2}$ valoris negativi casu primo, vel positivi casu secundo, et vicissim (459. 460. §.), exponente differentiali $\varepsilon^2 y$ ex data ad curvam aequatione pro $\varepsilon x = 1$ determinato (458. §.).

462. Corollarium 9.

Pars ordinatae mQ (5. 6. 7. 8. Fig.) inter curvam et tangentem inter Fig. 5. 6. 7. 8.

cepta est generatim $mq = \pm \frac{\varepsilon y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x^2 \pm \alpha \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^3 \pm \alpha \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon x^4} \Delta x^4 \pm \text{etc.}$

adhibito signo — vel +, prout curva concava est vel convexa ex parte lineae abscissarum (459. 460. §.): distantia vero puncti q a puncto contactus M erit omni casu $Mq = \sqrt{(Mp^2 + pq^2)} = \frac{\Delta x}{\varepsilon x} \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}$ ob $pq = \pm \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} \Delta x$ (459. 460. §.).

463. DEFINITIO.

Fig. 12. Pro ordinatis MQ (12. Fig.) ad datum punctum Q convergentibus (446. §.) solet ad Q duci recta S perpendicularis ordinatae MQ, quae tangenti TM productae in b, et normali MN in n occurrat, quo casu vocatur Qb *Subtangens*, et Qn *Subnormalis*.

464. Corollarium 1.

Pro $z = MQ$, $MQA = \gamma$, $x = AP$, $y = MP$, et $a = AQ$ est $y = z \sin \gamma$, $x = a - z \cos \gamma$; hinc $\varepsilon y = z \varepsilon \gamma \cos \gamma + \varepsilon z \sin \gamma$, et $\varepsilon x = z \varepsilon \gamma \sin \gamma - \varepsilon z \cos \gamma$. Est autem tang $TMQ = \frac{\varepsilon x}{\varepsilon y}$ (455. §.), et tang $PMQ = \frac{\cos \gamma}{\sin \gamma}$; adeoque tang $TMQ = \text{Tang}(TMP + PMQ) = \frac{\varepsilon x \sin \gamma + \varepsilon y \cos \gamma}{\varepsilon y \sin \gamma - \varepsilon x \cos \gamma}$ (5. §. 1. Schol.): quodsi ergo praecedentes valores in hac expressione loco $\varepsilon y, \varepsilon x$ substituantur, inveniatur sequens expressio pro tangente anguli TMQ ; hinc vero reperietur subtangens $Qb = z \text{Tang } TMQ$, et subnormalis $Qn = \frac{z}{\text{Tang } TMQ}$.

$$\text{Tang } TMQ = \frac{z \varepsilon \gamma}{\varepsilon z}. \quad Qb = \frac{z^2 \varepsilon \gamma}{\varepsilon z}. \quad Qn = \frac{\varepsilon z}{\varepsilon \gamma}.$$

465. Corollarium 2.

Angulus $MQT = \gamma$ est in assumpta figura acutus, hinc TMQ obtusus; ubi ille fuerit obtusus, fiet hic acutus: obtusum esse angulum TMQ , adeoque acutum MQA , indicabit valor $\frac{z \varepsilon \gamma}{\varepsilon z}$ tangentis anguli TMQ , si is fuerit negativus.

466. Corollarium 3.

Ducatur ex puncto Q ad tangentem TMb perpendicularis $Qr = p$; erit $p = z \sin TMQ$; quare, determinato sinu anguli TMQ per ejus tangentem (464. §.), fiet

$$p = \frac{z^2 \varepsilon \gamma}{\sqrt{(\varepsilon z^2 + z^2 \varepsilon \gamma^2)}}.$$

467. Corollarium 4.

Data aequatione ad curvam ZMX inter ordinatas $z = MQ$ sub angulis variabilibus $\gamma = MQA$ ad datum punctum Q convergentes angulosque γ , semper poterit reperiri aequatio ad eandem curvam inter ordinatam z et perpendicularum p . Cum enim fit $\frac{\varepsilon z}{\varepsilon \gamma} = \frac{z}{p} \sqrt{(z^2 - p^2)}$ in (466. §.), si praeterea ex data aequatione determinetur valor pro $\frac{\varepsilon z}{\varepsilon \gamma}$; obtinebitur ex illo et hoc valore aequatio inter z et p , excluso vel incluso angulo γ , qui hoc altero casu ex hac ipsa aequatione et data facile eliminabitur.

468. Corollarium 5.

Et vicissim, si detur aequatio ad curvam ZMX inter ordinatam $z = MQ$ et perpendicularum $p = Qr$, poterit determinari aequatio, saltem differentialis, ad eandem curvam inter z et angulum $\gamma = MQA$. Est enim $\varepsilon \gamma = \frac{p \varepsilon z}{z \sqrt{(z^2 - p^2)}}$: quod si ergo ex data aequatione inter z et p determinetur valor perpendiculari p per ordinatam z , isque substituatur in $\varepsilon \gamma$; obtinebitur aequatio inter $\varepsilon \gamma$, εz et z , unde ope calculi integralis licebit quaerere aequationem inter z et γ .

469. Problema.

Data aequatione ad curvam inter coordinatas $x = AP$, $y = MP$ (5. 6. Fig. 5. 6. Fig.), invenire exponentem differentialem arcus $\mu = ZM$ comprehensi inter ordinatam MP et aliam ZC datam in distantia CA ab origine abscissarum A .

Solutio.

Crescente abscissa $x = AP$ incremento $PQ = \Delta x$ abeat ordinata $y = MP$ in $y' = MQ$, et arcus $\mu = ZM$ in $\mu' = Zm$: cum arcus μ et ordinata y possint spectari instar duarum functionum abscissae x , si ducatur Mp parallela axi abscissarum VU , et chorda Mm ; erit $Mp = \Delta x$, $\Delta y = y' - y = mp$, et $\Delta \mu = \mu' - \mu = Mom$. Pro qualibet idcirco differentia $\Delta x = PQ$ debet esse

$$\Delta \mu > \text{chorda } Mm, \text{ et } \Delta \mu < Mq + qm.$$

Hinc, sumpta chorda $Mm = \sqrt{(\Delta y^2 + \Delta x^2)} = \frac{\Delta x}{\varepsilon x} \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)} + p \Delta x^2 + q \Delta x^3 + \text{etc.}$ pro certis coefficientibus p , q , etc. independentibus a

Δx (84. 89. §.), sumtisque praeterea valoribus pro Mq et $m q$ juxta (462. §.), erit

$$\Delta \mu > \frac{\Delta x}{\varepsilon x} \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)} + p \Delta x^2 + q \Delta x^3 + \text{etc.}$$

$$\Delta \mu < \frac{\Delta x}{\varepsilon x} \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)} \pm \frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon x^2} \Delta x^2 \pm \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x^3} \Delta x^3 \pm \text{etc.}$$

Debet itaque esse per (131. §.)

$$\varepsilon \mu = \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}.$$

470. Corollarium.

Hinc pendet *Rectificatio* datae curvae ZMX , quae inventionem arcus $\mu = ZM$ perficitur. Data nimirum aequatione ad curvam inter coordinatas y, x , quaeratur εy , substitutoque valore loco εy in expressione pro $\varepsilon \mu$, quaeratur arcus μ ope calculi integralis. Ceterum per se liquet, poni posse $\varepsilon x = 1$, vel $\varepsilon y = 1$, cum x vel y instar variabilis absolutae possit spectari.

471. Problema.

Fig. 5. 6. *Data aequatione ad curvam ZMX (5. 6. Fig.) inter coordinatas $x = AP$, $y = MP$, invenire radium curvaturae pro puncto M .*

Solutio.

1. Ductis tangente TM et normali MN ad punctum M , cogitetur abscissa $x = AP$ augeri incremento $\Delta x = PQ$, tum ducatur ordinata Qm tangenti occurrens in q , et Mp parallela axi abscissarum VU ; erit $Mp = \Delta x$, $Mq = \Delta x \sqrt{(\varepsilon y^2 + 1)} = \Delta x \varepsilon \mu$, et $m q = \pm \frac{\varepsilon^2 y}{2} \Delta x^2 \pm \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon x} \Delta x^3 \pm \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon x^2} \Delta x^4 \pm \text{etc.}$, considerata abscissa x instar variabilis absolutae, quo fiat $\varepsilon x = 1$ (462. 469. §.).

2. Sint mk , mv perpendiculares ad tangentem TM et normalem MN ; erit $Mv = mk = m q$. Sin TMP , $kq = m q \text{ Cof } TMP$: ob (1) per (455. 469. §.) habebimus ergo in hypothesi variabilis absolutae x , exponentisque $\varepsilon x = 1$.

$$Mv = \pm \frac{\varepsilon^2 y}{2 \varepsilon \mu} \Delta x^2 \pm \frac{\varepsilon^3 y}{\varepsilon \mu} \Delta x^3 \pm \frac{\varepsilon^4 y}{\varepsilon \mu} \Delta x^4 \pm \text{etc.}$$

$$kq = \pm \frac{\varepsilon y \varepsilon y}{2 \varepsilon \mu} \Delta x^2 \pm \frac{\varepsilon^2 y \varepsilon y}{\varepsilon \mu} \Delta x^3 \pm \frac{\varepsilon^3 y \varepsilon y}{\varepsilon \mu} \Delta x^4 \pm \text{etc.}$$

3. Est

3. Est autem $mv = Mk = Mq \mp kq$, signo — vel + adhibito, prout curva concavitatem (5. Fig.) vel convexitatem (6. Fig.) obvertit axi abscissarum VU: cum igitur haec ipsa conditio etiam in (2) locum habeat, ob (1) per (462. §.); erit generatim per (1) (2)

$$mv = \varepsilon \mu \Delta x + \frac{\varepsilon^2 y \varepsilon y}{2 \varepsilon \mu} \Delta x^2 + \frac{\varepsilon^3 y \varepsilon y \varepsilon y}{\varepsilon \mu} \Delta x^3 + \text{etc.}$$

4. Hinc demum (2) (3) pro certis coefficientibus K, L, M, etc. independentibus a Δx fiet

$$\frac{mv^2 + Mv^2}{2 \cdot Mv} = \frac{\varepsilon \mu^3}{\pm \varepsilon y} + K \Delta x + L \Delta x^2 + M \Delta x^3 + \text{etc.}$$

Quamobrem, cum differentia $\Delta x = PQ$ continuo decrescente etiam Mv continuo debeat decrescere, cumque summa $K \Delta x + L \Delta x^2 + M \Delta x^3 + \text{etc.}$ in hac hypothese possit valorem induere quovis dato minorem (76. §.), necessarium est, ut, admissa possibilitate radii curvaturae pro puncto M, is sit ob (435. §.) $tM = -\frac{\varepsilon \mu^3}{\pm \varepsilon y}$.

472. Corollarium 1.

Quodsi igitur $r = tM$ denotet radium curvedinis in puncto M datae curvae, ad quod ducta sit ordinata $y = MP$; erit generatim

$$r = \frac{\varepsilon \mu^3}{-\varepsilon y} = \frac{(\varepsilon y^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{-\varepsilon y}.$$

Si enim data curva, ut ZMX in (5. Fig.), concava fuerit ex parte axeos abscissarum VU; erit $\varepsilon^2 y$ valoris negativi (461. §.), proinde fiet $-\varepsilon^2 y$ valoris positivi: si vero illa sit convexa ex parte axeos abscissarum, ut ZMX in (6. Fig.); erit quidem $\varepsilon^2 y$ valoris positivi (461. §.), proinde $-\varepsilon^2 y$ valoris negativi, signum tamen — haud aliud hic indicabit, quam radium curvedinis $r = tM$ hoc casu, non versus axem abscissarum VU, sed in partem oppositam puncti M cadere (471. §.).

473. Corollarium 2.

Circulus curvedinis in quovis puncto M datae curvae radio praecedente descriptus osculabitur arcum Mm interne vel externe in M (471. 435. 433. §.).

474. Corollarium 3.

Hactenus abscissam x instar variabilis absolutae spectavimus, neglectoque exponente differentiali $\varepsilon x = 1$ et ejus quadrato εx^2 loco $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}$, $\frac{\varepsilon^2 y}{\varepsilon x^2}$ retinuimus $\varepsilon^2 y$, εy (471. §. 1. 2. n.): quodsi ergo indeterminatum velimus relinquere, quanam variabilium pro absoluta sumenda sit; scriptis exponentibus $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}$, $\frac{\varepsilon^2 y}{\varepsilon x^2}$ loco εy , $\varepsilon^2 y$ in (472. §.), tum reducta expressione radii r per (410. §. 2. Schol.), erit

$$r = \frac{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{\varepsilon y \varepsilon x - \varepsilon^2 y \varepsilon x}{2}} = \frac{\varepsilon \mu^3}{\frac{\varepsilon y \varepsilon x - \varepsilon^2 y \varepsilon x}{2}} \quad (469. §.)$$

475. Corollarium 4.

Fig. 13. Quia, si abscissa x ad ordinatam y ut functio ad variabilem absolutam referatur, debet fieri $\varepsilon y = 1$, et $\varepsilon^2 y = 0$; erit in ea hypothesi (474. §.)

$$r = \frac{(\varepsilon x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}{\varepsilon x} = \frac{\varepsilon \mu^3}{\varepsilon x}.$$

476. Problema.

Fig. 14. Data aequatione ad curvam ZMX (14. Fig.) inter ejus coordinatas $x = AP$, $y = MP$; invenire distantias perpendiculares centri curvedinis debiti puncto M ab axibus coordinatarum VU , DE .

Solutio.

Sit MN normalis, et in hac centrum m circuli curvedinis debiti puncto M , $mp = z$ vero et $mq = Ap = u$ sint distantiae ejus perpendiculares ab axibus VU , DE coordinatarum $x = AP$, $y = MP$; erit, ob curvedinis radium $r = mM$, $Pp = \frac{r \cdot PN}{MN}$, $z = \frac{(r - MN)y}{MN} = \frac{ry}{MN} - y$, hinc $u = x + \frac{r \cdot PN}{MN}$: quodsi ergo sumantur valores pro radio r , normali MN , et subnormali NP per (474. 456. §.) fiet

$$u = x + \frac{\varepsilon y (\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}{\frac{\varepsilon y \varepsilon x - \varepsilon^2 y \varepsilon x}{2}}, \quad z = \frac{\varepsilon x (\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}{\frac{\varepsilon y \varepsilon x - \varepsilon^2 y \varepsilon x}{2}} - y.$$

477. Corollarium 1.

Data aequatione ad curvam ZMX inter ejus coöordinatas $x = AP$ et $y = MP$, poterunt y et εy , $\varepsilon^2 y$ per x determinari, quo ipso poterunt etiam $u = Ap$, $z = mp$ exprimi per x : hac ergo ratione poterunt determinari duae aequationes inter u , z , x , ex quibus, eliminando variabilem x , unicam aequationem inter u et z licebit derivare (477. §.).

478. Corollarium 2.

Si cogitentur radii curvaturae ZR , $M'm'$, Mm , $M''m''$ debiti singulis punctis datae curvae ZMX ; jacebunt omnia centra R , m' , m , m'' in linea curva RmS , cujus natura per naturam curvae ZMX perfecte est determinata, ita ut, data aequatione ad curvam ZMX inter ipsius coöordinatas $x = AP$, $y = MP$, ex hac ipsa aequatione per (476. 477. §.) possit elici aequatio ad curvam RmS inter ejus coöordinatas $u = Ap$, $z = mp$.

479. Corollarium 3.

Aequationes in (476. §.) dant per (474. 469. §.) $u = x + \frac{r \varepsilon y}{\varepsilon u}$, et $z = \frac{r \varepsilon x}{\varepsilon \mu} - y$: si sumas εu et multiplices per εx , εz vero ducas in εy , illudque productum ab hoc subtrahas; obtinebis $\varepsilon z \varepsilon y - \varepsilon u \varepsilon x = \frac{r}{\varepsilon \mu}$ ($\varepsilon y \varepsilon^2 x - \varepsilon^2 y \varepsilon x$) $-(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)$, unde, ob (474. 469. §.) prodit $\varepsilon z \varepsilon y - \varepsilon u \varepsilon x = 0$, et $\frac{\varepsilon u}{\varepsilon z} = \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}$.

480. Theorema.

Radius Mm circuli curvedinis debiti puncto M datae curvae ZMX tangit curvam Rms centrorum curvedinis singulis curvae ZMX punctis debitorum (478. §.) in puncto m , aequaturque summae $Rm + RZ$ arcus Rm et radii ZR curvedinis puncto extremo Z debiti.

Demonstratio.

1. Tangat recta nm arcum Rm in m ; debet esse $Tang\ nmp = \frac{\varepsilon u}{\varepsilon z}$, et $Cot\ mNp = Cot\ MNP = \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}$ (455. §.): igitur erit angulus nmp complementum anguli mNp ad unum rectum (479. §.), quod est impossibile, quin tangens nm coincidat cum radio curvedinis Mm .

2. Dein.

2. Deinde, aequatione pro z in (479. §.) differentiata, tum restitutis valoribus pro $\varepsilon\mu$ et r ex (474. 469. §.), obtinebitur $\varepsilon r = \frac{\varepsilon z \varepsilon \mu}{\varepsilon x}$: hinc, ob $\varepsilon y = \frac{\varepsilon u \varepsilon x}{\varepsilon z}$ (479. §.), adeoque $\varepsilon \mu = \frac{\varepsilon x}{\varepsilon z} \sqrt{(\varepsilon u^2 + \varepsilon z^2)}$ per (469. §.), erit $\varepsilon r = \sqrt{(\varepsilon z^2 + \varepsilon u^2)}$ exponens differentialis arcus Rm (469. §.). Et ideo debet esse $r = Rm + \text{Const}$: cum autem pro arcu $Rm = 0$ radius curvedinis $r = Mm$ fiat $r = RZ$; debet esse $\text{const} = ZR$, et $r = Mm = Rm + ZR$.

481. Theorema.

Et vicissim, si curva RmS talem situm respectu datae curvae ZMX habeat, ut, ducta ad quodcunque punctum m tangente Mm , haec aequetur arcui Rm aucto tangente ZR ; erit quaevis ejusmodi tangens Mm radius circuli curvedinis debiti puncto M datae curvae ZMX , proinde centra omnium circulorum curvedinis singulis punctis curvae ZMX debitorum jacebunt in curva ZmS .

Demonstratio.

1. Cum per hypothesim Mm tangat curvam Rms in m , pro $u = Ap$, $z = mp$, $\mu = Rm$, $x = AP$, $y = MP$; erit $\text{Tang } Nmp = \text{Cot } MNP = \frac{\varepsilon u}{\varepsilon z}$; tangens $Nm = \frac{z}{\varepsilon z} \varepsilon \mu$, et subtangens $Np = \frac{z \varepsilon u}{\varepsilon z}$ per (455. 456. 469. §.).

2. Adeoque erit $Pp = \frac{Mm \cdot \varepsilon u}{\varepsilon \mu}$, hinc $x = \frac{u \varepsilon \mu - Mm \varepsilon u}{\varepsilon \mu}$; porro $y = \frac{Mm \varepsilon z - z \varepsilon \mu}{\varepsilon \mu}$.

3. Quodsi ergo, pro $Mm = k$, hinc $\varepsilon k = \varepsilon \mu$, ob $Mm = Rm + ZR$ per hypothesin, sumas εx et εy in (2), reperiens, ob $\varepsilon \mu = \sqrt{(\varepsilon z^2 + \varepsilon u^2)}$, quotientem $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} = \frac{\varepsilon u}{\varepsilon z}$.

4. Est itaque $\text{Cot } MNP = \frac{\varepsilon y}{\varepsilon x}$ ob (1), (3), quod nequit subsistere quin sit MN normalis ad punctum M curvae ZMX (455. §.).

5. Radius curvedinis debitus puncto M coincidit ergo cum Mm ; eidem vero radio aequari rectam Mm , sic potest ostendi. Si capias exponentem differentialem εy in (2), obtinebis ob (3) $k = Mm = \frac{\varepsilon y \varepsilon \mu^2}{\varepsilon \mu \varepsilon z - \varepsilon z \varepsilon \mu}$.

Est

Est autem per (3) $\frac{\varepsilon z}{\varepsilon \mu} = \frac{\varepsilon x}{\sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)}}$, unde differentiando produ-
citur $\varepsilon \mu \varepsilon z - \varepsilon z \varepsilon \mu = \frac{(\varepsilon y \varepsilon x - \varepsilon x \varepsilon y) \varepsilon y \varepsilon \mu^2}{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)^{\frac{3}{2}}}$: hoc igitur valore sub-
stituto in praecedenti expressione pro k obtinebitur k = radius curvedinis in
puncto M (474 §.).

482. DEFINITIO.

Si linea abscissarum VU (15. Fig.) tangat datam curvam RS in R, su. Fig. 15.
maturque pars ejus constans ZR, tum cogitetur ad quodvis punctum m
ejusdem curvae duci tangens Mm = Rm + RZ, nimirum aequalis summae
arcus Rm et rectae constantis ZR; jacebunt puncta extrema M omnium tan-
gentium in certa curva ZMX, cujus *Evolutam* vocant curvam RmS. Si,
inquiunt, concipiatur curvae RmS filum ZRmS ita adplicari, ut
ejus pars ZR eandem in R tangat; tum cogitetur extremum Z aequabiliter
versus X progredi, ut semper pars fili Mm curvam deferens in rectam pro-
tensa sit, quae curvam in m tangat; curva RS evolvatur in lineam rectam
determinatam per ejus tangentem XS = RS + RZ, punctumque Z genera-
bit curvam ZMX: ob hanc ipsam causam vocant curvam RmS *evolutam*,
et ZMX curvam *evolutione prioris genitam*.

483. Corollarium 1.

In evoluta RmS curvae ZMX jacent centra omnium circulorum cur-
vedinis singulis punctis curvae ZMX debitorum, ita ut, si ad quodcunque
punctum m evolutae ducatur tangens Mm curvae ZMX in M occurrens,
punctum m debeat esse centrum, et Mm radius circuli curvaturae debiti
puncto M (481. §.).

484. Corollarium 2.

Data aequatione ad curvam ZMX evolutione alterius curvae RmS ge-
nitam inter coordinatas x = AP, y = MP, poterit, ob (483. §.), per (476.
477. 478. §.) determinari aequatio ad evolutam RmS inter coordinatas
u = Ap, z = mp.

485. Corollarium 3.

Cum sit tangens Mm = Rm + ZR radius curvedinis in puncto M cur-
vae ZMX (483. §.); erit quilibet arcus Rm evolutae RmS algebraice
rectificabilis, si radius curvedinis in quovis puncto M curvae evolutione
prioris genitae aequetur functioni algebraicae.

486. Problema.

Data aequatione ad evolutam RmS inter ejus coordinatas Rq=v, mq=t, invenire aequationem ad curvam ZMX evolutione prioris genitam inter ipsius coordinatas ZP=x, MP=y.

Solutio.

1. Nimirum linea abscissarum RQ datae evolutae RmS est perpendicularis ad ejus tangentem VU in R, quae lineam abscissarum pro curva ZMX evolutione prioris genita exhibet. Cum jam sit tangens Mm=mR + ZR=r radius curvæ in puncto M, posito arcu Rm=s, et ZR=a; erit r=s+a. Porro est v=Rq=mp, et t=mq=Rp=Ap-a: igitur per (479. §.) reperietur $y = \frac{(s+a)\varepsilon x}{\varepsilon\mu} - v$, et $x = t + a - \frac{(s+a)\varepsilon y}{\varepsilon\mu}$.

2. Deinde t=Ap-a=u-a dat $\varepsilon t = \varepsilon u$, et v=Rq=mp=z dat $\varepsilon v = \varepsilon z$: quamobrem, si pro his valoribus per (480. §. 2. n.) determines $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon\mu}$ et $\frac{\varepsilon x}{\varepsilon\mu}$, obtinebis ex (1)

$$y = \frac{(s+a)\varepsilon v}{\sqrt{(\varepsilon t^2 + \varepsilon v^2)}} - v, \text{ et } x = t + a - \frac{(s+a)\varepsilon t}{\sqrt{(\varepsilon t^2 + \varepsilon v^2)}}.$$

3. Proposita ergo aequatione ad curvam RmS inter coordinatas v=Rq, t=mq, determinetur εt per εv : hoc enim valore loco εt in (2) substituto obtinebuntur expressiones pro y, x per v, t, s: ex his demum aequationibus et aequatione inter v, t data licebit eliminare v, t, eoque ipso unam aequationem inter x et y inde derivare, quae tamen ab arcu s=Rm haud liberabitur.

487. Corollarium.

Natura curvae ZMX pendet a rectificatione illius evolutae RmS: si arcus s=Rm fuerit functio algebraica ordinatae mq=t; erit etiam aequatio inter x, y ad curvam ZMX algebraica, transcendens vero, si arcus s=Rm aequatur functioni transcendenti ordinatae mq=t (486. §.).

488. Problema.

Fig. 5. *Data aequatione ad curvam ZMX (5. Fig.) inter coordinatas x=AP, y=MP; invenire spatium MPCZ inter ordinatam MP et aliam ZC datam in distantia CA ab origine A abscissarum.*

Solu.

Solutio.

Sit spatium $MPCZ = S$, quod instar unius functionis abscissae $x = AP$ potest spectari. Si abscissa $x = AP$ capiat incrementum $\Delta x = PQ$, ducaturque ordinata Qm , et Mp parallela axi abscissarum VU , altera vero parallela ml ordinatae MP occurrat in l ; erit spatium $PMmQ = \Delta S$, $mp = \Delta y$, $Mp = \Delta x$; hinc $\Delta S > MpQP$ et simul $\Delta S < lmQP$ pro qualibet differentia Δx . Habebimus igitur $\Delta S > y \Delta x$ et simul $\Delta S < (y + \Delta y) \Delta x$, unde ob (84. §.) per (131. §.) obtinetur exponens differentialis $\epsilon S = y \epsilon x$, cujus integrale aequabitur spatio S .

489. Problema.

Data aequatione ad curvam AX (16. 17. Fig.) inter ordinatas $z = BC$ Fig. 16. 17. ad datum punctum C convergentes et angulos variables $ACB = \gamma$, quadrare sectorem ACB , seu invenire ejus aream S .

Solutio.

Angulus $\gamma = ACB$ capiat incrementum $BCD = \Delta \gamma$, et ex puncto C radiis $CB = z$, CD describantur arcus circulares Bd , Db ; erit $Dd = Bb = \Delta z$ differentia ordinatae $BC = z$, et area sectoris $BCD = \Delta S$ differentia areae $S = BCA$ (17. 18. §.): si ergo ordinata z spectetur instar certae functionis anguli γ ; poterit poni $\Delta z = \alpha \Delta \gamma + \beta \Delta \gamma^2 + \text{etc.}$ (84. §.).

Iam vero patet, aream ΔS sectoris BDC pro quovis angulo $\Delta \gamma$ ita se habere ad areas sectorum circularium BdC , bDC , ut debeat esse $\Delta S > BdC$ et simul $\Delta S < bDC$ (16. Fig.), vel $\Delta S > bDC$ et $\Delta S < BdC$ (17. Fig.): ea propter, cum sit arcus circularis $Bd = \Delta \gamma \cdot BC = \Delta \gamma \cdot z$, et $bD = \Delta \gamma \cdot DC$, seu $bD = \Delta \gamma (z + \Delta z)$ in (16. Fig.), et $bD = \Delta \gamma (z - \Delta z)$ in (17. Fig.) per (5. §. 3. Schol.); debet esse $\Delta S > \frac{1}{2} z^2 \Delta \gamma$, et $\Delta S < \frac{1}{2} z^2 \Delta \gamma + (z + \frac{1}{2} (\alpha \Delta \gamma + \beta \Delta \gamma^2 + \text{etc.})) (\alpha \Delta \gamma^2 + \beta \Delta \gamma^3 + \text{etc.})$; vel $\Delta S < \frac{1}{2} z^2 \Delta \gamma$, et $\Delta S > \frac{1}{2} z^2 \Delta \gamma + (\frac{1}{2} (\alpha \Delta \gamma + \beta \Delta \gamma^2 + \text{etc.}) - z) (\alpha \Delta \gamma^2 + \beta \Delta \gamma^3 + \text{etc.})$.

Est igitur $\epsilon S = \frac{1}{2} z^2 \epsilon \gamma$ (131. §.) exponens differentialis areae S , cujus integratio dabit idcirco ipsam aream $S = ABC$.

490. Problema.

Data aequatione ad curvam BPC (18. Fig.) inter ejus coordinatas Fig. 18. $x = Ba$, $y = aP$, cujus revolutione circa axem abscissarum AE cogitetur generari corpus rotundum BCD ; invenire soliditatem ejusdem corporis.

Solutio.

Sectio $PmpnP$ in a perpendicularis ad axem AE abscindit segmentum $PBpnPm=S$, quod instar unius functionis abscissae $x=Ba$ potest spectari. Si itaque abscissa $x=Ba$ augeatur incremento $\Delta x=ab$, cogiturque per punctum b duci sectio $rescr$ priori parallela; exprimet $\Delta S=Ppsr$ partem totius corporis comprehensam inter sectiones $PmpnP$ et $rescr$, quae idcirco pro quavis differentia $\Delta x=ab$ erit major cylindro baseos $PmpnP$ et altitudinis ab , simul autem minor cylindro baseos $rescr$ et ejusdem altitudinis ab ; igitur erit pro quavis differentia $\Delta x=ab$.

$$\Delta S > PmpnP \cdot \Delta x \text{ et } \Delta S < rescr \cdot \Delta x.$$

Habet autem sectio circularis $PmpnP$ ordinatam $aP=y$, et sectio $rescr$ ordinatam $rb=sb=rR+Pa=sS+pa=\Delta y+y$ pro radio: pro ratione $1:\pi$ radii ad semiperipheriam debet igitur esse $PmpnP=\pi y^2$, et $rescr=\pi(y+\Delta y)^2$. Adeoque habebimus etiam

$$\Delta S > \pi y^2 \Delta x \text{ et } \Delta S < \pi y^2 \Delta x + 2\pi y \Delta y \Delta x + \pi \Delta y^2 \Delta x.$$

Quare per (131. §.) debet esse exponens differentialis $\epsilon S=\pi y^2 s x$, cujus integratio dat soliditatem segmenti $S=BPnmpmP$.

491. Problema.

In eadem hypothefi (490. §.) invenire superficiem rotundam segmenti $PBpnPmp$.

Solutio.

1. Recta AF tangat curvam BC in P , et abscissae $Bb=Ba+ab=x+\Delta x$ respondeat ordinata $rb=rR+Rb=rR+Pa=\Delta y+y$, quae producta occurrat tangenti AF in Q : posito igitur arcu $BP=\mu$ ponatur arcus $Pr=\Delta\mu$.

2. Quare, dum curva BC sua revolutione circa axem AE corpus rotundum CBD generat, concipi potest arcus BP generare superficiem rotundam segmenti PBp , quae dicatur S , arcus vero Br superficiem rotundam segmenti rBs , ita ut differentia ΔS prioris superficiei aequari debeat superficiei rotundae partis hujus segmenti interceptae inter sectiones $PmpnP$, $rescr$ in punctis a, b ad axem AE perpendiculares.

3. In eadem hypothefi (2) generant pars PQ tangenti AF , et chorda Por conos truncatos $PpqQP$, $PposroP$; pars vero Qr ordinatae br productae in Q intercepta inter tangentem et curvam generat annulum radiorum rb, Qb .

4. Est

4. Est autem pro quavis differentia $\Delta x = a b$ abscissae $x = B a$ superficies rotunda ΔS in (2) major superficie rotunda conii truncati $P o r s o p$, et simul minor summa superficiei rotundae conii truncati, $P Q q p$, et superficiei planae annuli radiorum $r b$, $Q b$ in (3).

5. Superficies rotunda conii truncati $P o r s o p$, sumta ratione $1:\pi$ radii ad semiperipheriam, est $\pi(2y + \Delta y) P o r = \pi(2y + \Delta y) \sqrt{\Delta y^2 + \Delta x^2}$.

6. Superficies vero rotunda conii truncati $P Q q p$ est $\pi(2y + \Delta y + r Q) P Q$; et superficies plana annuli radiorum $r b$, $Q b$ est $\pi(2y + 2\Delta y + Q r) Q r$.

7. Quamobrem, si $\sqrt{(\Delta y^2 + \Delta x^2)}$ exprimatur per (469. §.), et $r Q$, $P Q$ in (5) (6) determinantur ut $m q$, $M q$ in (462. §.), obtinebimus ex (5) (6) (4) pro certis coefficientibus $k, l, m, - - - K, L, M$, etc. sequentes expressiones.

$$\Delta S > \frac{2\pi y}{\varepsilon x} \Delta x \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)} + k \Delta x^2 + l \Delta x^3 + m \Delta x^4 + \text{etc.}$$

$$\Delta S < \frac{2\pi y}{\varepsilon x} \Delta x \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)} + K \Delta x^2 + L \Delta x^3 + M \Delta x^4 + \text{etc.}$$

Per (131. §.) est itaque $\varepsilon S = 2\pi y \sqrt{(\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2)} = 2\pi y \varepsilon \mu$ (469. §.) Exponens differentialis functionis S aequalis superficiei rotundae segmenti $P B p$, cujus integratio dabit superficiem S .

CAPUT IX.
DE
QUIBUSDAM CURVIS SPECIATIM.

492. Problema.

Admissa resolutione aequationum omnis ordinis, explorare situm curvae, ad quam data sit aequatio inter ejus coordinatas x , y , respectu axium harum coordinatarum.

Solutio.

1. Data ad curvam aequatio sit $\alpha + \overset{x}{\phi} + \overset{y}{\mu} + \overset{xy}{\psi} = 0$ (443. §.), quae ita fit comparata, ut pro $x = 0$ vel $y = 0$ omnes termini complectentes x casu primo, vel y casu secundo, fiant aequales nihilo.

2. Quaelibet ordinata y exhibet distantiam perpendicularem unius puncti curvae ab axe abscissarum; et quaevis abscissa x dat distantiam ejusdem puncti curvae ab axe ordinarum aequalem distantiae puncti axeos abscissarum, in quo ei insitit ordinata y , ab origine abscissarum (414. 411. 447. §.).

3. Fiat igitur in data aequatione ad curvam ordinata $y = 0$; abibit ea in aequationem determinatam $\alpha + \overset{x}{\phi} = 0$ ob (1), per quam determinantur abscissae x , quibus respondent ordinatae $y = 0$, in quarum idcirco punctis extremis curva axi abscissarum occurrit, eundemque secatur vel tangit (2). Quaevis ergo radix realis aequationis $\alpha + \overset{x}{\phi} = 0$, positiva vel negativa, dabit unam abscissam x , positivam vel negativam (413. §.), aequalem distantiae unius puncti axeos abscissarum ab harum origine, in quo curva occurrit eidem axi: toties itaque occurreret curva axi abscissarum, quot radices reales habuerit aequatio $\alpha + \overset{x}{\phi} = 0$: si quae harum radicum inter se aequales fuerint, omnes positivae, vel omnes negativae, indicium erit, totidem curvae ramos in uno eodemque puncto occurrere axi abscissarum: si autem omnes radices aequationis $\alpha + \overset{x}{\phi} = 0$ fuerint imaginariae; signum erit, nullum extare punctum in axe abscissarum, in quo ei curva occurrat.

4. Sic

4. Sic quoque pro $x=0$ abibit data aequatio (1) in aequationem determinatam $\alpha + \mu = 0$, quae determinat ordinatas respondentes abscissis $x=0$, ordinatas idcirco in origine abscissarum coincidentes cum axe ordinarum, aequales distantis totidem punctorum hujus axeos ab origine abscissarum, in quibus ei curva occurrit (2). Quamobrem occurret curva axi ordinarum in tot punctis, quot radices reales inaequales habuerit aequatio $\alpha + \mu = 0$; si quae vero ejus radices reales fuerint aequales, omnes positivae, aut omnes negativae; determinabunt hae unum punctum in axe ordinarum, in quo ei totidem rami curvae occurrent; si autem omnes radices illius aequationis fuerint imaginariae; indicabunt eae, nullum dari punctum in axe ordinarum, in quo ei curva possit occurrere.

5. Denique sumatur quaecunque determinata abscissa $x = \pm a$ positiva vel negativa, abibit data ad curvam aequatio (1) in aequationem determinatam $\alpha + \phi + \mu = 0$. Quaelibet radix realis hujus aequationis, positiva vel negativa, dabit unam curvae ordinatam y , pariter positivam vel negativam, respondentem abscissae $x = \pm a$, quo ipso determinabitur unum punctum curvae in distantia $x = a$ ab axe ordinarum et distantia y ab axe abscissarum (2). Si quae autem reales radices fuerint inter se aequales, omnes positivae vel omnes negativae; omnes unum tantum punctum curvae in distantia $= a$ ab axe ordinarum et distantia $= y$ ab axe abscissarum determinabunt, in quo totidem curvae rami concurrent: radices demum omnes imaginariae denotabunt, nullum curvae punctum jacere in distantia $x = \pm a$ ab axe ordinarum.

493. Corollarium 1.

Cum aequatio ad curvam inter coordinatas x, y pro $y=0$ nequeat esse altioris ordinis, quam est ipsa curva (442. §.), nec ulla aequatio determinata plures radices possit habere, quam unitates exponens ordinis completitur, ad quem ea pertinet (175. §.); perspicuum est, nullam curvam posse axi abscissarum in pluribus punctis occurrere, quam unitates continentur in exponente ordinis, ad quem curva spectat; fieri tamen posse, ut aliqua curva ei in paucioribus punctis, alia vero in nullo puncto occurrat (492. §. 3 n),

494. Corollarium 2.

Omnis recta, quemcunque illa situm respectu datae curvae habeat, potest sumi pro axe abscissarum (412. §.): impossibile ergo est, ut aliqua recta datae

datae cuicunque curvae in pluribus punctis occurrat, quam unitates habet exponens ordinis, ad quem curva pertinet (449. 493. §.).

495. Corollarium 3.

Recta, quae per punctum curvae *2plex*, *3plex*, aut generatim *ntuplex* transit, censenda est curvae eo ipso in 2, 3, aut generatim *n* punctis occurrere (440. §.): quare, cum possibile sit, rectam per punctum *ntuplex* curvae ita ducere, ut illa adhuc per aliquod aliud ejusdem curvae punctum transeat, curvae idcirco ad minimum in punctis numero $n+1$ occurrat, impossibile est, ut aliqua curva aut *ntuplex* punctum habeat (440. §.), cujus index *n* exponentem ordinis, ad quem curva pertinet (442. §.), exaequet aut superet, -aut bina habeat puncta multiplicia, e. gr. punctum *mtuplex* et aliud *rtuplex*, quorum indices $m+r$ simul exponentem ordinis curvae superent (494. §.).

496. Corollarium 4.

Curvae secundi ordinis non possunt habere puncta multiplicia, consequenter nec cuspides, neque nodos (442. 441. 495. §.).

497. Corollarium 5.

Curva, ad quam datur aequatio inter coordinatas *x*, *y* habebit ramum juxta axem abscissarum in indefinitum excurrentem, si abscissis *x* ultra certum valorem $=a$ indefinenter crescentibus semper aliquae ordinatae *y*, omnes positivae vel omnes negativae, respondeant: et si hae continuo fuerint minores; erit linea abscissarum asymptotus ejus rami (492. §. 5. n. et 437. §.).

498. Corollarium 6.

Si data ad curvam aequatio sic sit comparata, ut determinatae alicui abscissae $x=k$ ordinatae *y* reales, una vel plures, abscissis vero $x=k \pm e$ quantitate *e* quomodocunque parva auctis aut minutis ordinatae tantum imaginariae respondeant; habebit curva unum vel plura puncta in distantia *k* ab axe ordinarum ita sejuncta a reliquis ejusdem curvae partibus, ut nullus arcus curvae in iis punctis initium possit sumere, aut terminari (492. §. 5. n.): puncta ejusmodi *conjugata* vocantur.

499. Corollarium 7.

Tangens ad punctum conjugatum curvae est imaginaria; et reale curvae punctum, cui non nisi imaginaria tangens respondet, debet esse conjugatum (498. 415. §.).

500. Problema.

Data ad curvam aequatione $Z=0$ inter coordinatas x, y , determinare situm tangents et subtangents pro dato puncto.

Solutio.

1. Sit UV (19. 20. Fig.) axis abscissarum, et illarum origo punctum Fig. 19. 20. A vel B. Punctum curvae, ad quod tangens ducta cogitetur, sit M, determinatum per ordinatam positivam vel negativam PM, et abscissam pariter positivam aut negativam AP vel BP (413. §.).

2. Cum data aequatio $Z=0$ complectatur functionem Z duarum variabilium y, x , erit ${}^y_\varepsilon Z + {}^x_\varepsilon Z = 0$ (141. §.): igitur, si sit ${}^y_\varepsilon Z = A \varepsilon y$ et ${}^x_\varepsilon Z = B \varepsilon x$, habebimus $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} = -\frac{B}{A}$.

3. Iam vero, per hypothefin, datur punctum contactus M, cis vel trans axem abscissarum UV (1), unde per se elucet, tangentem TM casu primo cis, et casu secundo trans axem abscissarum UV cadere. Attendatur porro ad exponentem differentialem εy ex data aequatione $Z=0$ derivatum (2): si enim is pro data abscissa $x=AP$, vel $x=BP$, et ordinata $y=MP$, utraque absolute spectata, positivum valorem habeat, vel negativum, constabit eo ipso, crescente abscissa $x=AP$ vel $x=BP$ ordinata $y=MP$ crescere casu primo, et decrescere casu secundo (444. §.); consequenter jacebit tangens TM cum subtangente TP ad eandem partem ordinatae MP, ad quam jacet origo abscissarum A vel B, casu primo, ad partem vero oppositam casu secundo (418. §.).

4. Quamobrem, quo situs tangents et subtangents respectu axeos abscissarum UV ordinataeque MP perfecte definiatur, determinari debet adhuc magnitudo absoluta angulorum MTP, TMP: hi autem determinabuntur per (455. §.), si, spectata magnitudine absoluta abscissae x et ordinatae y , exponens differentialis εy (2) pro illis abscissis, pro quibus crescentibus decrescunt ordinatae (3), cum signis contrariis sumatur (454. §.), ita ut fiat

$$\text{Tang MTP} = \text{Cot TMP} = \frac{\pm \varepsilon y}{\varepsilon x};$$

$$\text{Tang TMP} = \text{Cot MTP} = \frac{\varepsilon x}{\pm \varepsilon y};$$

signo — pro eo casu adhibito, quo εy fuerit valoris negativi (3).

Scholion.

Fig. 1.

Exemplo fit circulus (1. Fig.) radio $r = AC$ descriptus. Si diameter AB fit axis, et A origo abscissarum; erit $y^2 = 2rx - x^2$ aequatio ad circulum, eaque dabit $\varepsilon y = \frac{(r-x)\varepsilon x}{y}$. Expressio haec retinebit sua signa, si etiam $-y$ loco y sumatur: cum enim εy ex $y = \pm \sqrt{2rx - x^2}$ nascatur; debet utique, sumta ordinata $-y$, sumi etiam $-\varepsilon y$. Quare, cum hoc casu abscissae negativae locum non habeant, crescente abscissa positiva $x = AQ$ usque $x = AC = r$ habebit εy valorem positivum, eodem vero crescente ultra $x = AC = r$ obtinebit εy valorem negativum: hinc ergo per (3) colligimus, tangentem UP et Uq cum subtangente UQ pro quovis puncto P, q primi quadrantis AD et quarti AE ad eandem cum origine abscissarum A partem ordinatae cadere; tangentem vero Vp et VM cum subtangente Vm pro quolibet puncto p, M secundi quadrantis DB et tertii BE ad partem ordinatae ei oppositam cadere, ad quam jacet origo abscissarum A . Quodsi demum m denotet angulum ad U vel V , sub quo tangens secat axem AB , et n designet angulum ad P, q, M , vel p , sub quo tangens occurrit ordinatae, habebis per (4) sequentes expressiones, signo $-$ pro secundo et tertio quadrante adhibito, ob $x = Am > r$.

$$\text{Tang } m = \pm \frac{r-x}{y}. \quad \text{Tang } n = \pm \frac{y}{r-x}$$

Pro abscissis u a centro C computatis esset aequatio ad circulum $y^2 = r^2 - u^2$, hinc $\varepsilon y = \frac{-u\varepsilon u}{y}$: erit igitur εy pro omni abscissa et ordinata valoris negativum, unde sequitur per (3), tangentem cum subtangente pro quovis circuli puncto cadere ad partem ordinatae ei oppositam, ad quam jacet centrum C sumtum pro origine abscissarum: per (4) autem, retenta praecedente literarum m, n significatione, habebimus $\text{Tang } m = \frac{u}{y}$ et $\text{Tang } n = \frac{y}{u}$. Plura exempla in sequentibus se sponte offerent.

501. Corollarium 1.

Cognito situ tangentis et subtangentis (500. §), innotescet eo ipso situs normalis et subnormalis (420. §). Normalis nimirum cum subnormali semper cadit ad partem ordinatae illi oppositam, ad quam cadit tangens cum subtangente: quodsi ergo immediate ex data ad curvam aequatione

$$Z = 0$$

$Z=0$ elicias differentiando exponentem differentialem εy (500. §. 2. n.), habebit is pro datis coordinatis, absolute consideratis, valorem positivum vel negativum, qui indicabit, normalem cum subnormali casu secundo ad eandem partem ordinatae, ad quam jacet origo abscissarum, et casu primo ad partem illi oppositam cadere (500. §. 3. n.).

502. Corollarium 2.

Dato situ tangentis, subtangentis, normalis, et subnormalis (500. §. 501. §.), determinabitur per (456. §.) magnitudo absoluta harum linearum, modo, spectata magnitudine absoluta coordinatarum, εy pro illis abscissis, pro quibus crescentibus decrescunt ordinatae, pro quibus idcirco εy valorem negativum induit (444. §.), cum signis contrariis sumatur (454. §.).

Scholion.

Sic e. gr. in (500. §. Schol.), si abscissae a vertice diametri computentur, erit in circulo tangens $\pm \frac{ry}{r-x}$, subtangens $\pm \frac{y^2}{r-x}$, ubi signum — adhiberi debet eo determinato casu, quo fit $x > r$: si autem abscissae computentur a centro, debebit esse tangens $\frac{ry}{u}$, et subtangens $\frac{y^2}{u}$.

503. Corollarium 3.

Si aequatio ad curvam $Z=0$ det ${}_y\varepsilon Z + {}_x\varepsilon Z = A\varepsilon y + B\varepsilon x = 0$ Fig. 19. 20. (500. §. 2. n.), sitque $A=0$ vel $B=0$, adeoque $\frac{\varepsilon x}{\varepsilon y} = 0$ vel $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} = 0$; erit casu primo Tang TMP (19. 20. Fig.), et casu altero Tang MTP aequalis nihilo: primo igitur casu erit tangens perpendicularis ad axem abscissarum UV, et casu altero perpendicularis ad ordinatam, proinde parallela axi UV.

504. Corollarium 4.

Verum fieri potest, ut utraque pars ${}_y\varepsilon Z$ et ${}_x\varepsilon Z$ aequationis differentialis $\varepsilon Z=0$ aequetur nihilo, quo casu fiet $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} = \frac{0}{0}$ (503. §.): hoc casu aequatio $\varepsilon Z=0$ ad determinandum situm tangentis haud sufficiet. Sumatur idcirco secunda aequatio differentialis ${}_x^2\varepsilon Z=0$, adeoque ${}_y^2\varepsilon Z + 2{}_y\varepsilon \cdot {}_x\varepsilon Z + {}_x^2\varepsilon Z=0$ (152. §.), seu $A\varepsilon y^2 + 2B\varepsilon y\varepsilon x + C\varepsilon x^2=0$, si sit ${}_y^2\varepsilon Z = A\varepsilon y^2$, ${}_y\varepsilon \cdot {}_x\varepsilon Z = B\varepsilon y\varepsilon x$, et ${}_x^2\varepsilon Z = C\varepsilon x^2$: hinc enim nascetur aequatio quadratica

E e 2 $\frac{A}{C}$

$\frac{A}{C} + \frac{2B}{C} \frac{\varepsilon x}{\varepsilon y} + \frac{\varepsilon x^2}{\varepsilon y^2} = 0$, cujus binae radices exhibebunt duos valores pro $\frac{\varepsilon x}{\varepsilon y} = \text{Tang TMP}$ (500. §. 4. n). Si utraque radix fuerit realis, binae tangentes in M pertinebunt ad binos curvae ramos in M concurrentes, punctumque M erit duplex (440. §.): et si hae radices inter se aequales sint, unica tangens in M ad duos ramos sese in M tangentes pertinebit: quodsi autem ambae radices fuerint imaginariae; erit M punctum conjugatum curvae (499. §.).

505. Corollarium 5.

Et generatim, si ex data ad curvam aequatione $Z=0$ per (152. 153. §.) determinentur successive aequationes differentiales $\varepsilon Z=0$, $\varepsilon^2 Z=0$, $\varepsilon^3 Z=0$, - - - $\varepsilon^r Z=0$, singulae vero partes singularum aequationum pro dato curvae puncto deprehendantur aequari nihilo; sumatur aequatio differentialis ordinis proxime altioris $\varepsilon^r Z=0$, unde, singulis partibus exponentis $\varepsilon^r Z$ per (153. §.) determinatis, tum per potentiam εy^r et coefficientem potentiae εx^r divisis, nascetur aequatio *rti* ordinis formae $\alpha + \beta \frac{\varepsilon x}{\varepsilon y} + \gamma \frac{\varepsilon x^2}{\varepsilon y^2} + \dots + \frac{\varepsilon x^r}{\varepsilon y^r} = 0$. Quodsi jam omnes radices hujus aequationis fuerint reales, exhibebunt eae totidem valores reales pro tangente $\frac{\varepsilon x}{\varepsilon y}$ anguli TMP, quo casu idcirco numero *r* tangentes ad totidem curvae ramos in puncto M concurrentes pertinebunt, punctumque M erit *rtuplex* (440. §.): si autem omnes radices fuerint imaginariae; erit M punctum conjugatum (498. §.): in genere demum pro *n* radicibus realibus ejusdem aequationis erit M punctum *ntuplex* (440. §.).

506. Corollarium 6.

Hinc patet, qua ratione liceat explorare, an curva, ad quam datur aequatio $Z=0$ inter indeterminatas coordinatas *x*, *y*, puncta multiplicia habeat, quave ratione coordinatae *x*, *y*, quibus ea puncta respondeant, possint determinari. Sumta nimirum prima aequatione differentiali $\varepsilon Z = \varepsilon^2 Z + \varepsilon^3 Z = 0$ (152. §.), fiat $\varepsilon^2 Z=0$, $\varepsilon^3 Z=0$, sicut est $Z=0$, tum ex una trium harum aequationum exprimatur valor alterutrius coordinatae *x*, *y*, isque substituitur in reliquis duabus aequationibus: quoties enim hae aequationes communes aliquas radices habuerint; toties poterunt per

per has radices determinari coordinatae x, y , quibus respondent puncta multiplicia: utrum vero haec puncta sint duplicia, vel triplicia etc. per (504. 505. §.) licebit investigare.

507. Corollarium 7.

Ubicunque adfunt cuspides seu puncta reflexionis, aut puncta flexus contrarii, vel nodi, adfunt eo ipso puncta multiplicia (441. §.): quodsi ergo certo constet, curvam, ad quam datur aequatio, nulla habere puncta multiplicia (504. 505. 506. §.), constabit eo ipso, eandem curvam nec cuspides habere, neque puncta flexus contrarii, vel nodos. Ex eo tamen, quod aliqua curva puncta multiplicia habeat, haud sequitur, eandem quoque cuspides vel puncta flexus contrarii, aut nodos habere (440. 441. §.).

Scholion.

Peculiariter idcirco debet investigari, utrum datum curvae punctum multiplex sit cuspis, punctum flexus contrarii, vel nodus. Verum has aliasque complures disquisitiones generales, quae, nisi uberius, quam fieri solet, exponantur, tyronem facile in errorem inducunt, intactas reliquimus, ne ab instituti ratione nimio opere abducamur: iis itaque substituemus adplicationem praecedentis theoriae ad peculiare quaspian curvas, algebraicas et transcendentes, quarum aliquae in sequentibus erunt usui.

508. DEFINITIO.

Inter curvas algebraicas maxime memorabiles sunt *Sectiones conicae*. Curva, cujus naturam exprimit aequatio $y^2 = px$ inter coordinatas x, y rectamque constantem p , vocatur *Parabola*, et p ejus *Parameter*.

509. Corollarium 1.

Sit VU (21. Fig.) axis, et A origo abscissarum, DE autem axis or- Fig. 21.
dinatarum; respondebit in parabola cuius abscissae positivae $x = AP$ duplex ordinata $y = \pm \sqrt{p \cdot AP}$ (508. §.), una positiva, puta $y = MP$, et altera negativa $y = Pm$, priori aequalis, utraque eo major, quo major est abscissa $x = AP$: abscissis autem negativis $x = -Ae$ non aliae quam imaginariae ordinatae $y = \sqrt{-p \cdot Ae}$ respondebunt (508. §.): et pro abscissa $x = AP = 0$ fiet etiam ordinata $y = MP = 0$ (508. §.).

510. Corollarium 2.

Parabola constat ergo duobus ramis AR, AS in origine abscissarum A concurrentibus, qui juxta axem abscissarum VU in indefinitum excur-

runt, eo magis ab eo recedentes, quo magis versus U producuntur. Linea vero abscissarum VU bissecabit omnem chordam Mm ei perpendiculararem, et ideo dividet illa spatium MAm in duas partes AMP, AmP congruentes, proinde inter se similes et aequales (509. §.). Eapropter appellatur A *Vertex* parabolae, AU autem est ejus *Diameter absoluta*, et in specie *Axis* (438. §.).

511. Corollarium 3.

Si ex vertice A ad quodcunque parabolae punctum M ducatur recta AM; erit $AM^2 = MP^2 + AP^2$: igitur $AM^2 = (p + x) \times$ (508. §.)

512. Corollarium 4.

Tangens TM (vel Tm) ad quodvis parabolae punctum M (vel m) cum subtangente TP debet jacere ad eandem partem ordinatae MP (vel mP), ad quam jacet ejus vertex A; normalis vero MN (vel mN) cum subnormali NP cadet ad partem oppositam (508. 500. §. 3. n.) 501. §.): posita abscissa $x = AP$, et ordinata $y = MP$, obtinebuntur per (508. 456. 455. §.) sequentes expressiones pro tangente, subtangente, normali et subnormali, situque harum rectarum respectu axeos et ordinatae.

$$TM = \sqrt{px + 4x^2}; TP = 2x; MN = \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + px};$$

$$NP = \frac{1}{2}p; \sin MTP = \cos TMP = \sqrt{\left(\frac{p}{p + 4x}\right)}.$$

513. Corollarium 5.

Subnormalis parabolae est constans, nimirum aequalis semiparametro; subtangens vero aequatur duplae abscissae; et tangens in vertice A sit perpendicularis ad axem AU (512. §.):

514. Corollarium 6.

Pro arcu $\mu = AM$, cum sit $\varepsilon x = \frac{2y \varepsilon y}{p}$ (508. §.); erit per (469. §.)

$\varepsilon \mu = \frac{\varepsilon y}{p} \sqrt{p^2 + 4y^2}$, unde, integrando per (289. §.) reperiatur arcus $\mu = Z + C$ pro quavis abscissa $x = AP$, qui pro $x = 0$, debebit pariter aequari nibilo, quo ipso valor constantis C poterit definiri (238. §.).

515. Corollarium 7.

Si quaerantur exponentes differentiales ϵy , $\epsilon^2 y$ pro $\epsilon x = 1$ ex (508 §.); habebit ϵy valorem positivum, et $\epsilon^2 y$ valorem negativum, pro quavis abscissa $x = AP$: in parabola ergo crescentibus abscissis crescunt ordinatae (444. §.) (prouti id jam ex 509. §. elucet); et in quovis puncto M obvertit parabola concavitatem axi abscissarum AU (461. §.); radius vero curvedinis in quolibet puncto M continetur sequenti expressione (472 §.), fitque, pro $x = 0$, in vertice A aequalis semiparametro, adeoque aequalis subnormali (513. §.).

$$r = \frac{(p + 4x)^{\frac{3}{2}}}{2p^{\frac{1}{2}}}.$$

516. Corollarium 8.

Dato radio curvedinis $r = Mm$ (15. Fig.) pro indeterminato puncto M Fig. 15. parabola ZMX invenietur aequatio per (484. §.) ad ejus evolutam RmS (482. §.), quae, cum semper sit $ZR + Rm = r =$ expressioni algebraicae variabilis x (515. §.), erit algebraice rectificabilis, ita ut quivis arcus futurus sit $Rm = r - ZR$.

517. Corollarium 9.

Pro spatia parabolico $AMP = S$ (21. Fig.) erit $\epsilon S = \frac{2y^2 \epsilon y}{p}$ (508. Fig. 21. 488. §.), hinc, cum pro $x = AP = 0$ debeat fieri $S = AMP = 0$, invenietur $S = AMP = \frac{2}{3p} y^3$ (247. 238. §.) $= \frac{2}{3} yx$ (508. §.): spatium $S = AMP$ aequatur ergo duabus tertiis rectanguli MdAP.

518. Corollarium 10.

Si pro $x = Ba$, $y = aP$ (18. Fig.) arcus BP parabola revolvatur Fig. 18 circa axem BE; nascetur conoides parabolicum $Bpp = S$, eritque ejus soliditas $S = \frac{1}{2} \pi p x^2$ (490 508. §.): sed etiam superficies rotunda conoidis Bpp per (508 491. §.) ope calculi integralis facile determinabitur.

519. DEFINITIO.

Focus parabola est punctum axeos, cui insistit ordinata semiparametro aequalis.

520. Corollarium 1.

Fig. 21. Si F (21. Fig.) supponatur esse focus parabolae, et ordinata $y = QF = \frac{1}{2}p$ pro $AF = E$ distantia foci a vertice A (519. §); debet esse $\frac{1}{4}p^2 = pE$ (508. §), unde obtinetur $E = \frac{1}{4}p$, et $p = 4E$.

521. Corollarium 2.

In parabola dat 2 E subnormalem (520. 513. §), quadratum vero cuiuslibet ordinatae est $y^2 = 4xE$ (520. 508. §). Quamobrem, ducta ex foco F ad quodcunque parabolae punctum M recta FM, cum sit $FM = \sqrt{(MP^2 + FP^2)}$, fiet $FM = x + E = AP + AF$.

522. Corollarium 3.

Si praeterea ducatur recta Md parallela axi AU, quo fiat angulus $dMT = FTM$; erit, ob $FT = FM$ (521. 513. §), etiam angulus $FMT = FTM = dMT$: tangens TM bissecat igitur angulum dMF.

523. Problema.

Invenire aequationem ad parabolam inter abscissas $u = Mn$ in recta ML axi AU parallela a puncto M, cujus distantia $MP = a$ ab axe data sit, computatas, et ordinatas $qn = z$ tangenti TM parallelas.

Solutio.

1. Pro ordinata orthogona $y = q^r$ et abscissa $x = Aq^r$ erit $y = a + qr$, et $x = AP + u + nr$.

2. Est autem $AP = \frac{a^2}{p}$ (508. §), $TP = \frac{2a^2}{p}$, $TM = \frac{a}{p} \sqrt{(p^2 + 4a^2)}$ per (512. §); hinc, ob similitudinem triangulorum qnr , MTP , fiet $qr = \frac{pz}{\sqrt{(p^2 + 4a^2)}}$ et $nr = \frac{2az}{\sqrt{(p^2 + 4a^2)}}$.

3. Per (2) determinabitur y et x in (1), atque his valoribus in (508. §) substitutis obtinebitur sequens aequatio.

$$z^2 - \left(\frac{p^2 + 4a^2}{p} \right) u = 0.$$

524. Corollarium.

Cuivis abscissae $u = Mn$ respondet duplex ordinata, una positiva $z = nq$, et altera negativa $z = np$, priori aequalis: recta ML axi AU parabolae parallela bissecat igitur omnem chordam qp tangenti ad M paral-

parallelam; consequenter omnis recta ML est una *diameter* parabolae, sicut ad omne punctum M una tangens TM potest duci (438 §.).

525. DEFINITIO.

Curva, cujus naturam exprimit aequatio $y^2 = \frac{b^2 x}{a} - \frac{b^2 x^2}{a^2}$ inter coordinatas x, y , rectasque constantes a, b vocatur *Ellipsis*.

526. Corollarium 1.

Sumto in axe abscissarum VU (22. Fig.) puncto A pro origine abscissarum; erit in ellipsi ordinata $y=0$ tam pro $x=0$ quam pro abscissa positiva $x=a=AB$; cuivis autem abscissae negativae $x=-Ar$, et positivae $x=Ar' > AB=a$ respondebit ordinata y imaginaria: cuilibet demum abscissae positivae $x=AP < AB=a$ respondebit duplex ordinata, una positiva $y=MP$, et altera negativa $y=-Pm$ priori aequalis, utraque, abscissa $x=AP$ continuo crescente, primum crescens usque dum fiat $y=DC=CE=\frac{1}{2}b$ pro $x=AC=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}a$, tum decrescens, abscissa crescente ultra AC, ita ut ordinatae $MP=mP$ et $Qp=qP$ aequidistantes a medio puncto C rectae AB inter se debeant esse aequales (525. §.).

527. Corollarium 2.

Si ducatur chorda mq vel MQ parallela lineae abscissarum UV, et ex punctis m, q vel M, Q ducantur ordinatae mP, qp, vel MP, Qp, debebit esse $mP=qp$, et $MP=Qp$: ordinatae mP et qp, vel MP et Qp, jacent igitur in aequalibus distantis a medio puncto C rectae AB (526. §.); consequenter recta DE in puncto C ad AB perpendicularis bissecat omnem chordam mq vel MQ in n.

528. Corollarium 3.

Et quaevis chorda mQ transiens per medium punctum C rectae AB bissecatur in C. Ductis enim ordinatis Qp, mP debebit esse $Cp=CP$, eoque ipso etiam $QC=mC$: secus enim esset e. gr. $CP > Cp$, adeoque aliqua $C\alpha=Cp$; hinc ordinata $\gamma x=qp=Qp$ (526. §.), proinde angulus $\alpha C \gamma = Q C p$, quod est impossibile, quin sit angulus $\alpha C \gamma = P C m$, punctumque α in P jaceat.

529. Corollarium 4.

Ellipsis continetur spatio finito ADBEA, habetque quatuor *Vertices* A, B, D, E, et duos *Axes* $AB=a$, $DE=b$ in Centro C sese bissecantes,
Volumen I. ff quorum

quorum quivis totam ellipsim in duas partes congruentes, inter se similes et aequales dividit (526. 527. 528. 438. 439. §.): $AB = a$ vocant *axem principalem*, seu *transversum*, et $DE = b$ *axem secundarium* seu *conjugatum* (438. §.).

530. Corollarium 5.

Pro $Qp = y$, $Ap = x$, $Cp = u$ erit $x = \frac{1}{2}a + u$: pro hoc ergo valore loco x in (525. §.) obtinebitur aequatio $y^2 = \frac{1}{4}b^2 - \frac{b^2 u^2}{a^2}$ ad ellipsim inter ordinatas $y = Qp$ et abscissas $u = Cp$ a centro C computatas.

531. Corollarium 6.

In (525. §.) est $\epsilon y = \frac{b(a - 2x)\epsilon x}{2a\sqrt{(ax - x^2)}}$ positivi vel negativi valoris, prout est $x < \frac{1}{2}a$ vel $x > \frac{1}{2}a$, abscissis $x = AP$ vel $= Ap$ a vertice A computatis: tangens ad quodlibet punctum ellipseos cum subtangente cadet ergo ad eandem partem ordinatae, ad quam jacet origo A abscissarum, vel ad partem oppositam, prout punctum contactus in primo quadrante AD aut quarto EA , vel in secundo DB aut tertio BE jacuerit (500. §. 3. n.).

532. Corollarium 7.

Sic etiam ex (530. §.) obtinebitur $\epsilon y = -\frac{2bu\epsilon u}{a\sqrt{(a^2 - 4u^2)}}$ pro quavis abscissa u a centro C computata valoris negativi; unde per (500. §. 3. n.) sequitur, tangentem ad quodvis punctum ellipseos cum subtangente cadere ad partem ordinatae illi oppositam, ad quam jacet centrum C .

533. Corollarium 8.

Sumtis abscissis u a centro computatis, si T tangentem, sT subtangentem, N normalem, et sN subnormalem denotet, obtinebimus ex (532. 502. §.), sequentes expressiones:

$$T = \frac{y}{2bu} \sqrt{(a^4 - 4u^2(a^2 - b^2))}; \quad sT = \frac{a^2 - 4u^2}{4u};$$

$$N = \frac{b}{2a^2} \sqrt{(a^4 - 4u^2(a^2 - b^2))}; \quad sN = \frac{ub^2}{a^2}.$$

534. Corollarium 9.

Si tangens occurrat ordinatae in puncto contactus sub angulo m , et axi transverso AB sub angulo n ; habebimus ob (532. §.) per (500. §. 4. n.) pro magnitudine absoluta horum angulorum sequentem formulam, quae eo deter-

determinato casu, quo fuerit $u=0$ vel $u=\frac{1}{2}a$ dabit $\cos m=0$ vel $\sin n=1$: nimirum tangens ad verticem axeos conjugati DE est huic axi perpendicularis, et parallela axi transverso AB; tangens vero ad verticem axeos transversi AB est eidem perpendicularis, et parallela axi conjugato DE.

$$\cos m = \sin n = \frac{2bu}{\sqrt{(a^4 - 4u^2(a^2 - b^2))}}.$$

535. Corollarium 10.

Pro $\mu=DQ$ erit $\varepsilon\mu = \frac{\varepsilon u \sqrt{(a^4 - 4u^2(a^2 - b^2))}}{\sqrt{(a^4 - 4u^2(a^2 - b^2))}}$ per (532. 469. §.); quodsi ergo integrale hujus exponentis per (359. 238. §.) ita determinetur, ut pro $u=0$ fiat quoque $\mu=0$; obtinebitur arcus $\mu=DQ$ debitus abscissae $u=Cp$; adeoque pro $u=CB=\frac{1}{2}a$ obtinebitur quadrans ellipsoeos DB.

536. Corollarium 11.

Et pro $S=DCpQ$ erit per (488. 530. §.) $\varepsilon S = \frac{b}{2a} \varepsilon u \sqrt{(a^2 - 4u^2)}$; hinc, quia debet fieri $S=DCpQ=0$ pro $u=Cp=0$, inveniemus per (289. 238. §.) $S=DCpQ = \frac{bu}{4a} \sqrt{(a^2 - 4u^2)} + \frac{ba}{8} \text{ArcSin} \frac{2u}{a}$. Quamobrem pro $u=\frac{1}{2}a$, quo casu sit $\text{ArcSin} \frac{2u}{a} = \text{ArcSin} 1 = \frac{1}{2}\pi$, obtinebitur area quadrantis elliptici $DCB = \frac{1}{8}ab\pi$: area igitur totius ellipsoeos $ADBEA = \frac{1}{4}ab\pi$ est ad aream $\frac{a^2\pi}{4}$ circuli, qui super axe $AB=a$ transverso tanquam diametro descriptus cogitetur, sicut axis conjugatus b ad transversum a .

537. Corollarium 12.

Si pro $Ba=x$, $aP=y$ arcus ellipsoeos BP (18. Fig.) revolvatur circa axem transversum, generabit is segmentum $S=BPP$ sphaeroidis elliptici, cujus genesis revolutione totius ellipsoeos circa axem transversum absolvetur: igitur per (490. 525. §.) reperietur εS , unde integrando per (249. 238. §.) obtinebimus soliditatem segmenti $S=BPP = \frac{\pi b^2}{6a^2} (3ax^2 - 2x^3)$. Hinc pro $x=\frac{1}{2}a$ invenietur soliditas dimidii sphaeroidis elliptici $= \frac{\pi ab^2}{12}$, et soliditas integri sphaeroidis $= \frac{\pi ab^2}{6}$.

538. Corollarium 13.

Sic per (491. 525. §.) ope calculi integralis quaeri poterit superficies rotunda cujuslibet segmenti, et dimidii, integrique sphaeroidis elliptici (537. §.)

539. DEFINITIO.

Parameter axeos transversi a in ellipsi est tertia geometricae proportionalis $p = \frac{b^2}{a}$ post axem transversum a et conjugatum b ; punctum vero in axe transverso a , cui insistit ordinata aequalis semiparametro $\frac{1}{2}p$ vocatur *Focus*, et hujus distantia a centro ellipseos *Excentricitas*, quam deinceps littera c designabit.

540. Corollarium 1.

Valor $b^2 = ap$ (539. §.) substitutus in (525. 530. §.) dabit sequentes aequationes ad ellipsim inter ordinatam y , et abscissam x a vertice axeos transversi a , abscissamque u a centro computatam.

$$y^2 = px - \frac{p x^2}{a}. \quad y^2 = \frac{1}{4}ap - \frac{p u^2}{a}.$$

541. Corollarium 2.

Pro ordinata $y = \frac{1}{2}p$ erit abscissa, una positiva et altera negativa, $u = \pm \frac{1}{2}\sqrt{(a^2 - b^2)}$ semper valoris realis, modo axis transversus a sit major axe conjugato b : in hac hypothese habebit igitur ellipsis in axe transverso AB (23. Fig.) duos focos F, f in aequalibus a centro C distantibus CF, Cf , eritque excentricitas $CF = Cf = c = \frac{1}{2}\sqrt{(a^2 - b^2)}$ per (539. §.).

542. Corollarium 3.

Denotante $E = Bf = AF$ distantiam cujuslibet foci f, F a proximo vertice B, A , erit in ellipsi $4c^2 = a^2 - b^2$; $E = \frac{1}{2}a - c$; $p = a - \frac{4c^2}{a} = 4\left(E - \frac{E^2}{a}\right)$ per (541. 539. §.).

543. Corollarium 4.

Posita ordinata $MP = y$ pro abscissa $CP = u$, ductisque ad M ex focis f, F rectis fM, FM , erit $fM = \pm\sqrt{(y^2 + (c+u)^2)}$, et $FM = \pm\sqrt{(y^2 + (c-u)^2)}$: substitutis itaque valoribus loco y^2, c^2 ex (530. 542. §.) obti-

obtinebimus $fM = \pm \left(\frac{a}{2} + \frac{2cu}{a} \right)$ et $FM = \pm \left(\frac{a}{2} - \frac{2cu}{a} \right)$. Verum, quia pro $u = CA = \frac{1}{2}a$ debet fieri $fM = fA = c + \frac{1}{2}a$, et $FM = FA = \frac{1}{2}a - c$, perspicuum est, esse re ipsa $fM = \frac{a}{2} + \frac{2cu}{a}$ et $FM = \frac{a}{2} - \frac{2cu}{a}$.

544. Corollarium 5.

In ellipsi est summa rectarum $fM + FM$ ex focus ad quodvis punctum M ductarum aequalis axi $a = AB$ transverso (543. §.): eapropter est recta $fD = FD$ ex quovis foco ducta ad verticem axeos conjugati DE aequalis semiaxi transverso $AC = \frac{1}{2}a$.

545. Corollarium 6.

Ducta ad punctum M tangente TS , quae axi transverso AB in T occurrat, debet esse per (533. §.)

$$TA = \frac{a^2 - 2au}{4u}, \quad TF = \frac{a^2 - 4cu}{4u}, \quad Tf = \frac{a^2 + 4cu}{4u}.$$

546. Corollarium 7.

Datis distantis puncti intersectionis T tangents TS et axeos transversi AB in ellipsi a focus f, F , dataque ordinata $MP = y$ ad punctum contactus, dabitur eo ipso tangens $TM = \frac{2MP}{b} \sqrt{TF \cdot Tf}$ per (545. 542. 533. §.).

547. Corollarium 8.

Ducta ex foco F parallela Fm rectae fM ; erit $TF : Fm = Tf : fM = a : 2u$ (545. 543. §.); hinc fiet $Fm = TF \cdot \frac{2u}{a} = FM$ (545. 543. §.): et ideo erit quoque angulus $FmM = FMm$. Tangens cum rectis ex utroque foco ad punctum contactus ductis comprehendit igitur in ellipsi angulos aequales fMS et FMT ; normalis MN idcirco bissecat angulum fMF (419 §.).

548. Corollarium 9.

Aequatio ad ellipsum pro abscissis $x = AP$ (22. Fig.) a vertice A computatis (540. §.) dabit εy et $\frac{2}{\varepsilon} y$ per a, p, x , eritque $\frac{2}{\varepsilon} y$ pro quavis abscissa x valoris negativi: ellipsis obvertit nimirum in quovis puncto M

concavitatem axi transverso AB (461. §.); radius vero curvedinis in M comprehendetur ob (472. §.) sequenti formula, ex qua pro $x=0$, et $x=a$ obtinetur $r=\frac{1}{2}p$ radius curvedinis in utroque vertice A, B axeos transversi AB, et, pro $x=\frac{1}{2}a$, $r=\frac{a^{\frac{3}{2}}}{2p^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{2}a\sqrt{\frac{a}{p}}$ radius curvedinis in utroque vertice D, E axeos conjugati.

$$r = \frac{1}{2p^2} \left(p^2 + \frac{4p}{a^2} (p-a)x^2 + \frac{4p}{a} (a-p)x \right)^{\frac{3}{2}}.$$

549. Corollarium 10.

Fig. 23. Pro recta FM=z ex foco F ellipseos ad punctum M sub variabili angulo $\gamma=MFB$ ducta erit $z=\frac{1}{2}a-\frac{2cu}{a}$ (543. §.), et $u=CP=CF-FP=c-z\cos\gamma$, hinc et (542. §.) $z=\frac{\frac{1}{2}b^2}{a-2c\cos\gamma}$: quodsi ergo ponatur area sectoris BMF=S; erit $\epsilon S=\frac{\frac{1}{8}b^4\epsilon\gamma}{(a-2c\cos\gamma)^2}$ per (489. §.), atque hic exponens differentialis per (333. §.) integratus, ita ut pro $\gamma=0$ integrale evanescat, dabit aream BMF.

550. DEFINITIO.

Curva, cujus naturam exprimit aequatio $y^2=\frac{b^2x}{a}+\frac{b^2x^2}{a^2}$ inter co-ordinatas x, y et constantes rectas a, b vocatur *Hyperbola*.

551. Corollarium 1.

Fig. 24. Sumta origine abscissarum in puncto A rectae VU (24. Fig.) erit in hyperbola ordinata $y=0$ tam pro $x=0$ quam pro abscissa negativa $x=-AB=-a$: cuius porro abscissae negativae $x=-Av$, existente $Av<AB=a$, respondebit ordinata y imaginaria; et cuilibet abscissae tam positivae $x=Ap$, quam negativae $x=-AP$, existente $AP>AB=a$, respondebit duplex ordinata y, una positiva, $y=Qp$ casu primo et $y=MP$ casu secundo, altera vero negativa priori aequalis, $y=-pq$ casu primo et $y=-Pm$ casu secundo, utraque in indefinitum crescens, abscissa continuo crescente, ita ut ordinatae $Qp=pq$ et $MP=Pm$ aequidistantes a punctis A, B inter se aequales sint (550. §.)

552. Corollarium 2.

Hinc (551. §.) eadem ratione, qua id pro ellipsi demonstravimus (527, 528. §.), elucet, omnem chordam MQ , mq perallem lineae abscissarum VU a recta DE bissecari in n , si DE ad rectam AB in puncto medio C sit perpendicularis; omnemque chordam Qm transeuntem per C bissecari in C .

553. Corollarium 3.

Hyperbola extenditur per spatium indefinitum, habetque quatuor ramos AR , AS , Br , Bs , quorum bini priores in puncto A , bini vero posteriores in B concurrunt, tum illi et hi juxta lineam abscissarum AB in indefinitum excurrentes eo magis ab illa recedunt, quo magis producuntur (551. 437. §.). Habet praeterea hyperbola unum *Axem* $AB=a$ definitae longitudinis, et duos *Vertices* A , B ; alter autem *Axis* DE priorem in Centro C bissecans, atque ad hunc perpendicularis, in se indefinitae longitudinis (551. 552. 438. 439. §.), potest poni $=b$. Hoc modo habebimus in hyperbola, sicut in ellipsi, axem *principalem* seu *transversum* $AB=a$, et *secundarium* seu *conjugatum* $DE=b$.

554. Corollarium 4.

Axis transversus AB , utrinque productus, dividit spatium inter quamvis chordam Qq vel Mm ei perpendicularem arcumque QAq vel MBm interceptum in duas partes congruentes, ideoque inter se similes et aequales: chordae vero Qq , Mm aequidistantes a centro C et perpendiculares axi AB abscindunt segmenta QAq , MBm congruentia, inter se similia et aequalia (551. §.).

555. Corollarium 5.

Pro $Qp=y$, $Ap=x$, $Cp=u$ erit $x=Cp-CA=u-\frac{1}{2}a$: hinc et ex (550. §.) obtinetur aequatio $y^2=\frac{b^2u^2}{a^2}-\frac{1}{4}b^2$ ad hyperbolam pro abscissis a centro C computatis.

556. Corollarium 6.

Prior aequatio (550. §.) pro abscissis $x=Ap$ a vertice A computatis dat $\varepsilon y=\frac{b(1+2x)\varepsilon x}{2a\sqrt{(ax+x^2)}}$; et posterior (555. §.) pro abscissis $u=Cp$ a centro C computatis dat $\varepsilon y=\frac{2bueu}{a\sqrt{(4u^2-a^2)}}$: utroque casu
est

est ergo ϵy pro omnibus abscissis, tam positivis, quam negativis, quibus reales ordinatae respondent (551. §.), valoris positivi; unde per (500. §. 3. n.) sequitur, tangentem cum subtangente ad quodlibet punctum hyperbolae ad eandem partem ordinatae cadere, ad quam jacet origo abscissarum sumta in vertice A, vel centro C.

557. Corollarium 7.

Sit T tangens ad quodcunque hyperbolae punctum ducta, sT subtangens, N normalis, sN subnormalis, y ordinata ad punctum contactus, u abscissa a centro computata, m angulus inter tangentem et ordinatam, et n angulus inter tangentem et axem transversum; erit per (556. 502. §.).

$$T = \frac{y}{2bu} \sqrt{(4u^2(b^2 + a^2) - a^4)}; \quad sT = \frac{4u^2 - a^2}{4u};$$

$$N = \frac{b}{2a^2} \sqrt{(4u^2(b^2 + a^2) - a^4)}; \quad sN = \frac{ub^2}{a^2};$$

$$\sin n = \cos m = \frac{2bu}{\sqrt{(4u^2(b^2 + a^2) - a^4)}}.$$

558. Corollarium 8.

Pro $u = \pm \frac{1}{2}a$ fiet (557. §.) $\sin n = \frac{\pm ba}{\sqrt{b^2(\pm \frac{1}{2}a)^2}} = \frac{\pm ba}{\pm ba} = 1$: tangens ergo in vertice hyperbolae A vel B est perpendicularis ad axem transversum AB.

559. Corollarium 9.

Posito hyperbolae arcu $\mu = AQ$, obtinebimus pro abscissis $u = Cp$ a centro computatis per (556. 469. §.) $\epsilon \mu = \frac{\epsilon u \sqrt{(4u^2(a^2 + b^2) - a^4)}}{\sqrt{(4u^2 - a^2)}}$: quodsi igitur hic exponens differentialis ita integretur, ut integrale $\mu = AQ$ pro $u = CA = \frac{1}{2}a$ fiat aequale nihilo, unde constantis pendet determinatio (238. §.); obtinebitur arcus $\mu = AQ$ cuivis abscissae $u = Cp$ debitus.

560. Corollarium 10.

Pro spatio autem $S = AQP$ habebimus per (555. 488. §.) $\epsilon S = \frac{b}{2a} \epsilon u \sqrt{(4u^2 - a^2)}$: inveniatur igitur spatium AQP cuivis abscissae $u = Cp$ respondens, si ϵS per (289. 238. §.) sic integretur, ut pro $u = CA = \frac{1}{2}a$ fiat integrale $S = AQP = 0$.

561. Co-

561. Corollarium 11.

Arcus BP (18. Fig.) hyperbolae, respondens abscissae $x = Ba$, et or. Fig. 18. dinatae $y = aP$, revolutus circa axem transversum BE (553. §.) generabit conoidem hyperbolicum PBP, cujus soliditas $S = \frac{\pi b^2}{6a^2} (3ax^2 + 2x^3)$ ope calculi integralis per (490. 550. 249. §.) facile determinatur: superficiem autem eius rotundam S per (491. 550. §.) pariter ope calculi integralis licebit determinare.

562. Corollarium 12.

Si ad vertices A, B hyperbolae (25. Fig.) ponantur perpendiculara GH, gh bissecta ita, ut dimidium cujuslibet perpendiculari AG, AH, Bg, Bh aequetur femiaxi conjugato $\frac{1}{2}b$, tum per centrum C ducantur rectae LL', L'l; erit pro quavis abscissa $u = CP$, et ordinata $y = MP$ in m producta, $mP = \frac{bu}{a}$: igitur $mP^2 - MP^2 = \frac{1}{4}b^2$ (555. §.), et ideo $mM = \frac{b^2}{4(mP + MP)}$. Crescente itaque abscissa $u = CP$ in indefinitum, decrescet continuo mM, quin sit possibile, ut pro certa abscissa $u = CP$ fiat $mM = 0$; quia secus fieret etiam $b^2 = 0$: rectae CL, Cl, CL', Cl' sunt ergo asymptoti ramorum AK, Ak, BK', Bk' (437. §.).

563. DEFINITIO.

Parameter hyperbolae est tertia geometrice proportionalis $p = \frac{b^2}{a}$ post axem ejus transversum a et conjugatum b: punctum axeos transversi, in quo ordinata aequatur semiparametro, est Focus, et hujus distantia a centro hyperbolae Excentricitas c.

564. Corollarium 1.

Per (563. 550. 555. §.) obtinebimus sequentes aequationes ad hyper. Fig. 26. bolam pro abscissis $x = AP$ (26. Fig.) a vertice A, et aliis $u = CP$ a centro C computatis.

$$y^2 = px + \frac{p x^2}{a}. \quad y^2 = \frac{p u^2}{a} - \frac{1}{4}ap.$$

565. Corollarium 2.

Posita ordinata $y = \frac{1}{2}p$ erit abscissa $u = \pm \frac{1}{2}\sqrt{(a^2 + b^2)}$ per (555. §.), una positiva, et altera negativa, priori aequalis: hyperbola habet ergo in axe transverso AB utrinque producto duos focos F, f in aequalibus a

centro C distantis CF, Cf, quo fit ut excentricitas sit $c = \frac{1}{2}\sqrt{(a^2 + b^2)}$ per (563. §.).

566. Corollarium 3.

Sit $E = FA = fB$ distantia cujusvis foci hyperbolae a proximo vertice; erit $4c^2 = a^2 + b^2$; $E = c - \frac{1}{2}a$; $p = \frac{4c^2}{a} - a = 4\left(E + \frac{E^2}{a}\right)$ per (565. 563. §.).

567. Corollarium 4.

Ductis ex utroque foco ad punctum M hyperbolae rectis fM, FM, erit $fM = \pm\sqrt{(y^2 + (c+u)^2)}$ et $FM = \pm\sqrt{(y^2 + (u-c)^2)}$: per (555. 566. §.) fiet ergo $fM = \pm\left(\frac{a}{2} + \frac{2cu}{a}\right)$ et $FM = \pm\left(\frac{a}{2} - \frac{2cu}{a}\right)$. Cum autem pro $u = \frac{1}{2}a = CA$ debeat fieri $fM = fA = c + \frac{1}{2}a$, et $FM = FA = c - \frac{1}{2}a$; debet esse $fM = \frac{a}{2} + \frac{2cu}{a}$, et $FM = \frac{a}{2} - \frac{2cu}{a}$.

568. Corollarium 5.

Differentia rectarum fM — MF ex focis hyperbolae ad quodvis ejus punctum M ductarum aequatur axi transverso AB = a.

569. Corollarium 6.

Si ad punctum M ducatur tangens TS axi transverso occurrens in T, petanturque distantiae hujus puncti a focis f, F, et vertice A, habebimus per (557. §.)

$$TA = \frac{2au - a^2}{4u}; \quad TF = \frac{4cu - a^2}{4u}; \quad Tf = \frac{a^2 + 4cu}{4u}.$$

570. Corollarium 7.

Datis autem distantis TF, Tf, et ordinata $y = MP$ ad punctum contactus, dabitur tangens $TM = \frac{2y}{b}\sqrt{TF \cdot Tf}$ (569. 557. §.).

571. Corollarium 8.

Ducatur ex foco F recta fm parallela alteri fM, erit $TF; Fm = Tf; fM = a:2u$ (569. 567. §.): erit itaque $Fm = TF \cdot \frac{2u}{a} = FM$ (569. 567. §.); proinde etiam angulus $FmM = FMM$. Tangens TM ducta ad punctum M hyperbolae comprehendit cum rectis fM, FM, ex utroque foco ad idem punctum ductis, angulos fMT, FMT aequales: hinc, producta fM in R, normalis MN bissecat angulum FMR (419. §.).

572. Corollarium 9.

Aequatio ad hyperbolam pro abscissis x a vertice A computatis (564. §.) dabit exponentes differentiales εy , $\varepsilon^2 y$ per x , a , p , eritque $\varepsilon^2 y$ pro quavis abscissa valoris negativi: hyperbola obvertit idcirco axi transverso AB concavitatem in omnibus punctis (461. §.); radius autem curvaturae pro quovis hyperbolae puncto potest per (472. §.) sequenti formula exprimi, quae, posita abscissa $x=0$ vel $x=-a=AB$, utroque casu dat $r=\frac{1}{2}p$ pro radio curvaturae in utroque vertice A , B .

$$r = \frac{1}{2p^2} \left(p^2 + \frac{4p}{p^2} (p+a)x^2 + \frac{4p}{a} (p+a)x \right)^{\frac{1}{2}}$$

573. Problema.

Dato Angulo $dCA=\alpha$, sub quo in ellipsi et hyperbola (27. 28. Fig.) Fig. 27.28. chorda cd per centrum C transiens inclinatur ad axem transversum AB , invenire aequationem ad utramque curvam inter abscissas $Cm=v$ in eadem chorda a centro computatas, et ordinatas $z=nm$ sub angulo $n\vee C=\mu$ ad axem transversum AB inclinatam.

Solutio.

1. Ordinata orthogona ad punctum n sit $np=y$ respondens abscissae $Cp=u$; sit porro ms parallela ordinatae np , et mr parallela axi BA : erit

$$y=rp+nr \text{ in Ellipsi et Hyperbola;}$$

$$u=ps-Cs \text{ in Ellipsi, et } u=ps+Cs \text{ in Hyperbola.}$$

2. Quare, cum sit $rp=v \sin \alpha$; $nr=z \sin \mu$, $Cs=v \cos \alpha$, $ps=z \cos \mu$, habebimus

$$y=z \sin \mu + v \sin \alpha \text{ in Ellipsi et Hyperbola;}$$

$$u=z \cos \mu - v \cos \alpha \text{ in Ellipsi;}$$

$$u=z \cos \mu + v \cos \alpha \text{ in Hyperbola.}$$

3. Si jam hos valores substituas loco y , u in aequationibus ad ellipsim et hyperbolam (530. 555. §.), obtinebis sequentem aequationem, adhibitis signis superioribus pro ellipsi, et inferioribus pro hyperbola.

$$\begin{aligned} z^2 + \frac{2(a^2 \sin \mu \sin \alpha - b^2 \cos \mu \cos \alpha) v z}{a^2 \sin^2 \mu + b^2 \cos^2 \mu} \\ + \frac{4(a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha) v^2 + a^2 b^2}{4(a^2 \sin^2 \mu + b^2 \cos^2 \mu)} = 0. \end{aligned}$$

574. Corollarium 1.

Ducta ad d tangente Td supponatur ordinata $z = nm$ esse ei parallela; erit angulus $\mu = n^v C = dTC$: quodsi ergo de sit perpendicularis ad AB, fiet $\frac{de}{Te} = \frac{\sin \mu}{\text{Cof } \mu}$, $\frac{de}{Ce} = \frac{\sin \alpha}{\text{Cof } \alpha}$, hinc $\frac{de^2}{Te \cdot Ce} = \frac{\sin \mu \sin \alpha}{\text{Cof } \mu \text{Cof } \alpha}$. Quamobrem, cum pro $de = y$, $Ce = u$, subtangenteque Te per (530. 533. 555. §.) debeat esse $\frac{de^2}{Te \cdot Ce} = \frac{b^2}{a^2}$; erit in ellipsi et hyperbola $\frac{b^2}{a^2} = \frac{\sin \mu \cdot \sin \alpha}{\text{Cof } \mu \cdot \text{Cof } \alpha}$, et $b^2 \text{Cof } \mu \text{Cof } \alpha = a^2 \sin \mu \sin \alpha$.

575. Corollarium 2.

Pro ordinatis $z = nm$ tangenti Td parallelis abibit praecedens aequatio (573. §.), evanescente secundo termino ob (574. §.), in sequentem. Haec autem aequatio dabit pro qualibet abscissa $v = \pm C m$ positiva et negativa duplicem ordinatam z, unam positivam, et alteram negativam priori aequalem: quaevis ergo chorda principalis dc per centrum ellipseos aut hyperbolae transiens est una *Diameter* ejusdem curvae, omnes chordas nN, n¹N¹ tangenti ad punctum d parallelas bissecans (438. §.).

$$z^2 + \frac{4(a^2 \sin \alpha^2 + b^2 \text{Cof } \alpha^2)v^2 \mp a^2 b^2}{4(a^2 \sin \mu^2 + b^2 \text{Cof } \mu^2)} = 0.$$

576. Corollarium 3.

In ellipsi erit chorda ab *diameter conjugata* diametri de, si ab sit tangenti Td parallela (575. 438. §.): in hyperbola nulla datur chorda per centrum C transiens tangenti Td parallela; licebit tamen rectam ab parallelam tangenti pro *diametro conjugata* diametri cd hyperbolae sumere (575. 438. §.). Itaque in ellipsi et hyperbola erit diameter cd aequalis duplo valori abscissae v pro $z = 0$; diameter autem conjugata ab aequari debet duplo valori ordinatae z pro $v = 0$: quare, denotante n diametrum cd, et m diametrum conjugatam ab; obtinebuntur ex (575. §.) sequentes formulae pro iisdem diametris, signis superioribus pro ellipsi, et inferioribus pro hyperbola adhibitis, nulla ratione habita imaginareitatis, qua diameter conjugata m hyperbolae afficitur, unde nihil aliud sequitur, quam quod diameter conjugata nulli hyperbolae puncto occurrat, sicut id posito $u = 0$ in (555. §.) pro axe conjugato b aequatio ad hyperbolam inter y, u ostendit.

$$m = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 \text{Cof } \mu^2 \pm a^2 \text{Sin } \mu^2)}} \quad n = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 \text{Cof } \alpha^2 \pm a^2 \text{Sin } \alpha^2)}}$$

577. Corollarium 4.

Dato angulo $\alpha = \angle CA$ inclinationis diametri dc ad axem transversum AB ellipseos aut hyperbolae, datisque axibus a, b poterit determinari angulus $\mu = \angle CA$ inclinationis diametri conjugatae ab ad axem AB , et eo ipso etiam angulus conjugationis $\angle Cd = \alpha + \mu$ diametrorum cd, ab : erit enim ob (574. §) in utraque curva

$$\text{Tang } \mu = \frac{b^2}{a^2} \text{Cot } \alpha; \quad \text{Sin } \mu = \frac{b^2 \text{Cof } \alpha}{\sqrt{(a^4 \text{Sin } \alpha^2 + b^4 \text{Cof } \alpha^2)}};$$

$$\text{Cof } \mu = \frac{a^2 \text{Sin } \alpha}{\sqrt{(a^4 \text{Sin } \alpha^2 + b^4 \text{Cof } \alpha^2)}}.$$

578. Corollarium 5.

Hinc (576. 577. §.) nascentur pro diametris m, n ellipseos et hyperbolae sequentes formulae I) II), et ex iis per (577. §.) obtinebuntur formulae III) IV).

$$\text{I. } m = b \sqrt{\frac{\text{Cof } \alpha}{\text{Sin } \mu \text{Sin } (\alpha + \mu)}}; \quad \text{II. } n = b \sqrt{\frac{\text{Cof } \mu}{\text{Sin } \alpha \text{Sin } (\alpha + \mu)}};$$

$$\text{III. } mn = \frac{ab}{\text{Sin } (\alpha + \mu)}; \quad \text{IV. } ab = mn \text{Sin } (\alpha + \mu).$$

579. Corollarium 6.

Si valores pro $\text{Sin } \mu^2$ et $\text{Cof } \mu^2$ ex (577. §.) in (576. §.) substituantur, tum pro ellipsi quaeratur summa, pro hyperbola vero differentia quadratorum diametrorum conjugatarum n^2, m^2 ; erit $n^2 + m^2 = a^2 + b^2$ in ellipsi, et $n^2 - m^2 = a^2 - b^2$ in hyperbola.

580. DEFINITIO.

Binae curvae veterum, *Cissois* et *Conchois*, offerunt exempla curvarum Fig. 29. algebraicarum tertii et quarti ordinis. Si super data recta An (29. Fig.) tanquam diametro describatur circulus $AdntA$. et ad punctum n ponatur tangens pq perpendicularis ad An , tum, abscissis quibuscunque partibus aequalibus na, nb in pq , ductisque ex A rectis Aa, Ab circuli peripheriam in c, d secantibus, fiat $AM = ca$, $Am = db$; curva, quae per puncta M, m hoc modo determinabilia transiverit, erit *Cissois*.

581. Corollarium 1.

Pro coordinatis orthogonis $AP=x$, $MP=y$ erit in cissoide $AM^2=ca^2=y^2+x^2$: cum igitur sit $ca^2:an^2=an^2:Aa^2=an^2:(an^2+An^2)$, et $an^2:An^2=MP^2:AP^2$, proinde $an^2=\frac{An^2 \cdot MP^2}{AP^2}$; habebimus, pro radio r , et diametro $An=2r$

$$(y^2+x^2):\frac{4r^2y^2}{x^2}=\frac{4r^2y^2}{x^2}:\left(\frac{4r^2y^2}{x^2}+4r^2\right);$$

$$\text{hinc } x^2(y^2+x^2)^2=4r^2y^4, \text{ et } xy^2+x^3=2ry^2.$$

Aequatio ad cissoidem erit itaque

$$x^3+xy^2-2ry^2=0.$$

582. Corollarium 2.

Aequatio ad cissoidem dat $y^2=\frac{x^3}{2r-x}$: cuivis ergo abscissae negativae $x=-Ae$ respondet ordinata y imaginaria: pro $x=0$ autem, fiet etiam ordinata $y=0$: cuilibet porro abscissae positivae $x=AP$ modo ea sit minor duplo radio $2r=An$, respondebit duplex ordinata, una positiva $y=MP$, et altera negativa $y=-mP$ priori aequalis, utraque continuo crescens, abscissa $x=AP$ indefinenter crescente, usque $x=An=2r$, quo casu induit ordinata y valorem indefinite magnum.

583. Corollarium 3.

Quamobrem, si etiam in origine A abscissarum ponatur ad An perpendicularis p^1q^1 , continebitur tota cissois inter perpendiculares pq , p^1q^1 in indefinitum productas, constans duobus ramis AR , AS ad diversas partes lineae abscissarum An jacentibus, qui ex origine abscissarum A egredientes juxta illarum axem An et perpendiculum pq excurrent in indefinitum, ita ut ii, quo magis producti fuerint, eo magis sint recessuri a diametro An , eo magis vero accessuri ad perpendiculum pq (582. §.): pq est itaque asymptotus ramorum AR , AS .

584. Corollarium 4.

Aequatio ad cissoidem (581. §.) dabit pro y , ϵy , $^2\epsilon y$, sequentes expressiones.

$$y=\sqrt{\frac{x^3}{2r-x}}; \epsilon y=\frac{(3r-x)x^{\frac{1}{2}}\epsilon x}{(2r-x)^{\frac{1}{2}}}; ^2\epsilon y=\frac{3r^2\epsilon x^2}{x^{\frac{1}{2}}(2r-x)^{\frac{3}{2}}}.$$

Quare,

Quare, cum semper debeat esse $x \leq 2r$ (582. §.), patet, utrumque exponentem differentialem εy , εy pro quavis abscissa $x = AP$ habiturum valorem positivum; unde elucet, et ordinatas crescere, abscissis crescentibus, et cissoidem convexitatem in quovis puncto M , m obvertere axi abscissarum An (444. 461. §.).

585. Corollarium 5.

Per (584. 455. 456. §.) potest determinari tangens, subtangens, normalis, et subnormalis, situsque tangentis et subtangentis pro quovis puncto M et m : tangens cum subtangente, puta TM vel Tm cum TP , semper cadet ad partem ordinatae, ad quam jacet origo abscissarum A (584. 500. §. 3. n.); angulus vero $MTP = mTP$ dabitur per $Tang\ T = \frac{(3r-x)x^{\frac{1}{2}}}{(2r-x)^{\frac{3}{2}}}$ (500. §. 4. n.), fietque $Tang\ T = 0$ pro $x = AP = 0$: linea abscissarum An est ergo communis tangens ramorum AR , AS , et punctum A *Cuspis* cissoidis (584. 441. §.).

586. Corollarium 6.

Si petas radium curvedinis pro quocunque puncto M vel m cissoidis; invenies illum per (584. 472. §.) signo — adfectum, quod indicat, ipsum jacere in normali MN vel mN ad partem adversam tM vel tm , sic ut sit $tM = tm = \frac{rx^{\frac{1}{2}}(8r-3x)^{\frac{3}{2}}}{3(2r-x)^2}$. Radius curvedinis ad quodvis punctum M cissoidis eo minor est, quo propius punctum M accedit ad cuspidem A ; et ideo curveto cissoidis crescit continuo versus cuspidem A (430. §.).

587. Corollarium 7.

Rectificatio cissoidis ope logarithmorum potest perfici. Si enim ponas $2r-x = z$; obtinebis ex (584. §.)

$$y = \sqrt{\frac{(2r-z)^3}{z}}; \varepsilon y^2 = \frac{2r^3 + 3r^2z - z^3}{z^3} \varepsilon z^2; \varepsilon x = -\varepsilon z.$$

Pro quovis arcu $\mu = AM$ debet ergo fieri per (469. §.)

$$\varepsilon \mu = \sqrt{\left(\frac{2r^3 + 3r^2z - z^3}{z^3} \varepsilon z^2 + \varepsilon z^2 \right)} = r \varepsilon z \cdot \frac{\sqrt{(2r+3z)}}{z^{\frac{3}{2}}}.$$

Integrale autem μ hujus exponentis differentialis licebit per (303. §.) perfecte determinare.

588. Corollarium 8.

Spatium vero $S = AMP$ respondens datae cuicunque abscissae $x = AP$ determinabile est per functionem algebraico-trigonometricam. Erit enim ob (584. §.) per (488. §.)

$$\epsilon S = \frac{x^{\frac{3}{2}} \epsilon x}{\sqrt{(2r-x)}}; \quad S = \int \frac{x^{\frac{3}{2}} \epsilon x}{\sqrt{(2r-x)}}.$$

Quamobrem integrando per (302. §.) inuenimus

$$S = C - \left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2}rz^{\frac{1}{2}}\right)\sqrt{(2r-x)} + \frac{3r^{\frac{3}{2}}}{2} \text{Arc Sin } \frac{x-r}{r}.$$

Verum, cum pro abscissa $x = 0$ debeat fieri $S = MAP = 0$, et $\text{Arc Sin } \frac{x-r}{r} = \text{Arc Sin } -1 = -\frac{1}{2}\pi$; erit $C - \frac{1}{2}\pi \cdot \frac{3r^{\frac{3}{2}}}{2} = 0$, hinc $C = \frac{3}{4}\pi r^{\frac{3}{2}}$, adeoque

$$S = \frac{3}{4}\pi r^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}r\right)\sqrt{(2rx - x^2)} + \frac{3r^{\frac{3}{2}}}{2} \text{Arc Sin } \frac{x-r}{r}.$$

589. Corollarium 9.

Totum spatium intra An, AR , et np comprehensum, ramo cissoidis AR in indefinitum producto, obtinebitur ex (588. §.) pro $x = An = 2r$, nimirum $S = \frac{3}{2}\pi r^{\frac{3}{2}}$: hoc spatium est ergo triplum areae semicirculi Atn .

590. DEFINITIO.

Fig. 30. Si, datis duabus rectis EF, Ba (30. 31. 32. Fig.) sub angulo recto in 31. 32. D sese interfecantibus, capiantur in recta Ba partes $BD = DA = b$, $DC = a$ determinatae longitudinis, ut sit $b = a$ (31. Fig.), vel $b < a$ (30. Fig.) aut $b > a$ (32. Fig.), tum ex puncto C per quodvis punctum G rectae EF ducatur recta CM , fiatque $GM = GN = BD = DA = b$; jacebunt omnia hac ratione determinabilia puncta M, N in *Conchoide*. Punctum C vocatur *Polus* conchoidis; recta vero constans $b = BD = AD$ est ejus *Sagitta* seu *Parameter*, et EF *Axis* vel *Directrix*.

591. Corollarium 1.

Conchois constat duabus partibus RBS, UAV ad partes oppositas axeos EF jacentibus, quarum communis asymptotus est ipse axis EF (590. 437. §.).

592. Corollarium 2.

Si ex puncto M ad EF et Ba ducantur perpendiculara MQ, MP, erit $MQ:MG=CP:CM=(CD+MQ):\sqrt{(MP^2+CP^2)}$, adeoque $MQ^2:MG^2=(CD+MQ)^2:(DQ^2+(CD+MQ)^2)$: cum igitur sit $CD=a$, $MG=BD=DA=b$, si praeterea coordinatae orthogonae fiant $DQ=x$, $MQ=y$, habebimus pro aequatione ad conchoidem (590. §.)

$$y^2:b^2=(a+y)^2:(x^2+(a+y)^2);$$

$$y^4+2ay^3+(x^2+a^2-b^2)y^2-2ab^2y-a^2b^2=0;$$

$$(y+a)(y+a)(y+b)(y-b)+x^2y^2=0.$$

593. Corollarium 3.

Natura conchoidis, quae ope praecedentis aequationis potest explorari, pendet a relatione inter constantes rectas a , b (590. §.). Quidquid illae sint, aequales vel inaequales, deberet, pro $y=0$, fieri $a^2b^2=0$ (592 §.), quod est impossibile; impossibile ergo est, ut conchois axi EF in aliquo puncto occurrat, eumque tangat vel fecet (591. §.).

594. Corollarium 4.

Quodsi autem ponatur $x=0$, nascetur aequatio $(y+a)(y+a)(y+b)(y-b)=0$ (592. §.) quatuor radicum realium $y=-a$, $y=-a$, $y=-b$, $y=b$ (170. 175. §.): conchois potest ergo sagittae (590. §.) quater occurrere omni casu; ter ex illa axeos EF parte, ad quam polus C (590. §.) jacet, nimirum bis in distantia $a=DC$, adeoque in ipso polo C, semel vero in distantia $b=DA$, et semel ex parte opposita axeos EF in distantia $b=DB$ (492. §. 4. n.).

595. Corollarium 5.

Omnis conchois habet punctum duplex in ipso polo C (594. 440. §.). Si est distantia poli ab axe major parametro, nimirum $a=CD > b=DA$ (30. Fig.); punctum duplex in polo C est conjugatum (498. §.). Si vero est $a=DC=b=DA$ (31. Fig.); punctum duplex in polo C (594. §.) co incidit cum puncto extimo A parametri DA, estque idcirco A punctum triplex (440. §.). Si denique est $b=DA > a=DC$; punctum duplex in polo C jacet in parametro DA inter ejus puncta extima D, A (32. Fig.).

596. Corollarium 6.

Ex aequatione ad conchoidem (592. §.), sumto exponente differentiali $\varepsilon x = 1$ pro constanti, nascentur sequentes aequationes differentiales per (141. 142. §.).

$$\begin{aligned} Z &= y^4 + 2ay^3 + (x^2 + a^2 - b^2)y^2 - 2ab^2y - a^2b^2 = 0. \\ \varepsilon Z &= (2y^3 + 3ay^2 + (x^2 + a^2 - b^2)y - ab^2)\varepsilon y + xy^2\varepsilon x = 0. \\ \varepsilon Z &= \left\{ \begin{aligned} &(2y^3 + 3ay^2 + (x^2 + a^2 - b^2)y - ab^2)\varepsilon y \\ &+ (6y^2 + 6ay + x^2 + a^2 - b^2)\varepsilon y^2 \\ &+ 4xy\varepsilon y\varepsilon x + y^2\varepsilon x^2 \end{aligned} \right\} = 0. \end{aligned}$$

597. Corollarium 7.

Prima aequatio differentialis (596. §.) dabit $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} = 0$ pro $x = 0$ et $y = b = DB$ (30. 31. 32. Fig.), quidquid sit $a = DC$: omni ergo casu habebit conchois ad punctum B (594. §.) unam tangentem mn parallelam axi EF (503. §.).

598. Corollarium 8.

Sed etiam pro $x = 0$ et $y = -b = DA$, modo sit $DA > DC = a$, vel $DA < DC = a$ (32. 30. Fig.), obtinebitur $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} = 0$ ex prima aequatione differentiali $\varepsilon Z = 0$ (596. §.): igitur etiam ad punctum A conchoidis (594 §.) dabitur una tangens pq parallela axi EF (503. §.), si parameter b sit major vel minor quam distantia a poli C ab axe EF.

599. Corollarium 9.

Verum pro $x = 0$ et $y = -a$ prodibit $\frac{\varepsilon y}{\varepsilon x} = \frac{0}{0}$ ex prima aequatione differentiali $\varepsilon Z = 0$ (596. §.), unde pro situ tangentis in puncto C seu polo conchoidis nihil potest colligi. Quamobrem sumatur in subsidium secunda aequatio differentialis $\varepsilon^2 Z = 0$ (596. §.), quae pro $x = 0$ et $y = -a = DC$ dabit

$$\frac{\varepsilon x^2}{\varepsilon y^2} = \frac{b^2}{a^2} - 1, \text{ hinc } \frac{\varepsilon x}{\varepsilon y} = \pm \sqrt{\left(\frac{b^2}{a^2} - 1\right)}.$$

Quodsi ergo sit $b = DA < a = DC$ (30. Fig.); erit tangens in polo C tanquam puncto conjugato conchoidis (595. §.) imaginaria (504. §.). Si vero sit $b = DA = a = DC$ (31. Fig.); debet tangens in puncto duplici C (595. §.) esse perpendicularis ad axem EF (504. §.), et C erit

Cuspis

Cuspis conchoidis (441. §.). Si demum sit $b=DA > a=DC$ (32. Fig.); extabunt ad C binae tangentes uv, rs (504. §.), et C erit *nodus conchoidis* (441. §.).

600. DEFINITIO.

Exempla curvarum transcenduntium (442. §.) desumemus a quadra Fig. 33. trice, cycloide, et epicycloide. Si quadrans AB (33. Fig.) circuli radio $CB=r$ descripti, et radius AC dividantur in quibuscunque punctis E, P, sic ut sit $BE:BA=CP:CA$, tum, ducto radio CE, ex P ad AC ducatur perpendicularis PM eidem radio in M occurrens; jacebunt omnia puncta M hoc modo determinabilia in *Quadratrice dinoftratis* AMD.

601. Corollarium 1.

Pro arcu ϕ radio $=r$ inter crura anguli BCE descripto et $z=CM$, erit $CP=z \sin \phi$, $BE=r\phi$, $AB=\frac{1}{2}r\pi$: cum igitur sit $BE:BA=CP:CA$ (600. §.); erit $\phi:\frac{1}{2}\pi=z \sin \phi:r$, hinc $z=\frac{2r\phi}{\pi \sin \phi}$ aequatio ad quadratricem inter ordinatas $z=CM$ ad punctum C convergentes et angulos variabiles $\phi=BCE$.

602. Corollarium 2.

Crescente angulo BCE, adeoque etiam arcu ϕ , crescet quoque $z=CM$, et pro $\phi=\frac{1}{2}\pi$, anguloque $BCE=BCA=90^\circ$ fiet $z=r=AC$: quodsi autem decrescat angulus BCE, dum fiat tam is quam arcus $\phi=0$; fiet etiam $\sin \phi=0$, et $z=CM=CD=\frac{2r}{\pi}$ (601. §.).

603. Corollarium 3.

Ex (601. §.) facile elicies aequationem inter coordinatas orthogonas $y=MP, x=CP$: erit enim

$$x=z \sin \phi = \frac{2r\phi}{\pi};$$

$$y=z \cos \phi = \frac{2r\phi \cos \phi}{\pi \sin \phi} = x \cot \frac{\pi x}{2r}.$$

604. Corollarium 4.

Pro his coordinatis invenies in (603. §.) exponentem rationis differentialis functionis y

$$\varepsilon y = \frac{\sin \phi \cos \phi - \phi}{\sin \phi^2} \cdot \varepsilon x = \frac{\frac{1}{2} \sin 2\phi - \phi}{\sin \phi^2} \cdot \varepsilon x.$$

Hinc manifestum, fit, ob (59. §.), εy semper habere valorem negativum: crescentibus abscissis $x = CP$ decrescunt ergo ordinatae $y = MP$ (444. §.), tangensque MT ad punctum M cum subtangente TP jacet ad partem ordinatae MP ei oppositam, ad quam jacet origo abscissarum C (500. §. 3. n.); et, sumto idcirco εy cum signis contrariis, obtinebis subtangentem cum angulis MTP , TMP per (500. §. 4. n.): nimirum

$$TP = \frac{r\phi}{\pi} \cdot \frac{\sin 2\phi}{\phi - \frac{1}{2} \sin 2\phi}.$$

$$\text{Tang } MTP = \frac{\phi - \frac{1}{2} \sin 2\phi}{\sin \phi^2}; \text{Tang } TMP = \frac{\sin \phi^2}{\phi - \frac{1}{2} \sin 2\phi}.$$

Pro angulo $BCE = 0$ debebit fieri $\phi = 0$, $\sin \phi = 0$, $\sin 2\phi = 0$: igitur pro tangente in D erit $\text{Tang } TDP = 0$, et subtangens $TP = TC = 0$.

605. DEFINITIO.

Fig. 34. Si diameter AB (34. Fig.) dati circuli perpendicularis fit ad rectam DE in B , et per quodcunque illius punctum P ducatur MM^1 parallela rectae DE peripheriam circuli in m , m^1 secans, sic ut sit arcus $Am = Am^1$, tum fiat $Am = mM = Am^1 = m^1M^1$; jacebunt omnia puncta M , M^1 hac ratione determinabilia in una curva, quae *Cyclois* vulgaris seu *Trochois* vocatur.

606. Corollarium 1.

Pro radio $AC = r$ circuli genitoris, et $AP = x$, $MP = y$, erit $y = mP = Mm = mP + Am$ (605. §.). Est autem $mP = \sqrt{(2rx - x^2)}$, et tam mP sinus, quam $AP = x$ sinus versus arcus Am : quod si ergo huic substituas arcum radio $= 1$ inter crura anguli ACm descriptum per (5. §. 2. Schol.), habebis sequentes aequationes ad cycloidem inter coordinatas orthogonas $x = AP$, $y = MP$.

$$y = \sqrt{(2rx - x^2)} + r \text{ Arc Sin } v \frac{x}{r};$$

$$\text{vel } y = \sqrt{(2rx - x^2)} + r \text{ Arc Sin } \frac{\sqrt{(2rx - x^2)}}{r}.$$

607. Corollarium 2.

Pro $x = AB = 2r$ erit $y = BE = r$. $\text{Arc Sin } v 2 = r\pi =$ semiperipheriae AmB circuli genitoris (606. §.).

608. Corollarium 3.

Ordinata y cycloidis semper est imaginaria, tam pro abscissa negativa $x = -Ap$, quam pro positiva $x = Aq > AB = 2r$ (606. §.): tota cyclois continetur ergo inter parallelas DE, de per puncta extrema diametri AB transeuntes.

609. Corollarium 4.

Differentiatio prima et secunda functionis y in (606. §.) dabit sequentes exponentes differentiales:

$$\varepsilon y = \varepsilon x \sqrt{\frac{2r-x}{x}}; \quad {}^2\varepsilon y = \frac{-r}{x\sqrt{(2rx-x^2)}}.$$

610. Corollarium 5.

Cum semper debeat esse $x < 2r$ (608. §.); semper erit εy valoris positivi, et ${}^2\varepsilon y$ valoris negativi (609. §.): tangens MT cum subtangente TP pro quovis puncto M cycloidis jacebit igitur cum origine A abscissarum $x = AP$ ad eandem partem ordinatae mP (500. §. 3. n.); ipsa vero cyclois obvertet concavitatem axi abscissarum AB in quolibet puncto M (461. §.).

611. Corollarium 6.

Per (609. 500. §. 4. n.) inveniuntur pro situ tangents respectu ordinatae MP et lineae abscissarum AB sequentes expressiones:

$$\text{Tang MTP} = \sqrt{\frac{2r-x}{x}}; \quad \text{Tang TMP} = \sqrt{\frac{x}{2r-x}}.$$

Pro $x = AB = 2r$ erit $\text{tang MTP} = 0$; et pro $x = 0$ fiet $\text{tang TMP} = 0$: tangens in E vel A est igitur perpendicularis ad BE casu primo, vel AB casu secundo.

612. Corollarium 7.

Radius curvedinis in quolibet puncto M cycloidis erit ob (609. 472. §.) aequalis functioni $2\sqrt{(4r^2 - 2rx)} = 2.mB$, nimirum = duplae chordae mB: pro $x = AP = 0$ erit itaque radius curvedinis in puncto A aequalis quadruplo radio, seu duplae diametri circuli genitoris, nimirum $= 4r = 4.AC = 2.AB$.

613. Corollarium 8.

Pro arcu $\mu = AM$ per (469. 609. §.) invenies exponentem differentialem $\varepsilon \mu = \varepsilon x \sqrt{\frac{2r}{x}}$: ipse igitur arcus erit $\mu = AM = 2\sqrt{2rx}$. Hinc pro $x = 2r = AB$ debet esse $AME = 2\sqrt{4r^2} = 4r$.

614. Corollarium 9.

Et pro spatio $S = AMP$ habebimus ob (606. 488. §.) exponentem differentialem.

$$ES = \varepsilon x \sqrt{(2rx - x^2)} + r \varepsilon x \text{ Arc Sin } v \frac{x}{r}.$$

Hinc si altera pars integretur per (257. §.), prodibit

$$S = rx \text{ Arc Sin } v \frac{x}{r} + \int \varepsilon x \sqrt{(2rx - x^2)} - \int \frac{rx \varepsilon x}{\sqrt{(2rx - x^2)}}.$$

Adeoque per (289. 302. §.) debet esse

$$S = AMP = \frac{1}{2}(r+x)\sqrt{(2rx - x^2)} + r(x - \frac{1}{2}r) \text{ Arc Sin } v \frac{x}{r}.$$

Quamobrem pro $x = 2r$ obtinebitur spatium $ABE = r(2r - \frac{1}{2}r) \text{ Arc Sin } v 2 = \frac{3}{2}\pi r^2$ triplum areae AmB femicirculi genitoris.

615. Corollarium 10.

Ceterum facile ex (605. §.) colligitur, punctum A diametri AB percursum cycloidem AME , si circulus genitor $AmBm'A$ rotetur super recta DE .

616. DEFINITIO.

Fig. 35. Si super peripheria EBF (35. Fig.) circuli radio CB descripti rotari cogitetur circulus $AbBaA$ cum priori jacens in eodem plano; progredietur punctum extremum A diametri AB in curva $AA'D$, quam *Epicycloidem vulgarem* vocant.

617. Corollarium 1.

Si circulus genitor ab initiali situ $AbBa$ perveniat ad situm $A^1b^1B^1a^1$, ita ut diametri AB , ab situm A^1B^1 , a^1b^1 obtineant; erit arcus $a^1B = aB = a^1B^1$: quodsi ergo ponatur arcus $a^1B = a^1B^1 = u$, et radius circuli genitoris $cB = c^1B^1 = r$, circuli vero, super quo ille rotatur, radius $CB = R$; erit angulus $a^1CB = \frac{u}{R}$, et angulus $a^1c^1B^1 = \frac{u}{r}$ (5. §. 3. Schol.).

618. Corollarium 2.

Ducta ad quodcunque punctum A^1 epicycloidis recta $CA^1 = v$, cum fit $A^1c^1 = r$, $Cc^1 = r + R$, et angulus $A^1c^1C = 180^\circ - B^1c^1C = 180^\circ - \frac{u}{r}$ (617. §.); habebimus per (5. §. 1. Schol. 36. Form.)

$$v^2 = r^2 + (r + R)^2 + 2r(r + R) \text{Cof } \frac{u}{r}.$$

619. Corollarium 3.

Pro coordinatis orthogonis $x = CP$, $y = A^1P$ debeat ergo esse ob (618. §.)

$$y^2 = r^2 + (r + R)^2 + 2r(r + R) \text{Cof } \frac{u}{r} - x^2.$$

620. Corollarium 4.

Ubi circulus genitor $AbBa$ situm $DMGN$ obtinuerit, puncto A in D , et B in G cadente; erit $u = BD = AaB = \pi r$: igitur $z^2 = CD^2 = r^2 + (r + R)^2 + 2r(r + R) \text{Cof } \pi$ (618. §.); adeoque, ob $\text{Cof } \pi = -1$, erit $z^2 = CD^2 = R^2$, et $z = R$.

621. Corollarium 5.

Ductis ex c^1 ad A^1P , CP perpendicularis c^1q , c^1p ; erit angulus $A^1c^1q = a^1c^1B^1 + a^1CB = \frac{u}{r} + \frac{u}{R}$ (617. §.), et $x = CP = Cp + c^1q$, $y = A^1P = A^1q + c^1p$: cum ergo sit

$$Cp = Cc^1 \cdot \text{Cof } a^1CB = (r + R) \text{Cof } \frac{u}{R};$$

$$c^1q = A^1c^1 \cdot \text{Cof } A^1c^1q = r \text{Cof } \left(\frac{u}{r} + \frac{u}{R} \right);$$

$$A^1q = A^1c^1 \cdot \text{Sin } A^1c^1q = r \text{Sin } \left(\frac{u}{r} + \frac{u}{R} \right);$$

$$c^1p = Cc^1 \cdot \text{Sin } a^1CB = (r + R) \text{Sin } \frac{u}{R};$$

debeat esse

$$x = (r + R) \text{Cof } \frac{u}{R} + r \text{Cof } \frac{r + R}{R} \cdot \frac{u}{r};$$

$$y = r \text{Sin } \frac{r + R}{R} \cdot \frac{u}{r} + (r + R) \text{Sin } \frac{u}{R}.$$

622. Corollarium 6.

Epicyclois erit itaque curva algebraica, vel transcendens, prout radii r, R fuerint commensurabiles, vel incommensurabiles. Si enim radii r, R sint commensurabiles; dabuntur numeri integri k, l , pro quibus fiet $\frac{r}{R} = \frac{k}{l}$ hinc $R = \frac{rl}{k}$, et $\frac{r+R}{R} = \frac{k+l}{l}$: habebimus ergo in (621. §.)

$$x = (r+R) \operatorname{Cof} \frac{k}{l} \cdot \frac{u}{r} + r \operatorname{Cof} \frac{k+l}{l} \cdot \frac{u}{r}.$$

Quamobrem licebit utrumque cosinum in hac aequatione per $\operatorname{Cof} \frac{u}{r}$ exprimere, et si tum valor loco $\operatorname{Cof} \frac{u}{r}$ ex aequatione in (619. §.) determinabilis substituatur, determinabitur aequatio algebraica inter x, y , carens arcu u .

623. Problema.

Explorare situm tangentis ad quodvis punctum A' epicycloidis.

Solutio.

1. Pro $\frac{u}{R} = \varphi$, et $\frac{r+R}{Rr} u = \mu$, habebimus ob (621. §.) sequentes aequationes:

$$x = (r+R) \operatorname{Cof} \varphi + r \operatorname{Cof} \mu;$$

$$y = r \operatorname{Sin} \mu + (r+R) \operatorname{Sin} \varphi.$$

2. Si arcus $u = Ba'$ crescat, decrescet $x = CP$, et crescat $y = A'P$, unde sequitur tangentem $A'T$ cum subtangente TP cadere ad partem ordinatae $A'P$ oppositam illi, ad quam jacet origo abscissarum C (500. §. 3. n.).

3. Erit autem in (1) $\varepsilon x = (r+R) \varepsilon \operatorname{Cof} \varphi + r \varepsilon \operatorname{Cof} \mu$, et $\varepsilon y = r \varepsilon \operatorname{Sin} \mu + (r+R) \varepsilon \operatorname{Sin} \varphi$, seu $\varepsilon x = -(r+R) \operatorname{Sin} \varphi \varepsilon \varphi - r \operatorname{Sin} \mu \varepsilon \mu$, et $\varepsilon y = r \operatorname{Cof} \mu \varepsilon \mu + (r+R) \operatorname{Cof} \varphi \varepsilon \varphi$: quodsi ergo juxta (1) exponentes differentiales $\varepsilon \varphi, \varepsilon \mu$ determinentur per εu , valorque pro εx sumatur cum signis contrariis; debet esse per (500. §. 4. n.)

$$\operatorname{Tang} PA'T = \frac{\varepsilon x}{\varepsilon y} = \frac{\operatorname{Sin} \varphi + \operatorname{Sin} \mu}{\operatorname{Cof} \varphi + \operatorname{Cof} \mu} = \operatorname{Tang} \frac{1}{2} (\varphi + \mu).$$

Et

$$\text{Et ob } \phi + \mu = \frac{2r+R}{rR} \cdot u \text{ erit}$$

$$\text{Tang PA'T} = \text{Tang } \frac{1}{2} \cdot \frac{2r+R}{rR} \cdot u.$$

624. Corollarium 1.

Pro situ tangentis respectu lineae abscissarum, et normalis A'S respectu ordinatae erit ob (623. §.)

$$\text{Cot A'TC} = \text{Cot PA'S} = \frac{\sin \phi + \sin \mu}{\cos \phi + \cos \mu} =$$

$$= \text{Tang } \frac{1}{2}(\phi + \mu) = \text{Tang } \frac{1}{2} \cdot \frac{2r+R}{rR} \cdot u.$$

625. Corollarium 2.

Ducta chorda A'a', erit angulus a'A'c' = $\frac{1}{2}$ A'c'b' = $\frac{1}{2}$ a'c'B' = $\frac{u}{2r}$ (617. §.); ob A'c'q = $\frac{u}{r} + \frac{u}{R}$ (621. §.) autem, erit c'A'q

= $90^\circ - \left(\frac{u}{r} + \frac{u}{R} \right)$: habebimus ergo angulum a'A'q = a'A'c' + c'A'q

= $90^\circ - \frac{1}{2} \left(\frac{2r+R}{rR} \right) u$. Debet ergo esse $\text{Cot a'A'q} = \text{Tang } \frac{1}{2} \cdot \frac{2r+R}{rR} \cdot u$.

Angulus intra chordam A'a' et ordinatam A'P aequatur itaque angulo intra normalem A'S et ordinatam A'P (624. §.), et ideo debet normalis A'S cum chorda A'a' coincidere, et tangens A'T esse perpendicularis ad chordam A'a'.

626. Problema.

Rectificare arcum epicycloidis $\alpha = AA'$.

Solutio.

Determinatis juxta (623. §. 1. 3. n.) valoribus pro εx , εy , obtinebimus

$$\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2 = \frac{(r+R)^2}{R^2} \varepsilon u^2 (2(1 + \sin \phi \sin \mu + \cos \phi \cos \mu))$$

$$= \frac{(r+R)^2}{R^2} \varepsilon u^2 \cdot 2(1 + \cos(\mu - \phi))$$

$$= \frac{(r+R)^2}{R^2} \varepsilon u^2 \cdot 2 \left(1 + \cos \frac{u}{r} \right)$$

Per (469. §.) erit ergo

$$x = \frac{r+R}{R} \varepsilon u \cdot 2 \sqrt{\frac{1 + \text{Cof } \frac{u}{r}}{2}},$$

$$\text{feu } x = 2 \frac{r+R}{R} \varepsilon u \text{Cof } \frac{1}{2} \cdot \frac{u}{r},$$

$$= \frac{4r(r+R)}{R} \varepsilon \text{Sin } \frac{1}{2} \cdot \frac{u}{r}.$$

Est ergo arcus $AA' = \alpha = \frac{4r(r+R)}{R} \text{Sin } \frac{u}{2r} + C$: cumque pro ar-

cu $u = BA' = 0$ debeat fieri etiam arcus $\alpha = AA' = 0$, et $\text{Sin } \frac{u}{2r} = 0$;
debet esse constans $C = 0$, hinc

$$\alpha = \frac{4r(r+R)}{R} \text{Sin } \frac{u}{2r}.$$

627. Corollarium.

Pro arcu $u = BD = AaB = r\pi$, erit $\alpha = AA'D$: igitur per (626. §.)

$$AA'D = \frac{4r(r+R)}{R} \text{Sin } \frac{1}{2}\pi = \frac{4r(r+R)}{R}.$$

628. Problema.

Invenire radium curvaturae pro quovis puncto A' epicycloidis.

Solutio.

Per (623. §. 1. 2. n.) et (626. §.) determinabis radium curvaturae pro puncto A' sequenti calculo.

$$\varphi = \frac{u}{R}; \quad \mu = \frac{r+R}{Rr} u;$$

$$x = \frac{r+R}{R} \varepsilon u (\text{Sin } \varphi + \text{Sin } \mu);$$

$$y = \frac{r+R}{R} \varepsilon u (\text{Cof } \varphi + \text{Cof } \mu);$$

$$\varepsilon y^2 + \varepsilon x^2 = \frac{(r+R)^2}{R^2} \varepsilon u^2 \cdot 2(1 + \text{Cof}(\varphi - \mu));$$

$$\varepsilon x = \frac{r+R}{rR^2} \varepsilon u^2 (r \text{Cof } \varphi + (r+R) \text{Cof } \mu);$$

$$\varepsilon y = -\frac{r+R}{rR^2} \varepsilon u^2 (r \text{Sin } \varphi + (r+R) \text{Sin } \mu);$$

$$\varepsilon^2 y \varepsilon x - \varepsilon^2 y \varepsilon x =$$

$$= \frac{(2r+R)(r+R)^2}{rR^2} \varepsilon u^3 (1 + \text{Sin } \varphi \text{Sin } \mu + \text{Cof } \varphi \text{Cof } \mu)$$

$$= \frac{(2r+R)(r+R)^2}{rR^2} \varepsilon u^3 (1 + \text{Cof}(\mu - \varphi)).$$

Per (474. §.), si radius curvaturae in puncto A' vocetur Z, erit ergo

$$\begin{aligned} Z &= \frac{\left(\frac{(r+R)^2 \varepsilon u^2}{R^2} \cdot 2(1 + \text{Cof}(\mu - \varphi)) \right)^{\frac{1}{2}}}{\frac{(2r+R)(r+R)^2}{rR^2} \varepsilon u^3 (1 + \text{Cof}(\mu - \varphi))} = \\ &= \frac{4r(r+R)}{2r+R} \sqrt{\frac{1 + \text{Cof}(\mu - \varphi)}{2}}. \end{aligned}$$

Consequenter est

$$Z = \frac{4r(r+R)}{2r+R} \sqrt{\frac{1 + \text{Cof} \frac{u}{r}}{2}} = \frac{4r(r+R)}{2r+R} \text{Cof} \frac{u}{2r}.$$

629. Corollarium 1.


Radium curvedinis pro puncto A obtinebis ex (628. §.), posito arcu $u = \text{Ba}' = 0$, quo casu fiet $\text{Cof} \frac{u}{2r} = \text{Cof } 0 = 1$: igitur radius curvaturae in A fiet $Z = \frac{4r(r+R)}{2r+R}$.

630. Corollarium 2.

Radium vero curvaturae pro puncto D invenies ex (628. §.) ponendo arcum $u = BD = AaB = r\pi$, adeoque $\text{Cof} \frac{u}{2r} = \text{Cof} \frac{1}{2}\pi = 0$: quare radius curvaturae in puncto D est $Z = 0$.

Error corrigendus.

In 301. §. pag. 130. debet pars prima seriei habere factorem
 $2\sqrt{(\alpha + \beta x)^3}$ loco $2\sqrt{\alpha + \beta x}$.






Fig. 22.




Fig. 23.





Fig. 24.



Tab. II.




Fig. 26.




Fig. 31.




Fig. 33.




Fig. 28.




Fig. 29.




Fig. 30.




Fig. 32.




Fig. 34.




Fig. 35.

